








LVD. SEPT.
MEDIOLAN.

The image shows the spine of an antique book bound in dark brown leather. The spine is decorated with four large, vertically aligned rectangular panels, each featuring a central fleur-de-lis motif surrounded by intricate, symmetrical scrollwork and foliate designs, all executed in gold tooling. A central rectangular label, also gold-tooled with a double-line border, contains the text 'LVD. SEPT. MEDIOIAN' in capital letters. The leather shows signs of age and wear, particularly at the bottom edge.











A. XXX. Sep

5949 (2) A/2 Pts 1-2
revised

5950 (2)

4


SETTALA


Animadversionum.

Dupl. with Pl. 2

De naevibus bound

inst.





V
S
T R
upph
S
chima

rm a
ad V
M

aij


57542 43350
L V D O V I C I
S E P T A L I I

ATRICII MEDIOLANENSIS,
Protophysici Generalis Status Mediolani, & Actiuae
Scientiae Publici in Patria Professoris.

Animaduerfionum, & Cautiōum Medicarum,

LIBRI DVO.

Septem alijs iam editis additi, Animaduerfiones, quæ
ad Vulnēra curanda, & quæ ad componenda
Medicamenta pertinent, continentes.



atauij, Apud Paulum Frambottum. MDCXXX.

Typis Iosephi Sardi, & Fratrum,
Superiorum Permissu.


ADVOIC SETTLE

THE FIRST BOOK OF THE
LAW OF THE COMMONS

OF THE COMMONS OF GREAT BRITAIN

IN PARLIAMENT ASSEMBLED

THE FIRST BOOK OF THE
LAW OF THE COMMONS
OF THE COMMONS OF GREAT BRITAIN



THE FIRST BOOK OF THE
LAW OF THE COMMONS

OF THE COMMONS OF GREAT BRITAIN
IN PARLIAMENT ASSEMBLED


Perillustri ac Excellentiss. Medico

ENATORI SEPTALIO L. F.

Patricio Mediolanensi

Paulus Frambottus

F. O.



I verum est, quod in Phædro litterarum monumētis consignauit Diuinus ille Plato, Animam humanam insita propensione voluntatis ad Bonum eligendum ac diligēdum, & naturali quadam inclinatione Mentis ad Verum intelligendum,

quasi duabus Alis, ad Superos eleuari: nā supra mortalium conditionem ad Heroicum ac ferē Diuinum gradum elata dicenda nobis est esse tua SEPTALIO-
LVM Familia, Doctissime SENATOR: In ea siquidem plerique viritum Sanctitate, tum Sapientia, maximē suspiciuntur: sed præ ceteris vt per eximiam
haritatem summo Bono voluntate coniunctissimus inter Beatos colitur Sanctus SENATOR SEPTALIVS, olim Mediolanensium Archiepiscopus, a quo
nomen

nomen SENATORIS in eadem Prolepia nactus es
ita perspectatam Doctrinā Primo Vero mente pro
ximus inter Sapientes eminet EDOVICVS SE
PTALIVS, nunc Mediolanensium Archiater, Pate
tuus; qui Philosophiam & Medicinam tum pluriur
voluminum editione, tum Lectura Canobiana, tum
mirifica Medendi Praxi adeo illustravit, vt nomini
immortalitatem sibi viuens apud omnes gentes iam
comparauerit. Horum Tu nunc æmulator egregius
& probatis moribus ad SENATORIS Sanctitudinem
pergere videris, & liberalium Artium studijs, veluti
Septenis alis, ad paternæ Sapientiæ culmen egregio c
natu scandere fatagis. Quamobrem auitæ gloriæ, pa
ternæque virtutis hæres, inter SEPTALIOS Heroa
Orbi clues, eumque Te præbes, cui merito debeant
literatorum hominum monumenta factari. Ego ve
rò, qui dudum magno tuo Genitori mancipatus, tuam
etiam in clientelam ingredi cupio, commodum a
planum ad eam iter mihi nunc paratum esse perspi
ciens per huius Operis à Patre tuo, nostræ tempesta
tis Æsculapio, literis commendati, & à me typis ex
cusi, dedicationem; lubens ac libens occasionem
hanc arripui. Spero namque gratiam Tibi fore conelu
sum in paternæ virtutis monumento summum ergo
Te animi mei cultum. Vale Vir sublimis, & me in
clyto Parenti tuo deuinctissimum, amare, ac fouere
perge. Patauij. Calend. Iunij. MDC.XXX.


I
L V D O V I C I
S E P T A L I I
P A T R I C I I M E D I O L .

rotophysici generalis Status Mediolani, &
Actiuz Scientiæ publici in Patria
Professoris,

Animaduersionum, & Cau-
tionum Medicarum

L I B E R O C T A V V S .

Continens eas quæ ad Vulnerum curatio-
nem pertinent.



V M tres esse curaticis medicinæ
partes, διατητικὴν quæ victu me- Chirurgi-
detur, θεραπευτικὴν quæ me- cæ par-
dicamentis, & χειρουργικὴν quæ præstantis
manuali opere, ab antiquis, & recen-
tibus medicis receptam sit; cur postre-
ma pars hæc adeo necessaria à reliquis
duabus sciuncta sit, vix animo causam
incipere valeo, nisi forte inani quodam fastu aliqui de
vni dignitate derrahi sibi censescentes timerent, ne si ma-

A ni-

nibus operationes has exercuissent, inter operarios, & in
males artifices connumerarentur. sed si finis medici,
sanitas est, unde rei cuiusque præstantia, & nobilitas
sumi debet, consideretur; nunquam quispiam affirmat
rit, quacunque ratione ea introducat, illud dignitat
ac nobilitati suæ esse obfuturum. Sed demus secare, ve
re, luxata membra reponere, fracturas componere, ter
brare, & id genus sexcenta, si non alia ratione, saltem co
suetudine quadam, ingenuo homine indigna ab aliquib
iudicari; aut certe animi imbecillitate alios ab ijs operati
nibus absterri; aut ob oculorum aut manuum affectu
nem aliquam impediri; certe imperfectam possidere han
scientiam quilibet iudicari poterit, qui in tertia hac cur
atricis parte aut se non exercuerit, aut saltem eius præcept
& hanc curandi rationem optimè non cassuerit; cum
medicinæ pars sit necessaria, & antiquos illos procères Hi
pocratem, Galenum, Celsum, Paulum, & ex Mauritan
præstantissimos quosque in ea parte maximè excelluiss
confer. Conquesti propterea sunt non pauci ex philo
tris, quod cum cautiones, & animaduersiones in medic
um gratiam, & utilitatem publicas fecerim, quæ ad me
dici decorem, ad ægrotum victus rationem, ad sanguin
euacuationem, ad pharmaceuticam, ad febrium, & mor
borum omnium particularium curationem attinent; præ
stantissimam hanc partem adeo necessariam, in qua eti
multo pauciores scriptis se se exercuerunt, tam alto fletu
Chirurgi- tio præterierim. Quorum iustis querelis ut ex parte sa
cæ obser- tisfacerem, decreui etiam in ea ingenium exercere, tur
natiores quod in illa tam multos errores committi videam in anti
cur hic ad qua Hip. & Gal. & antiquorum omnium curandi ratio
ditæ. ne; tum potissimum quod nouus hic curandorum vulne
rum modus totus in fouendo ferè solum calore natural
præcipuo naturæ benè operantis instrumento positus iam
in multis Italiæ partibus receptus, doctè admodum ac ex
quisitè à Casare Magate libris duobus de vera medica
tione

ione vulnerum, siue de vulneribus raro tractandis exploratus, & defensus, & à me pluribus curationibus, & experientis confirmatus id persuadebat: ut in posterum mortales omnes cognoscant, veram hanc esse vulnerum omnium, potissimum autem capitis, curandi rationem: quod per illam tutò, citò, & iucundè, quæ tria in omni mediendi ratione procurari debent, homines ad sanitatem deducantur. Quæ res, quamvis virum oëm bonum, & ingenuum medicum impurare deberet ad eam amplectendâ, summa tamè hominum avaritia potius effecit, ut quamplurimos habeat aduersarios: & mihi difficillimum fuerit hanc persuadere illamq; apud nostros introducere: & nisi felicissimi curationum huiusmodi euentus veritatem hæc ostendissent, vix fieri potuisset, ut modus hic curandorum vulnerum, potissimum capitis, à quopiam reciperetur; quod brevis hæc curandi ratio non omnibus placeat. Et quoniam primo loco in erroribus mihi versandum est, qui in curatione vulnerum potissimum capitis contingunt; cum etiam antiquam illâ ex Hip. Gal. & alijs depromptam non reiiciendam censeâ, si præcepta ab illis tradita seruentur: licet nouam faciliorem, tutiorem, & iucundiorem præferendam semper crediderim; in utramq; & cautiones & animaduersiones apponere optimum iudicaui, sed dum in noua hac recensenda curandi ratione, & in convincendis multis erroribus versabor, ingenuè profiteor quæ in vulneribus curandis potissimum capitis à me præponuntur ex accuratissimis illis duob. libris excerptis, atq; pro arctissimo hoc meo scribendi genere breuissimè & cōpèdiosè tradidisse: vnde etiam medicos oēs adhortor, ut ex vltimo illo fonte totâ hanc, & integrâ curandorum vulnerum nonâ rationem hauriant; ut, quæ ab eo firmissimis rationibus ad faciiliū experimentorū confirmationem adducta sunt, ipsi etiâ nouis experimentis suis possint comprobare.

1. Vulnerum curandorum rationem duplicem esse, & maximè inter se oppositam temporibus ijs nostris animaduerto; Antiquam vnam, quam Hip. Gal. & reliqui omnes quosnouus

Vulnerū
curandorū
nouus mo-
dus præstā-
tissimus.

Cæsaris
Magati
laus.

Vulnerū
curandorū
dupl. mo-
dus, anti-

Medicinae proceres & tradiderunt, & tum ipsi, tum ceteri omnes medici ad nostra usque tempora sectati sunt; quotidie, quin & bis, & saepius in die solvuntur vulnera deteguntur, filis absterguntur, recentibus medicamentis, vniuntur, nutriuntur; linamentis, penicillis, turundis, licinijs tentis etiam dictis, splenijs, faldellis appellatis, ubi caui sunt, aut simplicibus, aut vnguentis, aut linimentis imbuti impositis. Alteram nouam, nostris temporibus natam, per multa iam Italiae loca vagantem, ac receptam, in qua raro deteguntur solvunturque vulnera; tegumento fouentur, & cito curantur sine vlllo turundarum spleniorumue vsu. Primam illam ab antiquis inuentam, & a posterioribus receptam, & approbatam, tot seculis experientia confirmatam, per quam tot vulnerati pristinae sanitati sunt restituti, reprobare nunquam audeam. At nouam hanc posteriorem & faciliorem esse, minus molestam, & quod maioris est momenti, securam magis, & per quam multo plures sanitati restituntur, quilibet oculis, & obseruatione multarum curationum facile cognoscere poterit. neque vero ea suis caret fundamentis, quae ubi prius ostendero, quomodo in usum reuocanda sit adducam, difficultatesque dissoluam, quae contra eam adduci solent; & in hoc praeter institutum aliquanto plus me extendam, quod in re noua, & a quamplurimis exagitata versetur, quae apud multos speciem habet paradoxo, quod veterum sapientum doctrinam peruertere videatur, & ipsius Medicinae candorem inuerrere. Et quoniam duo continet noua haec medendi ratio, antiquae & consuetae contraria; primum non esse quotidie, & frequenter soluenda, & detegenda vulnera, alterum ablegandas esse turundas, licinia, & quas faldellas appellant; in primo insistemus primo loco in vniuersum; mox etiam secundum comprobare tentabimus, ut ad particulares curationes, & cautiones animaduersionesque circa illas tradendas versari possimus.

1. Primo igitur assero faciliorem, breuiorem, minus

Medendo
rum vulne
rum noua
ro longe
praeftatior.

LIBER VIII.

5

nolescam, longeque tutiorem curandi eam rationem vul-
 erum tam simplicium quam compositorum, & cautorum,
 qua raro solvantur, & deteguntur, sed tegumento fo-
 entur, eo modo, quo mox sumus explicaturi. & quidem
 ratione; cum natura omnium morborum sit medica,
 Medicus minister, & medicamenta instrumenta. si enim
 ro sit generanda, si ossa fracta sumanda, si agglutinan-
 um, si excrementa expellenda, praestat hoc natura: Me-
 icus igitur huc spectare debet, ut natura munia sua exer-
 ere valeat: & cum medicus illius sit minister, naturae lau-
 uentis robur augere debet, & quae ipsam offendunt, aut
 npediunt, auertere, & remouere. quamobrem in eo artis
 oposita est perfectio, ut laboranti naturae, quam melius fie-
 i possit, succurratur: qui igitur curandi modus felicius id-
 xestat, potior proculdubio erit censendus. Si igitur mo-
 um hunc vulnere curandorum nouum cum antiquo in-
 oc conferamus, facile illius praestantia omnibus erit ma-
 ifesta. Constat autem si tegumento, ut dicemus, vulnere
 pposito, calorem partis foueamus, raroque vulnus detega-
 nus, magis naturam foueri, illiusque calorem conseruari,
 & a quamplurimis, quae illi officere possent, & impedimen-
 o esse, defendi; quam si communi modo quotidie soluan-
 ur vulnera, detergantur, eisdemque medicamenta, lina-
 mentis seu penicillis excepta imponantur: unde necesse
 est, dum vulnus crebro denudatur, & ambiens exponitur,
 calorem naturalem vulneratae partis non leuiter offendi;
 tum quoniam ob naturalis tegumenti, scilicet carnis defe-
 ctum, eius subiectum dissoluitur; tum etiam quia ob am-
 bientis qualiteram illius symmetria peruertitur, cum sem-
 per ambiens sit latentibus nostri corporis partibus, & natu-
 rali nostro calore frigidior; unde etiam copiosiora excremen-
 ta impedimento actioni ipsius naturae futura, generantur.
 Addendum, partem, ob vulnus, dissolutionem caloris, &
 refrigerationem, debiliorem redditam, obnoxiam etiam
 magis reddi ad fluxiones humorum excipiendas: quin

præterea ex frequenti vulneris solutione, ex contrectatione, & motu partis, ex deterfione, penicilliorumque & linamentorum impositione, quæ etiam non raro materiam superprimunt, & compressione quandoque; dum ad pus eliciendum partes circumpositas premunt; & noua deligatione semper aliquis dolor; & sæpe etiam vehemens excitatur; non leuis fluxionis occasio esse potest. Amplius quoties vulnus soluitur, ac detegitur, toties interturbatur, & à proprio munere distrahitur natura. Neq; verò viget vtilitates, quas ex quotidiana vulnerum detectione prouenire assuevit; recentis medicamenti; quod naturam modo ad pus promouendum, modo ad generandam carnem adiuuat quotidiana applicatione; & crebra vulneris ab omnibus excrementis absterfione. Iam enim ostensum est, non esse necessariam quotidianam illam absterfionem, quæ fit & manuali operatione per se; vel cum medicamentis abstergentibus; verum ex accidenti tantum, ob defectum caloris naturalis, & ob interstitionem partis vulneratæ. & quod medicamenta quotidie non imponantur. Iam enim docuimus naturam perficere, quod à medicamentis expectari solet; inanisque damnum ex quotidiana medicamentorum impositione proficisci quam vilitatem. sed docebimus præterea non omnino hac curandi noua ratione, destituta medicamentorum auxilijs relinqui vulnera; satis tamen raram esse debere illorum appositionem: vt inferre liceat, verissimum esse quod à Gal. 6. Meth. med. c. 2. dicebatur, methodum non solum meliora medicamenta, quam prius, verum etiam vniuersum curationis modum inuenire posse. & 5. de san. tuenda ca. 11. fidem eius, quod ratione inuentum est, experientiam comprobare. & quod 6. Meth. med. 2. præcedere debere, quæ à vera methodo perficiscitur, remedium inuentionem; huic verò experientiam ad certiore[m] etiam fidem subscribere. In Magno hoc nostro valentudinario in quo per annos quadraginta medendis agis operam dedi, cum in portione illa cuius curam susce-

ram spatio vnus anni plerique ex vulneratis in capite
 irari, secus quam optabam, antiquo more frequenti vul-
 nerum solutione, detectis vulneribus, turundis, licinijs, fal-
 lis appositis, frequentibus terebrationibus, & scalpitis
 sent medicati, & plerique interijissent: occasione Asten-
 bellicam Chirurgus, cui illorum cura demandari sole-
 t, discessisset, operario, qui illi inserviebat, iniunxi, vt no-
 hac medendi forma vteretur, tegumento, inunctione
 bionum ex oleo Hispanæ, vel oleo abietino, & solum bis
 ter detecto vulnere, semel tantum terebratione in vsum
 acta, raro etiam scalpro, testor Deum, & præfectos viros
 illustres, & ministros omnes, qui adhuc viuunt ex qua-
 ordecim vulneratis in capite, vnum solum interijisse; &
 ter hos tamen tres fuerant vulnerati cum ossis caluariae,
 membranarum incisione, vnus ex casu ab alto cum os-
 retrocessione, & duo cum rima in osse. sed cum Chi-
 rgus iterum redijisset, nolletque vlla persuasione ab an-
 quo curandi more recedere, & infeliciter curationes suc-
 cederent, persuasionibus, ratione, & exemplis tandem con-
 ctus manus dedit, vt nouus is curandi modus introduce-
 tur, aquietit, felici iam successu. ex quorum vulnerum
 ratione, vt quæ magis negocij, quam reliqua, curantibus
 fferant, vulnere in alijs corporum partibus existentium
 urandi modus collectus est, & paulatim introducitur.
 Quod si facilitatem, & celeritatem curationis specte-
 us, affirmare certò possumus, multo facilius in hac
 minia transigi, quod ne vigesima quidem pars excre-
 rentorum generetur, nec semper in ea necessarium est
 ssa abscedere, quod in longum protrahere solet cura-
 ones. Quod si etiam vulnus sit non sine ossis absce-
 1, quilibet comperiet longe citius os abscedere nouo
 oc curandi modo, quam communi; & sæpius etiam in
 inori longe quantitate. Si igitur facilius, & celerius hoc
 modo sanantur vulnera, asserendum etiam erit, tutius id
 erfici: cum enim natura sit, quæ vulnera sanat, si citius.

sanitas introducitur : signum est aduersus impedimen-
 præualere naturam . at quò magis præualet hæc, eò magis
 tutò fieri curationem, nemo, arbitror, inficiabitur. Quod
 tertiam partem à Gal. traditam 14. Meth. met. c. 13. re-
 spiciamus, vt curatio fiat quantum magis fieri possit sin-
 dolore, quis negauerit hanc præualere, qui consideraue-
 rit, quantum æger discretiùtetur, cum Medicus accedit a-
 dissolutionem vulneris, importunamque illam absterge-
 nem, turundarum vel spleniorum introductionem, & me-
 dicamentorum appositionem. At per nostrum modum li-
 beratur à tot animi angustijs, à corporis doloribus. Libe-
 rantur vero etiam à tot expensis. Hincque modus is adeo
 difficilis est ad persuadendum chirurgis.

Argum. so-
 lutio eorū
 qui illi ad-
 uersantur.

3. Neque tamen, quæ aduersus hunc curandi modum
 obijciuntur, vim ullam habent. Primo enim duplex illud
 excrementorū genus, quæ in omnibus vulneribus generari
 dicebat Gal. 4. Meth. med. tenue, & crassum, quæ carni
 generationem impedire idem dicebat 3. Meth. 9. mihi
 faciunt; quando calore nativò partis conseruato, eorū
 minima pars generatur, cuius tenuior pars per insensibilem
 halitum dissoluitur, crassior verò, quæ minima est, per idē
 neum paratum effluxum à natura extra pellicui; aut pe-
 interualla detergitur; neque in id quod adeo noxium est
 iniurias nempe ambientis incurrimus, neque calorem dis-
 sipamus; neque periculum est, ne ex retento pure vlcus
 reddatur ferinum, quod, verendum admonebat Hip. lib. de
 locis in homine; nam robusta natura per paratum efflu-
 xum illud expellit. Cum præterea per hanc curandi ra-
 tionem tota curatio nature committatur; non adeo sapi-
 detegenda erunt vulnera, neque adeo frequenter mutanda
 sunt medicamenta, & cum eo modo citò sanitas intro-
 ducatur, satis erit vna, aut altera, aut ad summum tertia de-
 rectione, ad morbi statum cognoscendum, abstergenda pau-
 ca illa excrementa, & ad mutationem, si opus fuerit, me-
 dicamentorum. Neque frequens inspectio necessaria est

humectationis partis cognitionem, vt proportionem correspondentia medicamenta siccantia applicare possimus, & requiri censebat Galen. 3. Meth. 3. quia in nostro curandi modo, excrementorum cura medicamentis apertis non committitur, sed naturæ, & naturali calori; in ea fouenda maxime in eo insistitur. At saltem, inunt, quotidie soluemus, vt statum vulneris cognoscamus, futura provideamus, & presentia cognoscamus, & agendum sit inueniamus. Quasi verò etiam mentis illis quamplurima medici non prospiciant! pruritus, scio, fornix doloris, foetor, sanguinis fluxus, dolor cum su, febris horrida, grauitas in parte, puris effluentis initio, & alia multa admonebunt de conditione vulneris, & puris, illius retentione, inflammatione, gangraena, alijs, quæ detectionem persuadent, vt auxilijs præsto esse possimus, aut eleuato à parte inferiori aliquantulum remouendo multa videre, & in multis providere poterimus. dicunt, quomodo præceptum Hip. lib. de Officina medicinas, & lintea debere esse munda, si adeo rarò soluantur linera, verum erit? At lintea ipsi medicamentis iussu superponebant, quæ cum pure conspurcarentur, & pruritus, & inflammationem inducere poterant. At nos ita, & munda cauis vulneribus apponimus, vel potius superponimus, ad munditiem, exsiccationemque vulneris, & calorem fouendum. Præterea quam minimum putredinis in huiusmodi curatione generatur, quod etiam effluuium habet: quin præterea non prohibemus conspurcata lindeoque lintea detrahere, mundaque illorum loco superponere, modò fiat citra vulneris detectionem. Apposita, cunct, nec mutata lintea exitus halituum supprimunt. 2. off. med. 26. & Galen. 6. Meth. c. 5. vnde vulnerata pars distenditur, & morsus in parte excitant; partis temperiem viciant, & sanitatem impediunt. Verum neque delationes adeò strictæ esse debent, vt exhalationem impediunt, & si puri ad exitum paratum est effluuium, subtiliori

liori exhalationi multò magis paratus erit exitus :
 quamuis per quotidianam detectionem magis com-
 mune exhalent hi vapores : maius tamen sequitur ma-
 le ex dissolutione caloris, & spirituum, quam ex illorum ei-
 poratione bonum . cum præterea multa sint ad præsa-
 gia attinentia, quæ sine vulneris inspectione laterent, cu-
 ram tamen eorum cognitio sit necessaria : vt quæ scribunt
 ab Hip. primo predict. T. 18. quinta Aphor. 65. 66. 67.
 6. sect. Aph. 4. omnia ad præsagia ex varia vulnerum co-
 ditione desumpta facienda ; quæ non nisi quotidie solu-
 vulneribus præsagiant : Frequens illa detectio eam mar-
 festa solum faciet; tegumentum autem perseverans absce-
 det. Ad quod dicendum præsagia huiusmodi in vulneri-
 bus quavis curatione esse necessaria, & statum vulneris e-
 se cognoscendum . At quod ad cognitionem status vul-
 neris, & superuenientium symptomatum necessaria
 est detectio, id est quod negamus . Iam enim osten-
 sum est, quomodo sine ea inspectione satis hæc cognosce-
 mus. At, inquit, arcenda est à vulneribus mordicatio i-
 la, & pruritus, quæ sæpe adeo infestant, vt ferri nequean-
 ex Hip. & Gal. pri. de Fract. 39. & ideo ob pruritus vi-
 sit partem etiam fractam dissolui, & aqua tepente foveri
 & id faciendum dixit Gal. vt serosi & salii vapores ibi in-
 senti diffilari possint, leniatur dolor, & tollatur prurigo: i-
 verò non obtineri potest, nisi per vulneris solutionem va-
 poribus acerbis, & humoribus ichorosis euacuatis. Respo-
 dendum, raro id evenire, aut saltem non adeo vehemen-
 ter, vt ad solutionem vulneris urgeat: quod si perferri non
 possit, si aliter consili non potest, soluendum erit vulnus
 id verò non erit per se ratione illius morbi ; sed ob anne-
 xam symptomata, & paulo post casus adducemus in qui-
 bus soluendum erit vulnus: quandoque enim ob urgentem
 affectum à regulari curatione recedere cogimur; imò qui-
 doque morbum omnino negligimus, vt symptomati vt-
 genti obsistamus : & aliquando etiam novum morbum in-
 duci.

mus, & quasi insanabilem, ut periculum ex alio pen-
 us, vel ipsam mortem inde imminentem effugiamus.
 addunt, dicebat Hip. modum illum, qui sanitatem in-
 it, non esse immutandum; at per modum antiquum
 quem sepe soluiuntur, dereguntur, absterguntur vul-
 us, & noua sepe medicamenta induuntur, experientia do-
 nulta vulnera ad sanitatem perducit; igitur eo relicto,
 n'introducemus? At idem Hip. lib. de veteri med.
 nouam semper artibus, & potissimum medicinar
 posse accessionem. Sic multa ex antiquis ab Hip. ip-
 Galen. tradita exoluerunt, melioribus multis nostris
 oribus repertis. Non negamus communi illo curan-
 do sanari vulnera, quia tamen noua hac incedendi
 ruior est, facilior, breuior, & cum minori dolore; &
 estia; præstat in hac omnino insistere. Sed adhuc in-
 nt; non esse methodum vniuersalem: quasi verò in
 bus methodis, & regulis suis non adsint exceptiones.
 e ob hanc causam cautiones has medicas in vnum
 gi; quod in hoc etiam curandi modo præstabo, vbi
 docuero, quomodo hac curandi vulnera in genere
 ne procedendum sit; tradam enim occasiones, in qui-
 ab ea sit recedendum, & soluenda, & detegenda vul-
 us; neque enim regulæ medicæ perpetuæ sunt veritatis
 imo necessarias dicere possumus, quod ab ijs receden-
 non sit, nisi adiutorum ratione. Regula medica est
 cessionibus ab alimentorum exhibitione abstinendū
 at quandoq; in accessione nutrire ægrum cogimur. In
 fractura iubet Hip. l. de fract. post appositionem feru-
 n non soltendum esse vulnus, nisi post vigesimū diē
 e ipse scribebat, si ferulis alligatis, aliqua, ne ossa pro-
 habeant, suboriatur suspicio, aut quod sit aliud quod
 ante hominem infestet, circa dimidium illius temporis.
 etiam parum ante, soluendum esse, & religandum, &
 libr. pr. de fract. cap. 43. dicebat, semper medicus at-
 ere debet ei, quod magis virget; nec huiusmodi præ-

æpta perinde atque lex habenda sunt, quam violare nō sit, ubi omnia secundum rationem non succedant. Vrg præterea non esse bonam methodum hanc medendi, quod non sit vniuersalis, nec omnibus huiusmodi malis idonea; namque si vulnus fuerit cauto telo inflictum in parte iuosa; sit item angustum, & stricti orificij, vt pus exeat, cessare erit quotidie manibus comprimendo pus exprime, & præcipue, si orificium sursum spectet, aliter ferinum curus fieret; Præterea in lingua; vlcibus inanis erit is modus, cum nulla reperiat materia, quæ tamdiu adhærere possit, nec deligatio adhiberi possit, nec tegumentum: quod idem eueniet in vulneribus internarum partium. Dico enim; quod licet morbus per se requirat talem curandi modum, quandoque tamen conformatio, vel situs partitis, eum non admittit. Qui quotidie soluunt vulnera alicuiquo more, quomodo illum defendent in lingua, hepatis, pulmonum, & aliarum internarum partium vulneribus, quomodo ellychnia, tenta sue vnguentis illitas apponent, extrinsecus lintea vnguentis, aut alijs medicamentis illitis. Neque reiiciendus est modus curandi, quod Hip. & alij tuiqui illi, illum non tradiderunt. Artes enim perfectæ sunt per additamenta: nec primi omnia inuenerunt, quam principes inuenerint. vnde multa inueniri possunt, & dies inueniuntur, multaque adhuc latere censendum est, quæ temporis beneficio cognoscantur.

*Spleniorū
& turunda-
rum vsus
damnōsus
& cur.*

4. Cum noua hæc medendorum vulnorum ratio rarior inducat vulnerum solutionem, & rarissimam eorum detectionem: non erit dubitandum per eam reiici à ratione curatione genus omne turundarum, penicillorum, & similiarum: absurdum enim esset tanto temporis intervallo turundas, ellychnia, spleniaue, siue sicca, siue medicamentis imbuta, quæ iam etiā, & pure, & serosis humoribus repleta, intumuerunt, in cauo vulnere firmari; quibus, & distenduntur partes, & dolorem inferrent, & retineretur pus, quod maiorem putredinem dum conciperet, ferinum vlcus inducere.

ceret, de quo Hip. lib. de locis in homine. Quod cum
 eo in huiusmodi morbis sit consuetum, & omnibus fa-
 liare; operæpretium me facturum arbitror, si diligen-
 ter rem expendero. Ut igitur veritatem hac in re eruere
 ailius possim, finem perpendere expediet, ad quem in v-
 a splenia hæc sunt deducta. Si Guidonis Cauliacensis
 is consideremus octo, in quibus linamentis vtendum,
 nes varios, paucissimos inueniemus, in quibus illis vti
 ediar. Non enim, vt aperta feruentur caua vulnera, vt
 profundis ichores abstergi possint, & pus expurgari;
 enim ostensum est tegumento, & linteis foto calore na-
 li, paucissima generari excrementa, & ichorosa, &
 la, paucissimamque saniem; quæ cum temperatam
 tantiam producat caloris natui vigor, parato arte ef-
 io, in fundo non firmatur, sed effluit. Non solum au-
 , quod secundo loco proponit linimenta in carnis ge-
 nationem faciunt, sed aperte obstant; per illa enim impe-
 r natura ijs quasi oppressa. In alteratis ab aere, tertio
 essaria esse dicit, vt mundificentur. At illorum potius
 ositio ambienti præbet occasionem os alterandi; & car-
 ; quam alterationem rara nos detectione maximè eui-
 us. In contusis, quem quartum casum facit, si in mol-
 ta carne puris generatio attenditur, ad eam splenia
 faciunt, aut turundæ; cum ostensui simus illas potius
 se: si in duro, vt in caluaria, tunc turundas recipimus,
 do manuali operatione opus est, vel ossa abscindenda
 ant, vt dicemus. Tantum abest autem, vt apostemate
 rantibus, aut ulceratis vulneribus conueniant turundæ,
 splenia; vt manifestum reddat experientia nihil esse,
 magis dolores excitet, & inflammationes, quam ho-
 vltus. Non negamus soluenda in his casibus esse vul-
 , & sæpius manu medica succurrendum: at negamus
 restari vulneris per se ratione; sed ad id cogimur su-
 uenientium morborum causa.

. Finis enim, cuius gratia fuere inuenta, verus multi-

Finis sple-
niorum, &
quem in
vsum ve-
niant.

plex est: nam & vt alicuius vlcis orificium hians
seruetur, quo pus liberum habeat exitum, ne feriat
cus ex retento pure reddatur, de quo Hip. lib. de loci
homine: Et vt os magis amplum reddatur, vel in am-
tudinē, quam habet, seruetur, vt si qua manualis operi
in osse sit præstanda, quod in vulneribus capitis cum
læsione sæpenumero contingit; vel aliquod in vulnere
tentum corpus extrahi debeat, id fieri commodè possit
que illorum ope idoneum medicamentum parietibus
neris melius hæreat.

Splenia
non neces-
saria ad pu-
ris expur-
gationem.

6. Neque verò ex primo dicto turundarum fine,
erat vt hians vulneris angustis os aperiat, nos in com-
vsum trahere poterunt in quo penicilli introducuntur
puris & excrementorum liberam expurgationem dil-
to vulnere, & effluxu parato: tantum enim abest, vt
frequentem hunc vsum turundarum & spleniorum ef-
xus liber puri comparetur, vt potius per ea materia
neatur, in illisque imbibatur, atque os obstruatur, effluxus
que impediatur: ad abstricti enim orificij dilatationem
vt facilior materiæ effluxus paretur, his aut turundis
simplicibus ex filis lineis aut ex spongia compressa &
torta, aut ex medulla sambuci, aut cannæ sorgi, vel radicis
gentianæ: solum respicientes, illis aliquando parçè
dum dicebamus, non pro vera, & immediata vulneris
ratione, vt illi faciunt. quinimo hæc quandoque in vlti-
venire possunt, non ad vulneris veram curationem sed
vniio partium & agglutinatio impediatur, aut obcõpli-
tum alterum affectum, vel vt portio aliqua ossis, aut a-
rius rei liberum exitum obtinere queat. At si vulnus lar-
sit & profundum, nullus turundarum aut spleniorum
se pro curatione vsus esse potest; siquidem quod generat-
tur in vulnere, delitescere in tali vulnere ac retineri
poterit. neque periculum est labia, prius quam oportet
posse vñiri, cum supponamus in magno & cauo vulnere
non parum inter se distare, potissimum cum in eo gen-
vul

nerum non coalescere partes disunctæ possunt, ante
 am caro subiecta noua sit producta vt nec hæc bona
 ducitur, nisi conueniens in eius generatione præcedat
 positio, quæ iunctam habeat puris generationem, & ex-
 gationem. Qua ratione dicebat Hipp. lib. de vlceribus.
 cæra non purgata non committi, quamuis adducantur;
 si etiam adducantur, neque etiam sponte sua coire.

7. Neque etiam admittenda sunt splenia hæc, ne clau-
 tur pars superior vulneris, ante quam profunditas vul-
 nis carne sit repleta: assiduus enim excrementorum ef-
 fusus per externas partes vulneratas impedit labiorum coi-
 uentem ante repletionem cavitatis carne; maxime cū scia-
 tis citius semper generari carnem in fundo, vbi calor na-
 talis est robustior. mirum enim apparet naturæ artifi-
 um in vulnere curatione, dum bene operatur, quæ pau-
 im cavitatem repleat, & vniat, officium seruans ad ex-
 mentorum expurgationem, donec cavitatis repleta, & ni-
 sit amplius, quod expurgari postulet.

8. Neque dubitandum est, mollem illam, & fungosam
 nem generari, ob quam linamenta censent aliqui esse
 cessaria. In hoc enim curandi generare, in quo calor na-
 talis fouetur, neq; tot vnguenta humida introducuntur,
 in succrescit caro hæc mollis, aut saltem non tanta, quæ
 ris expurgationem possit impedire; si qua verò leniter
 crescit, in vna aut altera detractione puluisculis exsicca-
 us, aut lincis filis siccis facile tolli potest.

9. At ne quidem splenia admittenda sunt, vt illis me-
 antibus medicamenta, & profundas partes, & parietes
 cinque vulneris attingant. iam enim suppositum est non
 e necessarium hanc crebram medicamentorum applica-
 tionem, sed potius noxiam: quod si quandoq; necessaria
 erit vis alicuius medicamenti; neq; etiam necessitas nos
 luctet id præstandi per splenia, vel faldellas, vt vocant, vt
 medicamenti id præstet: ad hanc enim rem præstandã
 al. 3. Meth. 4. non turgidis vtitur, sed medicamentum

liquat

Spleniorum
 vltas non
 necessarius
 ne in par-
 te superiori
 ri caro cre-
 scat.

Neque ad
 fungosam
 carnem im-
 pediendã.

Neque ad
 sananda la-
 bia vulne-
 ris.

liquat, vt quaquauerſus, & ad fundum permeet. ſem
enim ſupponimus idoneum effluxum adeſſe pro exp
gatione materiæ. nos vt dicemus ſemel, aut iterum, te
ſoluto vulnere, ſtylo cum filis parietes vulneris, & par
neceſſarias delinimus.

Penicillo-
rum, & tu-
rundarum
damna.

Hip. peni-
cillorum
uſus depro-
batus.

10. Turundarum igitur, penicillorum, & ſpleniorum
uſus per ſe in vulnere curatione, & non niſi tribus i
am enarratis caſibus, aliunde deſumpta occaſione, inu
eſt, imò noxiuſ, omninoque ablegandus. Partem en
comprimunt, ac diſtendunt, eidemque ſunt oneri, unde
ad commouendam ſluxionem ſunt idoneæ pure, & aff
xu materia imbibitæ; & partem diſtendunt; & mala co
cepta qualitate vulnere quam maximè efficiunt. Hoc
ſuper habent, quod pus, & imbibitione, & obſtruendo p
tius ſupprimant quam euacuent; niſi ſint cannulatæ. Hi
Hip. 5. Epid. in Maſſilienſi, cui curus onuſtus ſuper o
ſtas inductus coſtas confregit, reprehendit medicos, qu
inductis penicillis, pure retento, mortem induxerint. Hi
lib. de ulceribus in principio impeditum effluxum pu
per turundas reprehendit, & paſſim per totum illum
brum videre licet nullam penicillorum, ſpleniorumue p
curatione mentionem feciſſe: ſed illitionum, & inſperſi
num liquorum; cum eorum alioqui in fiſtularum curati
ne mentionem fecerit. Libro quoque de vulneribus capi
tis aperte linamenta reprobat, niſi ad amplem reddendu
vulnuſ, quando in oſſe operari oporteat. Vnde abſolu
ea in capitis vulneribus reiſcit dicens: Vlcus in capite ut
lo humore humectare conuenit, ac ne vino quidem, neque
cataplaſmate conregere, neque linamentis curationem fa
cere. & infra: At in reliquo capite vlcus neque liname
tis, neque cataplaſmatis, neque deligatione curare apor
ſi non & ſectiōne opus habet. quin nec lib. de fracturis,
articulis, ubi de fractis & luxatis agit cum vlcere, vlla
ſpleniorum aut turundarum facit mentionem. Neque
tam quæ ad uſum turundarum confirmandum afferuntur

aliquid concludunt . Quod enim per huiusmodi in cauis
vulneribus dicunt parandam esse viam exitui puris , ne eo
retento vlcus ferinum reddatur , aduersus eos concludit ; ex
sensum potius exitui puris via occluditur , quo retento &
mala qualitas in eo concipitur , & fluxioni maiori ad par-
tem laborantem datur occasio , & partis vulneratæ disten-
sioni ; vnde & dolores , & inflammationes , & retenta mate-
ria , & præteritis halitibus eleuatis , febres non rarò excitantur .
Addere illud certè possumus turundarum , & spleniorum
ac impositione protrahi morbos ; quod tamen aliquibus
non displicere video dum enim splenijs vulnus replent æ-
quorum crumenas exhauriunt . Non igitur splenijs , & ten-
sionibus , sed delellis , replendo vulneris cavitatem , exitus puri , para-
tur , sed impeditur ; si verò vulnus vacuum relinquitur , ma-
teria purulenta nullum reprensus impedimentum facile ef-
ferre potest . At dicet quispiam si turundæ tot mala inue-
niunt , quomodo ex ipsorum vsu tot vulnerati sanitati resti-
tuntur ? Natura medica morborum est , & robusta erro-
res corrigit ; cumque frequentius solvatur vulnus & dete-
atur , diutius in cavitare non retinetur sanies ; & quam-
vis maior puris quantitas generetur , expurgatur tamen ,
& adiacentes partes puriores redduntur , vnde succrescit
caro , & tandem fit partium agglutinatio , & cicatrix . At
ex nostro hoc medendi modo natiuus calor vegetus rema-
net , non dissipantur spiritus , melius naturales actiones
celebrantur , & subinde minor excrementorum , & pu-
ris quantitas generatur , caro bona citius succrescit ,
facilior fit agglutinatio labiorum , & magis , æqua-
lis , & denique pulchrior cicatrix , & sine cavitare

Vulnera

II. Exijs , quæ hæcenus dicta sunt , facile colligere pos-
sumus , quod licet in curandis vulneribus multæ sint in-
dicationes curatiuæ vniuersum , glutinandi , suppurandi , car-
nem generandi , cicatricem inducendi ; in duos tamen
opos per modum hunc curandi propositum reduci , con-
curandorum in noua hac curandi
ratione indi-
cationes .

seruationem, & robur caloris naturalis; cuius proprium est
 ea, & alia similia munia perficere; atque in remotionem
 eorum, quæ impedire, & irritum facere illius opus possunt.
 quamuis etiam actione hac calori naturali & eius actioni
 succuratur, & ijs, quæ illius actionem impediunt, illumque
 debiliorem reddant; quamuis in ijs sæpe ope medici natu-
 ra indigeat; vt cum peregrina corpora, quæ in vulnere fue-
 rint maligni operatione sunt auferenda; quando distantia
 labia, si conglutinare oporteat, ad mutuū contractum de-
 ducuntur. Vt verè affirmare possimus Medicum in cu-
 randis morbis nullis minorem partem habere, quam in cu-
 randis vulneribus. In curanda enim febre quamuis in om-
 nibus operibus concurrat natura, dum tamen medicamen-
 tis materiam calori febrili subtrahimus, dum sanguinem
 secta vena euacuamus, dum refrigerantibus calorem fe-
 brilem extinguimus, operari vere medicum dicemus. At
 solutam unitatem nullum tollit medicamentum, siue sim-
 plex sit, siue cum cavitare, sed quicquid necessarium est,
 natura perficit, nisi impediatur: & propterea dicebat Gal.
 4. Meth. 3. siue vulnera simplicia sint, siue cum cavitare,
 si quis diligenter æstinet, ex fugiendis, & prospiciendis ijs
 quæ naturæ officiant, sanatio perficitur. At hic videmus
 secundo scopo Galenum intentum, remouendi impedi-
 menta vniuersi vulnerum, nullam potioris fecisse mentio-
 nem roborandi, fouendi, atque conseruandi naturalis calo-
 ris, qui præcipuum est instrumentum ipsius naturæ. Sci-
 mus enim incisa cute, & naturali tegumento, quo natura-
 lis calor per omnes partes dispersus continetur, imbecillum
 reddi naturam, partis illius debilitato calore, illi in operi-
 bus inserviente, tum dissipata eius substantia, tum occur-
 su qualitatis extraneæ ambientis, quem antea non fuerat ex-
 perta. Vt mirari non parum subeat, quomodo Galen. de
 ijs, quæ ex imbecillitate caloris proueniunt, adeò fuerit sol-
 licitus, remedia excogitans, quæ ichores & genita excre-
 menta absumerent, causam verò generationis ipsorum ne-

Galenus
 nullam ca-
 loris natu-
 ralis fouen-
 di in vul-
 nerum in-
 dicationi-
 bus habuit
 rationem.

lexeris; vt proinde crediderit, curationem nullam vulne-
rum transigi posse sine vsu exsiccantium, & detergentium;
et eo etiam deuenierit primo Meth. 4. vt asseruerit, debere
uiusmodi medicamenta vndique vulneris partes tange-
re. At enimvero id faciendum esset, quia ob imbecillita-
tem caloris in dies multa generantur excrementa ex cute
naturali operculo aperta, & quotidie arte parato, soluto,
erecto vulnere, spiritibus dissolutis, & ambientis frigidi-
tate illi inducta. Quod si hoc fugiemus, tegumentoque
pro spirituum dissolutio impediatur, & externa refrige-
ratio, foueaturque illo, paucissima producentur excremen-
ta & bene disposita, quæ aut per insensibilem habitum, vel
insensibiliter per effluxum, vt dicemus, paratum facile ef-
fluent. cum vero diffusio caloris, & spirituum, & refrige-
ratio illius, & partis, sit ex naturali tegumento inciso, cum
subito illud refarcire nequeamus, illius loco aliquod arte
erit parandum, quod ad naturalis conditionem accedat,
sed vt suppleat caliditate aliqui præualens.

12. Vulnere licet passim à Gal. in simplicia, & com-
posita diuidantur, hæcque caua appellet; certum tamen e-
ssam est, quæ simplicia dicuntur itidem etiam caua esse,
cum in labiorum disunctione necessarium sit cavitatem
desse, cum ensis ad penitiora peruenerit; sed simplex dici-
tur, quia neque cutis, neque caro deficit, & per simplicem
labiorum unionem cavititas repletur, & nihil amplius rema-
net nisi, vt appositæ partes glutinentur. at veri caui vul-
neris cavititas non potest repleti, nisi per nouam carnis ge-
nerationem. Duo hæc genera vulnereum quamuis dissi-
milia sunt, & in aliquibus diuersam, vt dicemus, habeant
curationem, in vno tamen conueniunt, quod præcipua cu-
randi in vtroque ratio & indicatio posita sit in fouendo
calore naturali tegumento aliquo non multum dissimili à
tegumento naturali cutis. In qua re in vniuersum pro-
ponenda erit generica curandi ratio, & tegumenti genus
genericum; vt more nostro exceptiones, & cautiones, ani-

Vulnera
oia sunt
caua.

Vulnera
omnia cur
diuidantur
in simplici-
cia & ca-
ua.

mauerfionesque addere possumus. mox verò curatione particularis respectu varietatum similiarum partium, & organicarum, à quibus magnam etiam varietatem mod curandi defumendam docebat Galenus 3. Meth. 19. distinctè addeinus suas semper in curando exceptiones, cautiones, & animaduersiones more nostro.

**Vulnerum
simpliciū
in carne
tio.**

13. Oblato itaque vulnerato sano alioqui & boni habitus, in quo neque incisum sit vas aliquod magnum, neque neruus latus, sed in carne simplici facta sit continio; nisi tantum sanguinis effluxerit quantum expedire videbitur, vt & vulnus siccius reddatur, fluxionisque tollatur omnis occasio, permittendum erit, vt effluat; mox vero suppressendus erit; quod facillimè obtinebitur, cum supponamus ex capillaribus carnis venulis venire, vel si vis filis, aut intinctis in vino aliquo austero, aut adstringente, vel aqua simili mox diligenter vulnere emundato; ne quid inter vulnera contineatur, adducenda enim labia ad mutuū contactum, vel futura, vel glutine hinc inde colligatis labijs. Scito deligatione & bene aptatis fascijs id etiam tentari, quas deligationes agglutinatiuas appellare solent; sed quoniam eorum tantummodo vulnorum labia adducta conseruare potest, quæ per longitudinem musculorum sunt inflicta, aut leuiter per obliquum (cum enim transuersa sunt, deligatio non sufficit, sed, vt dicebat Galenus 3. Meth. vltimo, tum futuris, tum fibulis in his vtendum est) tum etiam quod in solis artubus vt deligatione possumus, quoniam in opere peragendo cernere non possumus, quomodo labia se habeant, & num labia decenter sint disposita; præterquam quod periculum etiam imminet ne dum fascia circumuoluitur, & labia constringuntur, lintei aliqua pars corrugata intra vulnere labia comprehendatur, non multum in vsum ducendam censerem, aut certe multo rarius. Labijs igitur ad mutuū contactum similibus remedijs deductis, conuenienti tegumento vestienda erit pars: & quamuis satis sit fouere naturalem calorem, &

borare, aut corpulentia, aut qualitate; eligibilis tamen
 erit, si actionem naturæ agglutinandi adiuet exsiccanti
 facultate cum aliqua adstrictione, quo defluens sanguis pro
 vulneratæ partis nutritione ab omni superflua humiditate
 expurgeretur, & ad quandam visciditatem deducatur, vt fa-
 cile fiat gluten, & labia facilius connecti possint. Tale qui-
 em medicamentum sit resina terebinthina, vel abietina;
 quibus, si fluidiores fuerint, addi poterit cera: aliqua portio
 et consistentiam aliquam. Tachamacha etiam ad hunc
 sum erit maxime accommodata; & vt melius extendi pos-
 sit, emollietur cum aliquo oleo eiusdem facultatis, vt oleo
 e momordica, vel hypericino completo pro quarta vel
 quinta parte: Balsamum peruanum conueniet; si molle fue-
 rit, cum cera ad consistentiam deducetur; si album giūmo-
 rum emollietur, vt Tachamacha. vt & succus contentus in
 olliculis vlmī incrassatus. placet & ceratum Barbarum, &
 almeum. Placet magis Tachamacha cum cerato de beto-
 lica composita, cum leui portione olei de momordica. Pa-
 rari præterea poterunt ex arte ex vulnerarijs herbis, sym-
 hyro, ophioglossō, faniacula, pilosella, polygono, bistorta, &
 milibus bene coctis, & per fetaceum tractatis, additis aloë,
 arcocolla, sanguine draconis, subtilissimè puluerizatis &
 resina terebinthina, & abiegna exceptis. Horū aliquod extē-
 detur super linteam lineū bene contextum, longitudinis, &
 latitudinis, vulneris magnitudini correspondentis, ita vt
 vulnus tegat, & aliquid etiam de adiacentibus partibus ap-
 prehendar. Deinde illi superponentur tot lintea duplicata
 vel triplicata, quot satis sint ad fouendum calorem natu-
 ralem partis, & ad arcendas iniurias aeris ambientis. Inde de-
 gario retentiuā adhibenda est.

Nunc instituti mei est, animaduersiones & cautiones ad-
 dere, & more meo exceptiones regularum apponere.

In vulnere

14. In simplici hoc vulnere non statim sistendus est san-
 guis fluens, sed considerata quantitate effluxi, priusquam nō statim
 ad medicum veneris, & corporis habitu, & vita antea, sistendys.

**Sanguine
fluente ex
vulnere nō
esse vulnus
cōsuendū.**

**Ante vul-
nerū cura-
tionē pere-
grina cor-
pora aufe-
renda.**

**Fasciarū
& deliga-
tionū quā-
ta utilitas,
& varietas**

**Fasciarū
latitudo va-
rietas &
qualitas.**

permitteremus sanguinem effluere, vt prudentiæ medici vi-
sum erit. sic enim, & siccior, & gracilior reddetur, minu-
apta inflammationi, & fluxioni.

15. Hinc reprehendēdi sunt, qui vulnus cōsuunt fluen-
te adhuc sanguine; vnde inter adducta labia collecto san-
guine, concreto, putrefacto, & suppurato inflammatio,
producitur, & agglutinatio impeditur.

16. Antequam etiam veræ curationi manum appo-
namus, peregrina omnia corpora, pili, grumi, & similia in-
tra vulnus contenta auferenda sunt, & abstergenda vel lin-
teo, vel molli lana, vel xylo, stylo aduolutis, vel etiam si
opus sit vino subdulci calente.

17. In vulnorum deligationibus, & fasciis parandis
quanta adhibenda sit diligentia, & quanti fecerint duo illa
lumina Hip. in lib. de officina med. & Gal. ibidem & lib.
de fasciis ostendunt, vt non solum in ijs exposcant aut ag-
glutinationem, vel retentionem, vel expulsionem, & vt tu-
to finem iurentum ex ea obtineri possit, aut ex ea nihil in-
commodi eueniat, sed etiam vt aspectu sint incunda:
quam quidem elegantiam in omnibus etiam artis operi-
bus attendendam præcipiebat Hip. quapropter in ijs ali-
quantisper erit insistendum, & primo vt adducta labia
conseruare valeat; firma esse debet, & valida, non fragilis
& lacera: vnde Gal. 3. Meth. c. 4. dicebat. oportet au-
tem, quod circumiicitur, neque molle nimium sit, neque
algæ modo fragile, quò tuto contineat, sufficientemque
habeat latitudinem; quam communiter statuunt quinque
digitorum transversalium in femore, quatuor in crure,
trium in brachio, & vnius in digito.

18. Varianda tamen erit in latitudine pro vulneris
magnitudine: neque enim vulnus solum comprehendere
debet, verum etiam aliquid sanæ partis tam in superiori,
quam in inferiori parte, ne vulnus tanquam zona vinciat,
quod importunum esse docebat Hip. 3. de fract. T. 8.

19. Sufficientem habeat longitudinem, vt toties mem-
brum

rum circumdare possit quoties opus sit ad labia adducta conferuanda.

Hyberno tempore, & frigida aut ventosa constitutione pluribus circumuolutionibus uti oportet; ut pars laborans melius ab ambientis iniurijs protegi possit, quamuis si tridicatis lintheis more nostro vulnus protegatur non adeo necessaria erit multiplicata hæc circumuolutio.

20. Sit æqualis, & eminentijs carens, ne inæqualem reddant deligationem. Vnde Gale. lib. de fascijs dicebat: Careant quoque eminentijs, ita ut nullas oras habeant, à lateribus aut contextas, aut inuersas, confutasque: neque etiam fila aut fibræ extant: ut enim quæ eminent inæqualem reddunt deligationem; ita, quæ extant, impediunt, ne expedite circumducatur.

21. Ne autem detrimentum aliquod afferat fascia, mollis esse debet, ne premat nimium duritie; & leuis, ne sit onerosa; futuris inæqualibus careat, & alijs eminentijs, quibus possit comprimere, & dolorem inferre.

22. Sit albi coloris; ut quod ex vulnere perfluit possit facilius obseruari.

23. Munda sit, & tenuis; sordida enim turpitudinem affert; & tenuis, ne circumuolutura nimium affert tumorem. Hinc Hip. lib. de ijs, quæ in offic. med. sunt, sect. 2. T. 9 de fasciæ mundæ tenues, leues, molles. & l. 29. linthea paranda sunt leuia, tenuia, munda, mollia, lata, futuris carentia, & eminentijs, integra, idest, firma, ut possint extensiones, ferre. & per linthea Gal. ibi intelligit fascias. quod lib. de fascijs confirmauit.

24. Parata fascia apta deligatio est instituenda, quæ oras adductas perfectè conseruet: quod ut fiat, ex duobus initijs circumducendum est vinculum, ut monebat Gal. 3. Meth. 4. & Celsus lib. 5. c. 26. plicari enim debet fascia ex utroque capite ad medium, ab opposita vulneris parte initium sumendo, primaque & secunda reuolutio supra vulneris labia deduci debet.

Fasciarū
longitudo
quæ.

Fasciarū
qualitas
quæ.

Fasciarū
substantia
quæ.

Fascia sit
coloris al-
bi.

Fascia sit
munda &
tenuis.

Deligatio
quomodo
facienda.

Deligatio

25. In quâ operatione illud animaduertendum, vt fascia aliquid de sana parte vtrinque comprahendat. neque; eadem vtrinque; nimis deligandum est vulnus tâquam zonac. Sic. n. nec perfecte aut labia deduceret, aut cõtineret, doloremque; inferret.

26. Non sit nimium laxa deligatio quia inquit Gal. 3. Deligatio Meth. 4. nihil efficeret: non enim adducta labia continereque; arcta, ret; neque nimis arcta, quia comprimendo dolorem inferreque; laxa ret.

nimis.

27. Anotauit Celsus lib. 5. c. 26. si ab altera parte caro magis recesserit, fascia ab ea magis attrahetur; si aequè ab vtraque; transuersè comprahendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, media primum iniicienda est, vt tamen in vtramque partem ducatur. Talis deligatio non solum adducta labia conseruat, sed etiam partem à fluxione defendit.

**Puluilli
triangula-
res maxi-
mè vni-
oni
inseruiūt.**

28. Auicenna 44. Tract. 1. cap. 8. pulcherrimum ligandi vulneris modum tradidit, quo, si in coniungendis labijs quis vtatur, aptissimè id præstabit. eadem deligandi ratione vtitur. ex duobus enim iniitijs circumducit vinculum. verum in maioribus vulneribus, vt melius fiat, & conseruetur labiorum adductio, excogitauit duos puluillos triangulares, & vtrinque vnum apponebat, ita vt amborum latera secundum vulneris longitudinem disposita, quæ proinde vulneris longitudinem excedere oportet, se respicerent; inde ex duobus iniitijs deligabat. Et magis faciunt ad labiorum adductionem triangulares isti plumaceoli, quam si quadrati essent, aut si liutea multipliciter plicata apponerentur; quia fascia super triangularis plumaceoli angulum ducta impellit plumaceolum vna cum subiecto labro ad contrariam partem, & vt idem dicebat Auicenna, coarctat super fissuram tantum, quod non sic fieret, si quadrati essent. Quinimo in nostra hac curandi ratione tegumenti vicem gererent plumaceoli: parantur enim ex lana molli, gossypio, aut tenui stuppa liuteo tenui excepta, aliqui se hanc intentionem adimple-

melius credunt, si hosce puluilles aliquo liquore maderint, puta si vino, vel oxyeriato, vel albo oui, vel aliquo nilis facultatis medicamento illinierint.

29. Verum in adducendis labijs vix animus conquiescit sola deligatione; sed si linteo, quod pro operimento adhibendum esse diximus, in aliquo ex propositis medicamentis agglutinantibus intincto, & vulnere superposito detratio hæc Auic. superaddatur cum plumaceolis, optimè consilium existimarem.

30. Sutura in genere hoc vulnere multo frequentior, sed quoniam pro ratione vulneris, & partis laboranda variauda est forma consueudi, in modo labiorum variatitate, in acus forma, in punctis disponendis, in filialitate, & aliis; non immorabor in ijs tradendis, cum nec limites cautionum excedant. Illud primum animadverto, non esse consuenda labia, ubi, per distantiam labiorum cauum adeo vulnus cognouerimus, vtnisi ex fundo sciente carne repleatur cavitatis ad facilitanda cicatricem, ratio sperari non possit: subrescente enim in cavitatene, multa inde incommoda nascuntur, & in irritum abit noster labor cum dedecore artificis, & duplici dolore rotantis.

31. Non placet Celsi consilium in sutura faciendâ hoc simplici in carne vulnere, quod ora vulneris ex toto non coniungantur; vt si quid intus humoris concretum sit, possit emanare. species enim vulneris ad hoc nos cogit: & si non ex toto coniungantur, quomodo duntur ad contactum mutuum labia, & quomodo agglutinati rectè poterunt; & quomodo non deformis inducitur atrix.

32. Semper cauendum erit in hac operatione, ne venæ, nerui, tendinesque, acu traiciantur.

33. Sed quid agendum, si carnosâ pars musculi tendilato contegatur? si enim solam curam consueuimus, distenduntur musculi partes inconglutinatæ permanent; si musculum

Labia vulneris quomodo adducenda.

In futuris quæ spectanda.

Sutura non adhibenda in multum hiante vulnere.

Celsi sententia refutata de sutura faciendâ non vniuersè.

Sutura ubi non videtur.

Sutura quomodo faciendâ in musculo lato tendine aperto.

cum

eum tendine consuamus, conuulsionis periculum acutè dir-
traiecto quasi certum incurremus : Gal. consilium sequi-
mur 3. de compos. med. sec. genera, c. 2. denudandus erit
musculus à tendine, & sola carnosa pars sine tendine vn-
cum cure erit suenda.

Sutura cru-
entis quan-
do adhibē-
da.

34. Quamuis autem non statim flaente adhuc sangui-
ne ad futuram labiorum esse deueniendū iam docuerimus
sed expectandum effluxus sufficientem sanguinis quanti-
tatem, & vt vel ex se, vel arte supprimatur : exercenda ta-
men erit hæc operatio, dum recens adhuc est vulnus, &
cruentum, nec labia adhuc rigida euaserint : nisi enim tra-
henti facile obsequantur, sutura cum ipsis inferetur, & do-
lores superuenient, & forsan caro à filo abrumperetur. Et hoc
est, quod Celsus de sutura & fibulis loquens dicebat. Neu-
tra enim vim desiderat : sed eatenus utilis est, qua cutis du-
centem quasi sua sponte subsequitur.

Vnionis
per fibulas
præstata.

35. In tertia ratione deducendi vulnera, quæ fibulis ar-
tigitur visitatis, non multum fortasse à nostra per glute-
ratione distinctis illud constanter affirmo ; hanc omnibus
videri mihi præferendam, quod citra dolorem operan-
suam præstet : sed in ea illud erat incommodi, quod cum
non nisi post sex horas exsiccetur, & ante exsiccationem
nullius sit vsus, & interim, nisi vulneris labia adducantur
contraherentur, rigidaque euaderent, & minimè obsequen-
tia, ex quo etiam recta vniō perfici non potest : vnde ple-
rique prius futuram adhibent, postea glutem, cui diligen-
tissimus Cæsar Magatus glutine ex arte parato, & quo
semper paratu haberi potest occurrit : cerato parato, quo
ad manus promptum semper esse potest, vt statim sine fu-
tura labijs discissis occurrere possimus. quale sit, ex qui-
bus, & quomodo componendum quomodo etiam per fi-
bularum sit in vsu ducendum, ex accuratissimo eius libro de
vera medicatione vulnorum colligi potest : adeo enim di-
ligenter rem hanc prosequitur, vt superfluum sim, si hoc lo-
co illa repeterem.

Fibularum
diligentia
ex Maga-
to sumenda

36. Vnitis aut adductis ad agglutinationem vulnerum initio labiis, quamuis in hoc curandi modo paucissima generari soleant excrementa, si tamen ob vulneris magnitudinem suspicio adsit, ne generentur excrementa aliqua, ichores, & situs inducendus erit aptus ad effluxum, & fluxu in vulnere, & tegumento erunt reliquenda.

37. Post vero ad fluxionem inhibendam, & impedientem inflammationem repellentibus utendum erit, & si videretur periculum presentaneæ affusionis humorum, intercurrentibus, quæ constringendo & refrigerando repellant, & gustiores vias, per quas fluunt humores, reddant, ut potius vino granatorum, vino austero, oimphacio, succo plantaginis, solatri, addito vino austero, aut leui aceti vel oimphacii portione, linteis in ijs madefactis duplicatis, aut triticatis, & sæpius permuratis, donec transeat fluxionis periculum in partibus adiacentibus. non virgente verò adeo indicatione, contenti esse poterimus oleo rosato simi, vel ex olivis immaturis.

38. Defensivum, quo passim utuntur ex bolo Armena, guine draconis, & oleo rosato & similibus, non omnino obatur; eum enim paulo post exsiccat, & hæreat parti, non nisi vi possit detrahi, quin & poros cutis obstruens fororem non naturalem in parte, cui hæret, accendit, potius fluxioni præbet occasionem, quam ipsam prohibeat.

39. In huiusmodi vulneribus simplicibus, si sanis & benigne habitis corporibus contrigerint, non semper mittendus perfectam venam sanguis; nec semper purgandum, omnino tenui victu semper utendum: si enim multus sanguis effluerit, aut non multo sanguine corpus refrigeratum esse cognouerimus, cum magnus non adsit morbus, talis imminet, ob fluxionem, & inflammationis periculum, cumque plethoram non adesse supponamus, aut nulla sanguinis missione, aut parca opus erit, quod prudenter medici erit committendum. cum autem cacochymum supponamus corpus, non semper necessariam indica-

Vnitis labiis quid præstandū

Fluxio quō inhibenda.

Defensiva cōiter visitata non multū probanda.

Vulnera in sanis simplicia sanguinis missione, purgationem, & victum quō reijciunt.

mus purgationem, aut saltem non nisi blandam ex syr. ro-
fol. manna, & similibus, cum decoctione thamarindorum
tenuis autem victus ratio in iunioribus & bene habitis sæpè
solet humores acuere, ac biliosum sanguinem reddere; &
propterea quantitas quidem erit imminuenda, at ad tenu-
tatem ducere sæpè nocuum cognoui.

Vulnorum
cauorum
duplex a-
pud anti-
quos & re-
centes cu-
randi ratio

40. Cava vulnera carnis generationem exposcunt, si-
quid telo, & vulnerante causa sit de motum, aut contusur-
ut in pus verti necessarium sit; siue quia labia adeo diss-
deant, aut rigida sint, & contracta, aut quia vulnus sit ad-
eò profundum, ut nulla arte secundum omnes partes addi-
ci possit, & id requiratur carnis generatio, qua cavitatis re-
pleatur, & ita restituatur pristina unitas; hoc ut præster
duplici hætenus via, & antiquos & recentes medicos ince-
sisse video, & omnes ex præcepto Hip. lib. de vlceribus, ut
habet: At vero recentiora vulnera omnia, tum ipsa, tum
circumstitæ partes minimè inflammationem incurrunt,
quis quamcitissimè suppuret, & pus ab osculo vulneris in-
terceptum non supprimatur: aut si quis aduertat, ut om-
nino non suppurentur, præterquam necessario, eoque pa-
cissimo pure, & sicca sint quammaximè ex medicamen-
to non molesto. Ex qua Hip. sententia, duplex vlcus cu-
in curandi modus apud antiquos, & recentiores medicos
manauit. Alij enim siccantibus medicamentis ad hoc vtur-
tur, ut quam paucissimum pus generetur, cum Hip. & Ga-
videant vulnera passim exsiccanda scripsisse. sic aqua are-
te, balsamis, & peruano, & arte facto, oleo ex herbis ei-
siccantibus facto, oleo Hispanæ, oleo hyperici officinæ
rum, & similibus linamenta illinunt, vel imbuunt, & p-
vulnus disponunt, & in profundioribus ad fundum infun-
lant, aut in angustis per turundam imponunt: & extrin-
secus linteam apponunt iisdem medicamentis refertum
randem puluillos & lintea superponunt, atque quotid-
detecto vulnere his hoc modo vulnus tractant. Alij
prius suppurantibus paris generationem promouent dig-
sti-

uio appellato, quod etiam vario modo parant ex there-
entina lota & vitello oui, addunt aliqui farinam tritici,
ollinem thuris alij; alij oleo rosato, terebentina, & cera
quis portionibus ad ignem simul ductis; alij alijs, vt in
ontusis bellico fulmine. in quibus bis in die medentes in-
stunt, donec vulnus dolore vacet, rubor euauerit, &
bia aqualia & mollia reddita sint; mox ad abstergen-
a transeunt, mundificatio vocato, vel terebentina & o-
o rosato mixtis, vel farina hordei, & melle rosato, &
ij alijs. Deinde rubente sine dolore vulnere, & medio
odo inter humidum & siccum constituto ad sarcotica
niunt, vt cavitates carne repleatur, & vtuntur pulueri-
s ex aloe, thure, iride, aristolochia rotunda, myrrha,
umia, sarcocolla; alij ex aquis portionibus thuris,
yrrhae, & aloes puluisculum ad hoc paratum habent, &
rato tum de betonica vtuntur. Variandaque hac &
atanda censent ex Galeni præcepto 3. Meth. 38. &
imo pro varietate temperamenti totius, & partis af-
ctæ, & temporis anni. & dum in vulneribus vtuntur,
s vulnere inspergunt, superponuntque fila euulsa, siue
imbibendam superfluum humiditatem, post cera-
n aliquod exsiccans adiungunt, vt diapalma, cera-
n barbarum, debetonica, & huiusmodi: quotidie au-
tem semel & bis soluto vulnere medicamenta imponunt.
ndem ad epulotica deueniunt, vt loco cutis deperdi-
catrix induci possit, exsiccantibus, & adstringen-
tis, vt exsiccata carne, & indurata, cicatrix loco cu-
induci possit, vt docuit Galenus 3. Meth. cap. 5. ad
od præstandum vtuntur cerato diapalma, barbaro, de
usa, de thutia, & similibus, aut filamentis aridis,
mbibant si quid emanauerit humiditatis, & sicca ca-
eddatur; & in hoc etiam quotidie vulnus curant,
c secundo curandi modo scimus vsum fuisse Celsum
6. cap. 26. & Auicennam, & reliquos Mauritanos;
& recentioribus plerosque,

Quæ qui-
dem reci-
pien tē sed
non æqua-
les nouo
do curādi.

Sarcoticis
nō sunt per
se adstring-
gentia mi-
serenda.

Agglutinā
tia & sar-
cotica vari-
anda pro
varietate
natura.

41. Duæ hæc vulnerum cautorum curandorum rationes cum antiquæ sint, præstantissimos habuerint & habeant sectatores, à fontibus Hip. & Gal. fluxerint, tot experimētis sunt firmatæ; nullo modo à nobis reprobari possunt, se- tanquam bonæ recipi debent. sed cum per nouum huiusmodi medendi, quotidie quilibet obseruare possit ægrutius curari, & longè facilius, citius, & cum minori molestia, quin & cum paucioribus expensis; cum breuiori tempore sanitas subsequatur, & paucissimis visitationibus indigeant, nescio cur hæc ipsa cæteris non sit præferenda.

42. Cum tamen consuetæ curandi rationes non sint improbandæ, in ijs more nostro etiam aliquid erit animaduertendum. & primò euitandus maximè erit error aliquorum qui non animaduertentes in qua re posita sit natura sarcoticorum, & qua ratione ad carnem generandam introductantur, adstringentia admiscunt; cuiusmodi est mastix, sanguis draconis, bolus armena, terra lemnia, & huiusmodi. hoc enim non parum differre docuit Gal. 3. Meth. 4. 2. de compos. med. per gen. cap. 20. glutinantia & sarcotica siue carnem generantia: quod in glutinantibus maius esse debeat siccitas, quàm in sarcoticis. quæ enim carnes producere debent, detergendi vi debent esse prædita, ut non solum siccent humiditates superfluas, sed sordes abstergant at glutinatoria neque detergere debent, neque expurgare sed potius substantiam in vnum cogere. quam facultatem habere scribit medicamenta austera & adstringentia, quibus, dum carnem produci procuramus, maximè cauendum monet, ne sordes vulneribus affigant magis, quam facile possit absolui, ut docuit Gal. 6. de compos. med. p.

gen. cap. 5.

43. In glutinantium & sarcoticorum vſu video præcantes sæpenumero aberrare; ijsdem fere in omnibus naturis in omnibus partibus vtentes: cum non omnis natura eadem agglutinantia & sarcotica exposcat; sed siccior & v-
lentior, valentiora, & sicciora; humidior, & imbecillior d-
bilio-

LIBER VIII.

31

lora, vt docuit Gal. 3. Meth. 7. à quo mutatus est Pauli lib. 4. c. 4. & Aulc. Quarta quanti Tr. 1. c. 4. & 11. 4. primi Doct. 5. c. 28. ex quibus quilibet perpenfis naris totius, & partium, ijsque consentientibus aut dissentientibus poterit colligere, quo ordine agglutinantium, & carum generantium vtendum sit. Valentioribus & ficcioribus aristolochiæ radix, & panaces tanquam valentiora conuenient: minus siccantia, & imbecilliora, vt farina hordeij, parum, thus: media inter hæc sunt erui farina, iridis pulvis, & sarcoticus dictus, & qui ex æquis portionibus myrræ, aloes, & thuris conficitur, vnguentum basilicum, ac deonica, de gummi helemi; oleum de hyperico, oleum hispanæ, & Balsama tum peruanum, tum artificialia. sed ijs mihi non est insistendum, cum sint aliena ab instituto.

44. Stuppata, quæ passim in vsum ducuntur ad sistendum sanguinem, non ita sæpe admitti debent, & non nisi si alijs præsidijs coerceri sanguis non potest, incisa vena qua magna, aut arteria: nam siccata, vulneratas partes trahunt, & molestæ, & dolorificæ euadunt, & si pars pilos fuerit, cum remouendæ sunt, non leuem inferunt dolorem, & non nisi in longo tempore detrahi possunt; potissimum cum pulueres addant constringentes, bolum armenum, terram sigillatam, sanguinem draconis, thus, aloem, similia oui albumini.

45. Vbi igitur in oblato vulnerato vrgeat sanguinis effusio excedens, cum non nisi ex vena aut arteria vulnerata euenire possit, decreto Gal. 1. Meth. 3. procurandum edigito appposito aliquamdiu sanguinem sistere per compressionem oris per sanguinem ibi retentum concretum struentem: quod si ne hoc quidem sisti sanguis possit, os suis vossellis apprehendimus atque contorquemus, quod vas carne coopertum fuerit, leuiter incisa carne vossella apprehendetur vena, vt contorqueri possit, ne assidue sanguinem effundat, interimque grunio in crustam concreto

Stuppata
ad sistendum
sanguinem
ratio in vsum ducenda.

Sanguinis
sistendi rationes.

obstruatur. moxque cato circumiacens adstringentibus
rit condensanda. Quod si aut digitus immitti non possi
ad os incisæ venæ vel arteriæ adstringendum vel obstrue
dum aliqua de causâ, vel ob naturam partis, vt cum à ceri
bro vel membranis perfluit: vel vulneris, vt cum à profun
dis admodū partibus profluit, & vulnus est angustum; vi
patens quidem est vulnus, verum ob vasis magnitudiner
eo modo sisti non possit sanguis fluens: tunc necessariū
est deuenire ad ea, quæ vasis diuisionem obstruunt, empla
stica dicta, ex leui & crassa materia consistentia, & etiam
ad adstringentia. albumen oui hac in re primas tenet
emplasticam facultatem iunctam cum refrigeratione qu
humores repellit, cui sæpe valentiora adiungi debent, bolus
armena, sanguis draconis, aloë, thus, & similia, quæ & em
plastica, & adstringentem habent facultatem, quæ admini
ta albumini pilis leporinis subtilissimis excepta, ori venarum
& artiarum apponi possunt, illud quasi sigillando: qu
nimo alia eiusdem generis, vehementius adstringen
tium, aut leui stappa, aut ex leporinis pillis eruit superpe
nenda, atque digitis aliquamdiu comprimenda, & reple
dum vulnus, si nouæ fluxionis subsit periculum deligatio
ne repellente, & comprimente sine dolore & multiplici si
peraddita; diligentia ea adhibita, quam tradidit Gal.
Meth. 4. & copiosius Auic. 4. Quarti Tract. 2. cap. 17. se
de cautionibus in hac re suo loco; nunc enim solum cau
tiones in curando cauo vulnere, quod nobis se se offeret a
initio cruentum, & cum sanguinis fluxu, quid primo si

Vulneris præstandum docemus.

caui noua 45. Oblato igitur cauo vulnere primo videndum erit
curandi ra- an convenientem effluxum habeat ad expurganda excre
tio. menta quæ in dies generantur, & nisi adsit, parari omnin
debent, aut eiusdem aut contrarij loc dissectione, aut per
turundæ dilatantis per duos aut tres dies impositionem. ei
fluitio parato, videndum, an cauitas minor reddi possit
tra impedimentum effluuij; sic enim & melius conferu
tur

ut calor naturalis, & citius repletur carne, quod fiet, potius
 tribula, & glutine: neque enim placet futura ad unionem,
 elicto aperto effluxu per turundam, ut aliquibus videtur;
 neque enim usus turundæ perseverans placet ob dictas cau-
 sas; nec etiam placet futura lata cum interstitio, ut excre-
 menta exitum habeant liberum. puncta enim & filū, ubi ad
 unionem labia non deducant, & dolorifica sunt, & sæpe cu-
 ræ & carnem dilacerant affluente humore ab initio, & in-
 nescantibus labijs, unde distractio sequitur. Hoc facto, ad
 vulneris curationem erit deveniendū. Quod fiet, primo cū
 periculo medicamento aliquo fouente calorem naturalem
 quod mordicationis insignis sit expers, mediocris consisten-
 tiæ, cuius vires non facile evanescant, sed aliquanto tēpore
 perdurēt infecto lintēolo; & parietes vulneris ita illiniātur,
 ut ad fundum vsque peruenire possit, quin si vulnus sit ma-
 gnum, filamenta eodem medicamento imbuta extrinsecus
 ori vulneris superponi poterunt: si tamen evitari possunt,
 melius res transigetur: & post tegumento aliquo ex pro-
 positis medicamentis, aut adducendis super linteo extenso
 parato tegendum erit vulnus, raroque ut diximus, erit dete-
 ndum, ne calor naturalis partis debilitetur, spiritusque
 evanescant. Proximæ partes rosaceo inungi poterunt hye-
 ne calido, frigido æstare; aut peria linea oleo eodem in-
 lecta foveri poterunt. Postremo addendi puluilli, aut du-
 licata triplicataue lintea tegumento ad conservandum
 naturalem calorem erunt superponenda: postremo fascia
 longa ad retentionem deligandum erit vulnus; in conue-
 nienti deinde situ constituenda erit pars vulnerata, ut citra
 dolorem, quantum fieri possit, iaceat, commodumque ef-
 fusum ad genitam materiam excernendam habeat. Et
 diebus proximè subsequētibz partibus circumiacenti-
 bz repellentia cum corroboratione erunt adhibenda, & se-
 quens etiam commutanda.

46. Quale autem esse debeat medicamentum, quo per-
 athulam vulneris parietes & profunditas sint inungenda;

C quam.

medicamē quamuis satis esse deberent, quæ pro simplicis in carne vul-
ta imponē neris curatione proposita sunt superius: cum tamen etian-
da cauo particulare aliquod & proprium exposcant caua vulnera
vulnere in illis aliquod erit animaduentendum. Terebinthina &
quæ & qua abiegna lacryma primas in ijs partes habent; ijs tamen
lia. permisceri poterit oleum hyperici commune, & aqua ar-
dens, præsertim si vulnus sit profundius, sic enim facilius
ad vulneris fundum substantia medicamenti perueniet, ea-
demque ipsa robur caloris naturalis augebit.

medicamē 47. Placet tamen in magnis vulneribus quatuor ijs, au-
ta à tota aliquibus, aliquid etiam eorum addere, quæ à totius substantiæ
substantia tiæ proprietate calorem naturalem addiuvant ad propri-
addēda sar oleunda munia, vt oleum Hispanæ, oleū de hyperico M-
cotica. gati, balsama artificialia, aqua balsami, Peruanū Balsamū

48. Neque tamen placet in cauis ijs vulneribus tenui-
Olea tenui-
simis ijs oleis solis vi: cum enim ob tenuitatem partiur-
istima cras-
facile euanescent, & in auras abeant, aliquo crassioris sub-
stantiæ, & tenacioris erunt alliganda; erit tamen semper te-
fioribus li-
stantiæ, & tenacioris erunt alliganda; erit tamen semper te-
ganda. rebinthina vel abiegna lacryma in dupla aut tripla quantitate;
vt terebinthinae clare, vel lachrimæ abiegnae vnc. ol.
Hispanæ vii. m. vel Terebinthinae vnc. m. balsami Peru-
uani, & olei Hispanæ an. vnc. vel lachrimæ abietinae vnc.
m. balsami artificialis vnc. m.

Contusis. 49. Quod si vulnus fuerit cum insigni carnis contusio-
ne, prius vi poterimus medicamento aliquo carnem faci-
suppurātia-
ne, prius vi poterimus medicamento aliquo carnem faci-
ad suppurā-
tionem ducente; quale est, quod digestiuium a-
pellant lotum, quale tripharmacum, vnguentum bali-
cum, & id, quod ex oleo rosato terebinthina aqua malu-
rum lota, butyro recenti, & cera paratur, & similibus.

50. Eodem tamen tempore foudendus erit calor natu-
Dū suppu-
lis partis emplastro aliquo circumstantibus partibus appo-
rātibus vi-
sito. vt quod paratur ex farina hordeacea, fabacea, pulueri-
mur, calo-
florum camæmeli, rosarum rubearum, diptamini cretentis
ris natura-
anethi, oleo rosaceo, hypericino, terebinthina, & vino rubi-
lis est habē-
subadstringente. Quin & ex Tachamacha, gummi elen-
da ratio. thul-

thure, myrrha, rosis rubeis siccis, terebinthina, oleo rosato
omphacino, hypericino, parati ad idem emplastrum pote-
rit sane quam accommodatum, si inflammatio absit.

51. Quandoq. via deligatione, & medicatione replendi
carne vulneris indicationi satis fieri potest, aliquando tamē
iterum, & tertio soluendum est, quatuor aut quinque diebus
interpositis, ad abstergēda excrementa, si crassiora fuerint, **Vulnus de**
aut si aliqua carnis adfuerit cōtusio saniem copiosam **tegendum**
pro- **quorics.**
ducens, siue pruritibus subit nimium molestus, aut alia ali-
qua ex enarratis causis. Et in eo casu maxima vtendum
erit diligentia, ne calor naturalis iacturam patiat, aut dis-
solutione, aut refrigeratione ab ambiente ducta: in carne
autem si adhuc repletum non fuerit vulnus, eodem modo
in eo tractando, & ei succurrendo, ac ab initio factum est tā
in medendo, quam in tegendo, & ligando vulnere.

52. Repleto carne vulnere, vel parum deficiente cavi-
tate, facta deligenti absterfione partium adiacentium, & **Vulnere re**
vulneris exsiccatione ex mundo linteo, aliquo vtendum e- **pleto carne**
rit epulotico, qualia sunt cerata superius proposita, vt dia- **que appo-**
balma, de cerusa, de thuria, Barbarum, & huiusmodi, & in- **nenda quā**
erim tegendum eodem modo erit vulnus, & sperandum **do cicatrix**
est prima aut altera medicatione cicatricem fore contra- **inducēda.**
flam.

53. Sed quomodo procedendum erit, si vulneratus effe- **In vulnere**
atur consueta illa curandi ratione curatus? si in primis **alio modo**
vultus aut quatuor diebus ab inflicto vulnere versetur, ea- **in princi-**
dem via erit procedendum, quia prater imbecillitatem cap- **prio curato**
oris ex diffatione, ob discissam cutem tegentem & illum **quomodo**
continentem, neque ab ambiente frigiditas magni momen- **procedēdū**
ti est introducta, nec puris multa illa generatio est introdu-
cta, ita vt necessarium sit sæpius vulnus soluere ad expur-
gandam materiam; tegumentum tamen erit aliquanto
alidius, & emplastrum ad roborandum apponendum.

54. Quod si stuppatæ aut turundæ ex stippe appositæ **Quod si**
venerint, potissimum si vulnus ex ijs fuerit, quæ punctum in- **stuppate,**

aut turunda in usu
venerint. flicta sint, eas non remouebimus, nisi ubi puris generatio-
nem incipere cognouerimus, quod circa quartam fieri solet
& tunc instituto modo procedemus.

55. Quid si adhuc diutius curatum vulnus fuerit anti-
quo more, ob idque hebes, & piger euaserit calor naturalis
partis; si quidem vulnus fuerit patens, neque multum pro-
fundum, ut sunt ea, quæ cæsum infliguntur, neque pars sit de-
fecta, aut etiam læsa; quæ ab aliqua puris copia diutius in
eo contenta possit noxam contrahere, ut contingeret, si vul-
nus esset in capite cum detectione aut læsione membrana-
rum, vel etiam cerebri, & orificium possit deorsum respice-
re, statim quoque nostro hoc modo curari poterit: nam
paulatim ob tegumentum validior redditur calor, & quod
à principio non poterat ob imbecillitatem, mox perficiet;
nec interea suppressi excrementa possunt in effatu di-
gna quantitate. Laudarem tamen aliquanto frequen-
tius detegi vulnus, ad cavitatem, & labia expurganda, sed
diligenter curandum, ut citò operatio illa exerceatur, &
cum cautione, & tegumentum esse debet aliquantò vali-
dus, & plura lintea superponenda; habito tamen semper
respectu temperamenti & constitutionis tum corporis, tum
temporis.

56. Si vero angustum fuerit vulneris orificium, ne-
que deorsum commodum habeat effluxum, aut impurum
fuerit corpus, aut os aliquod læsum sit, aut nobilis pars de-
fecta, non est sperandum naturalem calorem ad pristi-
num statum posse reduci per tegumentum; & ex multa
puris generatione, si non expurgetur, mala non parui mo-
menti insequi possent: idcirco cum præstantissimo Maga-
to censeo, in eo casu satius esse sequi curationem per tu-
rundas; sed tunc etiam fistulatis turundis impositis, ut ma-
teriæ exitus pateat; præstaretque rarius vulnus detegere,
puta tertio quoque die; sic enim & minus dissoluetur calor,
& ambientis frigiditatem magis effugeremus; & media via
incederemus.

57. Ac quamuis & conseruatio caloris naturalis partis, & spirituum, ne dissipentur, & nouæ fluxionis periculum omnibus persuadere possint, opimum esse consilium, ratio vulnera dissolvere; quia tamen aliquando aliqua occurrunt; quæ necessitatem imponunt medicis soluendi vulnera, quæ erunt exceptiones regularis huius curationis, quæ à nobis potissimum in ijs libris traduntur; breuiter casus proponendi erunt, in quibus, & solutio, & detectio vulnerum erit admittenda, & qua cautione id sit præstandum.

58. Et primum detegendum erit, si manuali aliqua operatione curationem opus habere cognouerimus.

59. Aut quia, illis sic poscentibus aliquid manu demendum aut addendum sit.

60. Aut quia medicamentum aliquod apponendum sit, aut addendum, aut mutandum.

61. Aut si aliquid aut adnatum, aut occursum in vulnere cognouerimus, quod integram sanationem impedire possit, vt in carne spongiosa succreta: tunc enim soluendum vulnus, vt medicamentum apponi possit, quod eam exsiccat & auferat, alioqui cicatrix induci non posset: potissimum si calor maiorem eorum partem præstiterit, quæ perficere deberet, vt ob id tegumenti cesset necessitas.

62. Similiter detegi debet, & sine noxa multa potest vulnus, vbi ob superfluum humiditatem carnis in cavitate genitæ cicatrix induci non potest: necessaria enim tum est exsiccatio vulneris, & medicamenti appositio, quod cicatricem inducere possit siccando, & adstringendo carnem.

63. Quin si ob cacochymiam corruptio in parte, gangræna, aut inflammatio orta sit, solutio erit facienda: fluxus & sanguinis effluuium ex vulnere maxime indicat soluendum esse vulnus, & detegendum ne vires prosternantur, vt oportunis præsidijs fisti possit.

64. Gangræna & sphacelus id etiam persuadent, ne & pars emoriatur, & reliquas partes, tum & totum ad-

Detegenda
sapius vul-
nera quan-
do.

Vulnera
detegenda
in operatio-
nibus.

Aut vbi ali-
quod de-
mendum.

Aut si mu-
tandū me-
dicamentū.
Aut si quid
enatū quod
sit auferen-
dum.

Aut si caro
enata sit in
spon-
giola.

Aut ob g.

teritum ducat; postulant enim præsentanea remedia, sacri-
ficationem, abscissionem, inuisionem, & similia in quibus
manuali operatione opus est.

Aut putre-
do, sordes,
& vermes
geniti.

65. Ingens putredo, abundantia fœdidorum exteremē-
torum, & inde geniti vermes, detectionem vulneris etiam
indicant; potissimum si cacochymia subsit, aut aeris inquī-
namenta aliqua: inde enim imminet suffocatio caloris in-
nati, & partis corruptio. Itaque manuali indigent abster-
sione, & medicamentis validè abstergentibus, & validiori-
bus exsiccantibus ad cohibendā putredinem. quin & vt frā-
di & mali vapores, quos à putrida illa materia eleuari ne-
cesse est, liberum habere possint exitum.

Aut impe-
ditus efflu-
xus.

66. Si fortè etiam effluxus paratus commodè officium
suum non faciat, aut errore medici, aut ob situm partis, aut
quod à grumo aliquo via sit obstrueta, soluendum erit vul-
nus, vt commodiorem inducere effluxum possumus, aut
impedimentum auferre.

Et partis
inflamma-
tio.

67. Inflammatio partis, cui non licet nisi per vulneris
osculum subuenire, quando pars ex præstantioribus fuerit,
solutionem postulat.

Retentum
& corpu-
sculum.

68. Retentum quoque corpusculum aliquod, quod pri-
mis diebus extrahi non potuit, & siue manuali operatione
aut medicamentorum ope extrahi non potest, quoniam ex-
pectandum non est, vt vna cum pure à natura propellatur,
vt quæ necessaria sunt, aganius, solutionem requirit.

Vt & osse
paratum.

69. Idem dicendum est de osse à natura separato, non
tamen extra pulso, & ideo aut carnem pungente, aut efflu-
xum obstruente.

Quin &
abscessus.

70. Abscessus quoque superueniens, si natura per se enin-
cere non possit, aut commodum materia collecta exitum
non habeat: sed manuali operatione aliqua opus sit, solu-
tionem exposcit.

Vt & vehe-
mens dolor
anodynīs
mitigandus

71. Vt & dolor vehemens obortus, si anodynīs sit mi-
tigandus, ad idem cogit.

72. Erosio, & ingens pruritus adeo quandoque vigent,

et ad ea demulcenda cogamur vulnus soluere, & detegere, Quin & e-
d abstergendam mordicantem materiam, & demulcen-
um pruritus. rosio &
pruritus.

73. Hæ omnes detegendi vulneris occasiones planè o-
cendunt, non ratione curationis vulneris per se id fieri in ca-
so vulnere, sed ob superuenientia symptomata. Vulnera
soluèda nò
per se, sed
per alia.

74. At sine ijs, donec carne repletum fit, nulla nos co-
git necessitas vulnus soluere: quamuis non adeò hac in re
in obstinatus, ut carne ex parte genita, & inflammationis
ericulo superato, si quis vellet eo tempore in agrotantis,
el assidentium gratiam semel aut bis vulnus soluere illud-
ue abstergere, nouumque tegumentum apponere, potissi-
mum, si fætor insignis adsit, aut pruritus ingens, aut quip-
iam, quod impediatur carnis succretionem, non id concedã;
Cæteroqui
raro soluè-
da.

modò, dum vulnus tractatur, diligenter ab iniurijs ambien-
s protegatur.

75. Carne vulnere oppleto, licet quandoque eueniat, ut Vulnera
iam cicatrix per se obducatur ob paucam excrementorū detegenda
quantitatem, & corporis optimam constitutionem; que tēpore ci-
trix tamen caro genita humidior aliquanto est, quàm ut catricis.
cicatricem per se admittat, sed siccantibus, & adstringenti-
us indigeat, ut cicatrix obduci possit; detegi tunc vulnus
oterit, ut epuloticis cicatrix induci possit.

76. Neque quis censcat impossibilia, & repugnantia Vulnere te
inc à me recenferi; vix enim animo concipi potest, quo-
modo status vulneris cognosci possit, quomodo repletum gnoscatur,
vulnus carne esse, & quando soluendi vulneris occasiones que solu-
bseruari possint, si perpetuò tegumento vulnus obtegatur, tione per-
e vulneris status ante oculos nostros non obseruetur: neque suadent.

nim excrementorum qualitas, aut quantitas cognosci po-
terit, non vulneris carnisque color, non cavitatis carne re-
lerio, non denique eorum quipiam, quod solutionem, &
erectionem vulneris persuadere docuimus. Quasi verò
culis mentis medicus saepe non attingat eorum morbo-
um statum, qui oculis non subiacent, quotidie in internis

abscessibus id obseruamus, ex coniunctis symptomatis, & alijs signis, quæ enarrata sunt, solutionem persuadentia, quæ facile cuique innotescunt aut ab ijs dependent, quæ sensibus cognoscuntur: Dolor, pruritus, erosio, fœtor, sanguinis perfusio, se sensibus exerunt. Abscessus, tumor in parte, dolor calor, febris aucta, & ab initio sæpe horrida, post vero & multiplicata sanies, & illius forma mutata facile demonstrabunt. Puris suppressio, & diminuta illius euacuatio auctis symptomatibus, febre, dolore, gravitate ostendet. Ingens putredo, & gangræna, cognoscetur ex mutata admodum puris conditione, & fœtore; quod post insignem dolorem, quasi ex improviso dolor cesset sine materiæ excretionem gangrænam successisse, aut sphacelum indicabit ossis separatio ad excretionem, per putredinem carnis demonstrabitur. Et denique si anxius animo quis hæreat dubium de re aliqua occulta, vulnus semel detegere poterit; per vulnamque detectionem, si in ea cautus fuerit, parum obesse poterit.

Omnem verò tollent dubitationem, si à vulnere bonum pus emanet, & pro ratione vulneris, nullus vel parvus adsit dolor, tensio, vel gravitas nulla, vel pauca; si proximè parte boni caloris sint & molles, & si febris, aut non adsit, aut diminuat.

77. Quo autem temporis intervallo carne repleatur cavitas, & quantitas vulneris, & conditio, si cum contusione, cum ossis fractura, verisimile ostendet; ut & anni tempus, & ætas, & carnis conditio. sed non multum referat si vulnus solvatur nondum repletum carne; tegumento enim non adeo, ut à principio opus est; & ex inspectione, tibi & alijs satisfacies: sed sine hoc elevato tegumento ex parte effluuij securius statum vulneris cognoscere poteris.

Ne miretur quispiam si præter institutum meum in ijs libris longiori oratione profectus sum ea, quæ ad curanda vulnera, & simplicia, & composita, & cauta in carne pertinent;

ent; eum enim nouus tractandorum, & curandorum vul-
nerum modus, tanquam securior, breuior, & blandior con-
stituitur, & receptus sit; in eo tradendo, & explicando neces-
sarium fuit aliquanto longiorem fuisse, in posterum solum
Animaduersionibus & cautionibus versabimur, quas ne-
cessarias iudicabimus in chirurgicis operationibus, & primò
versabimur in ijs, quæ obseruandæ sunt in nervorum affe-
ctibus curandis.

78. Primo igitur in punctura nervi procurandum est,
ut ibi colligatur materia, quæ in laminationem inducere
possit; & ut affluxam quamprimum exsiccemus; sed ani-
maduertendum exsiccantia valida, esse debere tenuissi-
marum partium, ut penetrare possint, & quæ vim ha-
beant roborandi natium calorem. Inter alia nostris tem-
poribus reperta sunt, quæ securius id præstare possunt,
tam priscis, & Galeni temporibus: qualia sunt, oleum
stillaticium Terebinthinæ, & abiegna; balsamum artificia-
le, oleum de hyperico Magati cum aqua ardenti, lachry-
ma abietina aqua ardenti liquata instillata vulnere;
quibus superponatur pro tegumento, & ne ob tenuitatem
partium euanescent apposita vel instillata tenuissima il-
la medicamenta, in formam cerati, balsamum vel artifi-
ciale vel Peruanum, terebinthina, & propoli exceptum,
vel Tachamacha aqua ardenti excepta, & factitio bal-
samo, & cera: adiacentibus partibus repellentibus, & de-
sensu, ut aiunt, appositis, de quibus iam supra, ut etiam
genus omne reuellentium cum euacuatione, quæ semper à
nobis supponuntur, sed prætermittuntur tanquam extra pro-
posum nostrum.

79. Verum quoniam aut ob humorum abundantiam, aut
ob dolorem sæpe fluxio cohiberi non potuit, ita, quin ma-
xima ibi collecta sit, aut quia nervus sit in profundo, aut
quod cæca sit punctura ex acu, ut nullum admittat medica-
mentum, id seruandum erit, quod Gal. 6. Meth. 2. docuit, ut pa-
uemus effluxum materiæ generandæ, ampliori facto orificio

Nervi
puncturis
valida exsi-
cantia ad-
hibenda.

Exsiccantia
valida in
punctura
nervorum
quæ.

Nervi ex-
ca punctu-
ra quod re-
quirit.

duabus sectionibus cutis ad angulos rectos factis, ita ut punctura sit sectionum centrum, digitoque subducemus labia, ne iterum coalescant, ut docuit idem 3. de compos. medic. per gen. 2. tuncque medicamento utendum erit, ex eiusdem consilio, quod inconglutinarum conseruet orificium, aut dissecta labia, & saniem partim exsiccare, & digerere, partim à cetro, & profundo ad circumferentiā attrahere possit, neque tamen partē contrahat, moideat, aut fluxionem concitet. Quare moderatē calida sint talia, valdē exsiccantia, citra dolorem & tenuiū partium, ut ad profunda penetrare possint, utroque in loco docuit Galen. & Auic. 4. Tract. 4. cap. 2.

In nervi
punctura
quantitatis
effluxa ma-
teria habē-
da est ratio
In punctu-
ra nervorum
extremē si-
cantia fir-
gienda.

Si validis
exsiccanti-
bus utendū
quō proce-
dendū.

In punctu-
ris nervo-
rum euphor-

80. Animaduertit tamen Gal. habendam esse rationem materiæ exsiccandæ 3. de compos. med. 5. gen. cap. 2. pro maiori enim quantitate maius exsiccans eligi debet; & pro minori, minus.

81. Neque tamen, ad extremē exsiccantiā deveniendum est cum caliditate, ne dolores, & subinde fluxiones concitent.

82. Quod si ijs utendum necessitas vigeat, nisi sint eius naturæ, ut eorum caliditas faciliē evanescat, ut in aqua ardenti, balsamis aliquibus arte paratis evenit; alia permiscere, oportet, quæ insignem illam caliditatem, & acrimoniam obtundere possunt, neque tamen siccitatem, ac vim attrahendi remittant.

Licet extra propositum, & institutum nostrum sit in nostris cautionibus, & animaduersionibus medicis versari in materia præsidiorum; quoniam tamen Gal. & 6. Meth. & 3. de compos. med. per genera varia proponit medicamentā, & ea pro varietate naturarum, quantitatis materiæ, varietatis læsionis nervorum, & conditionis medicamentorum varianda esse præcipit, in ijs etiam aliquid erit animaduertendum.

83. Primum cum utroque in loco ad intentiones medicas prædictas utatur passim euphorbio, notavit variandam esse illius quantitatem in emplastris; & medicamentis ex eo com-

impositis pro ætate illius. si ei im recens fuerit duodecim
a pars, & paulo minus erit indenda; sed si euphorbium
veterascens: plus illius inijcit, si vero trinum aut quadri-
um, duplum ipsius vel etiam triplum imponendum esset
de compos. med. per gen. .i. componens enim pharma-
m ad puncturas neruorum, sumebat viam partem eu-
orbij recentis, decuplam olei, & triplum ceræ; at vetera-
ns euphorbium, subiungebat; copiosius immitendum
trinum vero, & quadrimum, vel duplicatum prioris pō-
s, vel æquale ceræ.

84. At neque tamen solum euphorbij ætatem animad-
tit, sed etiam naturas corporum: dicebat enim Galen.
llioribus corporibus imbecilliora hæc remedia esse ap-
penda; durioribus valentiora.

85. Verum cum adeo multæ inuehantur difficultates
vfu horum medicamentorum ex euphorbio: tum ratio-
exactæ cognitionis ætatis euphorbij, & vehementissimo
n medicamentorum illis in locis propositorum: semper
lius esse celsui, illis omisiss, ijs potius insistere, quæ notira
te à recentioribus, partim mediante arte spagirica sunt
enta, partim patrum memoria ex Indijs nouis, nouque
e ad nos aduecta; quorum quamuis multa calidissima

, non tamen eorum caliditatem extimescere oportet;
od ob maximam partium tenuitatem breui tempore dis-
antur, & interim omne excrementum absumunt, & na-
alem calorem mirum in modum roborant, cum præpte-
ad penitiores partes penetrent; cuiusmodi esse constat
um ex lachryma abietina, & terebinthina, oleum ex ce-
alsamum arte paratum, oleum philosophorum, aqua
sami, aqua ardens, quibus aliquando solis insullando v-
ur nunc in mellis consistentiam redactis, vt subtilissimæ
um partes alligatæ non ita facile euanescent; additis e-
n quanloque aliquibus ex acribus illis à Gal. locis cita-
ropositis, sagapeno, oppoponace, propoli, & aliquando
horbio. nos sapius admiscemus Tachiamacham, cha-

bii quanti-
tas varian-
do pro il-
lius ætate.

Quin &
pro varie-
tate corpo-
rum.

Ad neruos
punctos re-
media
per inuen-
ta securio-
ra, quam
Galenica
& quæ.

ragnam, Balsamum Peruanum, resinam pini, picem natu-
lem, & aliquando hæc ex aqua ardente emollimus, aut ol-
de hyperico completo, aut oleo Hispanæ, & similibus.

In puncto
neruo dolo-
re urgente
prius is mi-
tigandus.

86. Antequam verò medicamenta hæc applicentur,
dolor urgeat, ne humores ibi trahantur, & inflammati-
nem excitent mitigandus is erit, fomento ex molli la-
parato ex oleo tenuissimarum partium; non adstringen-
calente, & si in eo vermes terrestres incocti fuerint, pri-
stantius esset remedium: & si principium subesset infla-
mationis, si oleum rosatum completum lubricatum a-
sumperimus, maxime proficiemus.

Aqua ca-
lens ad do-
lorum mi-
tigandū in
neruis non
admitenda.

87. Aqua autem calens, quia in sedandis doloribus i-
flammationum passim vitur, in nervorum punctura,
eorundem inflammationibus omnino reiicienda est, Gal-
Meth. c. 2. & Aulic. 4. quarti consulentibus. quinimo ibi
Gal. & 3. de compos. med. per gen. 2. animadvertendu
esse scribitur olei administratione, ne in caliditate actus
excedat, neque adstrictionis sit particeps, quale est, quod
immaturis oliis exprimitur, sed ex maturis, & quod est r-
mum aut quatuor.

In punctu
ra nervi do-
lore sedaso
quo proce-
dendum.

88. Sedato dolore, aliquod ex liquidioribus medie-
mentis in vulnus erit instillandum, puta oleum abietinum
terebinthinæ, vel similitum; mox superponendum medie-
mentum aliquod eiusdem substantiæ, sed solidius, quale
quod ex Tachamacha, Charagna, & similibus emollitis
oleo de hyperico composito, vel Hispanæ, vel balsamo a-
quo arte parato.

In puncto
neruo imi-
nente phle-
gmone
quid præ-
standum.

89. Quod si ne sic quidem dolor totus cessauerit, im-
neatq; vel inceperit phlegmon; docet Gal. 3. de comp. me-
per genera 2. & Auic. 4. quarti, Tract. 4. cap. 2. pa-
laboranti supra medicamentum appositum, & circumui-
nis partibus apponere emplastrum ex farina hordeacea,
fabarum, vel crui, vel lupinorum, cum oxymellite, vell
uio, & oleo bene maturo, vel rosaceo completo lubrica-
to: quin ijs sæpe etiam utebantur, etiam si non adfu-

principium plegmones, quod tale cataplasma etiam do-
rem sedet, digerat, exsiccat; putredini obstat, natium
orem foueat, & roboret, & vim apppositi medicamenti
feruet.

90. At denudato nervo, siue pūcto, siue scisso, actia oīa fu-
nda esse docet Gal. 6. Meth. 4. & 3. de cōp. me. per gen.
4. & 8. ideo ad calcem lotam multo oleo solutā, pōpholi-
on ex oleo rosaceo, & similia confugit, vt & ad alia me-
lica lota. Sed etas nostra mediante arte spagirica, &
uis ex nouo orbe delatis remedijs meliora & secutiora
venit, vt oleum stillaticium ex terebinthina, & abiegna re-
a, balsama arte parata, quæ citra mordicationem exsicca-
re digerere possunt, putredini obistere, ac natium ca-
rem roborare. Instillantur quandoque sola; quæ quamuis
na appositione mordicare aliquantulum videantur cum
non facile ignæ partes in auras abeant, non no-

Denudato
nervio quid
agendū, &
quibus.

91. Sed quoniam tamen non consistentia, non etiam
manent adhærendo; vt quasi alligata adhæreant, admi-
ni resinæ alicui, vt terebinthinæ, abiegnae, & similibus
imum erit.

Olea tenui-
ia crassia a
liganda.

92. Animaduertit autem Gal. & Auic. in denudatis ner-
s, neque etiam resinas has illotas in vsum esse ducendas,
ad mordicationem, cum parti adhærent, noxam & dolo-
in inferre possint. propterea sapius sunt lauandæ, potissi-
um aqua ex floribus hyperici.

Resinæ la-
uandæ dū
punctis ner-
uis sunt ap-
plicanda.

93. In nervi scissura per longū, vel vbi transversum vul-
sit influctum, sed non omnino dissectum, cum maior
ouulsionis impendeat metus; magis vrgebit indicatio si-
andi fluxionem, & repellendi.

Nervi sci-
sura per lō-
gū magis
periculosa.

94. Si verò contusio adsit, vt sæpe euenit in ictibus
mbea pila ex sclopo inflictis; præter ea, quæ iam propo-
sunt, cum quod contusum est, suppurandum sit, calor
em nervorum naturalis exilis sit; emplastro aliquo suppu-
ate quidem vtendum erit, sed in quo etiam vis sit putre-

Nervis co-
tusis quō
medendū

dinem inhibendi, quale esse poterit ex farina hordacea, laccæ, erui, florum camæmeli, rosarum puluere, oxymetris portione, oleo rosato lumbicato.

Nervi semel
secti incidendi, ne
cõueilâtur
Nervi nũ-
quam vien-
di.

95. Præstat tamen ex decreto Gal. & Auic. locis citati nervum transversim incidere, ubi aut semel sectus, aut laesus sit periculumque convulsiois imminet. Post autem nervorum capita curatione descripta curare.

96. Neque etiam admitti debet curandi modus, qui per inustionem ignito ferro; tum quod inustione contrahitur nervus; tum quod docuerimus in denudato nervo ac esse fugienda; nihil vero igne acius est; & ideo Hip. secundo de Artic. T. 55. dum adurendi modum in humeri luxatione tradit, à causa interna; monet, ut nervos caueamus, qui nervis ignis sit inimicus.

Neq; oleo
calido adu-
rendi.

97. Ita etiam eorum curatio admittenda non est, cum omnia nervosarum partium vulnera statim à principio obferuenti adurunt, sic consentes convulsioem evitare possunt cum ex dolore fluxio, & convulsio, potius concitari possunt cumque ut eschara decidat, suppurantibus & pinguibus tendum sit, quæ nervis inimica esse censuit Galen. 6. Method. 3.

Imo ne
mediocri-
ter calido
fouendi.

98. Quinimo ibidem Gal. admonet, & cum rationem nunquam huiusmodi vulnera oleo esse perfundenda, si denudata sint: nam ut aquam calidam in huiusmodi casibus pro fouendo, & mitigando dolore refugimus, ne putreditio in nervo introducat; ita oleum, oleosa, & pinguia omnia, ob eandem causam erunt fugienda.

Olea stillã
ria calida
utilia cur.

99. Neque tamen quis censeat nos nobis ipsis aduersa, qui in tali curatione oleum ex terebinthina, ex lachryis abiegna, oleum de hyperico compositum Magari, oleum Hispanæ maximè laudavimus; hæc enim ut actu sunt oleosa, ita potentia valenter sunt exsiccantia.

In vulnere
nervorum si
hida oĩa
fugienda.

100. Frigida præterea actu omnia in hac curatione fugienda esse dicebat Hip. 5. Aph. 20. & longa oratione docuit Gal. 6. Meth. 3. quia & paucissimo calore natura præ-

læditi sunt nervi, & exquisitissimo sensu, & per os quicquid
 crebro continuati, frigiditate irritabuntur, & ex contra-
 ctione convulsio inducetur.

101. At tamen ne repentina quidē etiam remedia adhi-
 ri debebunt, quod robur partis exsoluant, partesque la-
 tent, & efflorescent. calida igitur mediocriter erunt ap-
 plicanda.

At nec te-
 fentia.

102. Procurato, ut dictum est, tali vulnere, internoque Vulnere in
 medicato tegumento appposito; puluillus ex lana vel linteis, nervis etiā
 in alijs vulneribus, erit superponendus, & pars deliganda rarius dere-
 el retentionem appositorum, & in commodo situ disponen- genda & si
 da, neque ante septimanam soluenda, nisi quid ex iam di- dolor adsit
 cis ad solutionem nos adigat: & si vnquam rarō detegen-
 tum est vulnus, id maximē in nervorum læsione est præ-
 stan- tum: tum ob imbecillitatem naturalis caloris eorum:
 tum quod ob idem maximē ab ambientis frigiditate offen-
 ditur. scio Gal. pluries in die detegere, & abstergere; at si
 quis & rationes, quas supra adduximus, perpendat, & per
 experientiam veritatem exquirat, certō mihi persuadeo
 tentiam nostram sequetur; & cognoscet, & securius, &
 citius consolidationem subsequetur, rariusque multo sym-
 ptomata superuentura mala. Quinimo vigente dolore
 non semper detegendum est vulnus, sed puluillo detractio,
 linctoque linteo medicamento illito, calente oleo, & vul-
 nus, & proximæ partes fovendæ erunt, indeque puluillus e-
 rit superponendus: interim intermediæ partes usque ad
 principium nervorum largo oleo, calente erunt perfunden-
 te, potissimum oleo lumbricato, vel liliaceo cum specie-
 bus, aut vulpino. quin si in manu fuerit vulnus, sub axillis
 iam pertingeret inundatio, & ad spinam dorsī; si in pede, aut
 auribus, id etiam fiet in inguinis.

103. Citius tamen solvendum erit vulnus, si putredo in
 excutitur, in quo casu Gal. 3. de compos. med. per gen.
 pastillos Andronis, & Polyidæ ex sapa exceptos lina-
 mentis vulneribus indebat; mox extinctus vterque me-
 dicus.

Vulnera
 nervorum pu-
 tredine nota
 solvenda sunt
 citius.

dicamentis ex euphorbio, vel emplastris ex farinis oxymele, ex lixiuo. Nostris temporibus feliciter utemur precipitato terebinthina excepto, & cataplasmatibus ex faris putredini obstitentibus: tum & vicinis partibus olei rosae inunctione. Quod si putredo valida sit, precipitati pulvere vulnus erit aspergendum.

In capitis
vulnere
simplici ag-
glutinatio
non suffi-
ciunt.

104. Iam in particularium partium vulnere curatio ad cautiones, & animaduersiones nobis est veniendum. Sape enim quae in vniuersum dicta sunt, & optime constituta, cum in particularibus partibus ad actum deducuntur, non leuem patiuntur varietatem. Vt in simplici capitis vulnere sine etiam ossis detectione animaduertitur. cum enim in sola carne vulnus dixerimus superius simplici agglutinantibus curari posse; in capite si contigerint, melius erit per carnis generationem, & cicatricem curatione procedere, potissimum si corpus non fuerit ex exquisitis; si enim solis insistamus agglutinantibus, & conemur, breuia quamprimum ad unionem duci, verendum erit, ne vulneris fundo pus colligatur, & vicinas ac subiectas partes putrefaciat, membranisque, & cerebro affectio communetur; & inde mors sequatur. Vigetur igitur curationem institutam, praestabit vulneris labia disuncta sinere, & carnis generationem procurare.

In bene factis tamen aliquando sufficiunt.

105. Si tamen in optime constitutum corpus incidimus, vulnere à capillis expurgato, & labiis adductis curari poterit; & breuissimo tempore tegumento, vt dictum est, appposito.

Vulnera in musculis temporali cauenda vt aeuosa

106. In vulnere laedente temporalem musculum seu per procuranda erit curatio per carnis generationem; & medicamentis apponendis vulnere, & labiis, ea erunt eligenda, quae nervosis partibus conuenire diximus. & si fortiter detegenda sunt vulnera alia, & rarius in hoc, id praestandum, ob periculum effusionis sanguinis, doloris, & contusionis.

107. Quod si contusio cum leui dilaceratione, aut v

ere fuerit, sectione opus erit, vt contusa cato in pus ver- **Cōtūfio in**
 effluxum habeat, parandusque sectione talis effluxus, capite quō
 exitum commodum materia habeat, semperque à leſa curanda,
 arte verſus ſanam dirigenda eſt ſectio, quinimò ſapius
 applici ſectioe opus eſt vtrinque ſemper à centro inci-
 endo ad ſanas partes ſectionem dirigendo; poſt ve-
 curatio inſtituenda erit, vt in vulnere in carne cum ca-
 tate.

108. Animaduertendum tamen ſi vulnus tale in mu- **Cōtūfio in**
 ſculo temporali eſſet, & ſectioe opus eſſet, ſolam cutem ſculo tēpo-
 ſe ſecandam, non muſculum; niſi fortè eſſet neceſſitas rali quō
 gens. tunc enim non tranſuerſum, ſed ſecundum fibra procedēdū
 m proceſſum ſecandus eſſet, vaſa tamen ſunt fugienda;
 ſomodo ſi ſectio fiat, minus periculum & conuulſionis,
 ſanguinis effuſionis incurremus. ſed ad id præſtandum
 in quilibet aptus eſt, ſed indigemus perito medico, & in
 atome exercitato.

109. Eouſque practicoꝝ horum in curandis capitis **Secantes**
 alueribus progreſſa eſt inſcitia, an malitia, vt ſtatim ac vul in formam
 ratum in capite offertur, etiam ſi non denudatum os fue quantum
 t, ſecare cutem, quin & pericranium in formam crucis peccent.
 ut litteræ T audeant; periculum ſapè vitæ agro nullo mo
 o periclitanti iniicientes, & curationem quadruplo pro-
 centes; cū ſectio hæc ac dilatatio ſolum ab Hip. ex-
 ſcatur in denudato fractone oſſis, aut denudando ob con-
 ſionem, ad explorandam læſionem, & operationem ali-
 am exercendam.

110. At cum os denudatum, eſt periculumq; ſubeſt leſio **Quādo ſe-**
 ſ in co, aut ſubiacentibus partibus, ad ſpeculandam rei ve- cādā cutis
 atem, & ad aliquam exercendam manuaſem operationē; in vulneri-
 ſectionem quidem, & dilatationem vulneris eſt venien- bus capitis,
 um; Hip. lib. de vuln. capitis etiam id perſuadente. ſed nec
 ſeo frequenter nec eo modo. niſi n. magna ſubſit ſuſpicio
 acti aliquo modo oſſis, ad hanc actionē non eſt veniendū.

III. Non igitur adeo frequens eſſe debet cutis hæc, &

pericranij dissectio, & non nisi à peritis exercenda; & nisi ubi magna subsit suspicio læsionis subiectarum partium, & necessitas operandi, aut scalpro, aut terebra.

Sectio in
formam
✱ raro fa-
cienda, &
quando.

112. Neque vero incidendi modus adeo frequens, & communis in ✱ aut T. formam probari debet: nam quamvis à Celso lib. 8. cap. 4. proponatur, raro tamen in usum ducendus est, & non nisi ubi ictus cum contusione est, aut rotunditatem, aut spatium vndique habet, ut dubium esse possit qua parte lësio, puta, rima, aut fractio inciderit; secus erit omitenda, tum quod & longiorem induci curationem, tum quod periculum augeat inflammationi dissectio vtriusque pericranij; tum præterea, quod plerumque sit superflua, quod impositis penicillis vulneris mediis satis amplum reddi possit. & si secandum sit, potius versus extrema vulneris id erit faciendum; melius enim sic ossi læsiones, quæ potius in extremis contingere solent, conspicui reddentur, & dilatationi in medio promptior locus dabitur, & ideo Hip. lib. de vulneribus cap. 19. curabat, ut vulnus longius redderetur. sed præterea anguli illi, ex sectione perpendiculari facta, sæpe negotium facessunt, & citam atque tamque partium dispositionem, & curationem impediunt sæpe verò à penicillis eleuati peruertuntur, quin & inuertuntur ita, ut si laborans super vulnus decumbere voluerit quod quandoque requiritur pro expurgatione vulneris, non possit ob dolorem inde excitatum.

Sectio in
temporali
musculorum
facienda
& quando
& quomodo.
Sectio in
sutura
facienda,
& cura.

113. Neque sectionem admittit musculus temporalis ob insignia vasa, & nervosam naturam; unde ob viciniam & communicationem cū cerebro, imminet periculum inflammationis cerebri, delirij, & convulsionis: virgete tamen necessitate secari posset secundum ductum fibrarum.

114. Cauenda itidem in suturis sectio, & pericranij preparatio, ne affectio dura meningi per interpositum ligamentum communicetur, & dolores excitentur, & inflammationes in cerebro; sed si necessitas urgeat, ad latera si-

io, & separatio pericranij.

15. In fronte etiam ne fiat transuersim, ne musculus externus palpebram incidatur, & clausus semper oculus remaneat: si igitur necessitas secandi urgeat, per rectum fiat. Sed si non sufficiat, duæ aliæ sectiones obliquæ ab eodem puncto sursum versus ducendæ sunt, ut vna fibra alteram sustinere possit.

16. Ita cum in occipitio sint musculi capitis motui adhibendi, caueas ne illos violes.

17. Detecto osse, prima operatio, quæ exerceri solet, quæ sit scalpro rasorio; in qua illud primo aduertendum, si sæpè operationem hanc fieri etiam sine euidenti ossis fracture, rima, sede, fractura, sed ob suspicionem de mortuæ externæ superficiei ossis. cum enim diutius ambienti potius in frigidum exponitur os, ob caloris naturalis exilitatem, facile pars illa extrema emoritur; & ideo abradenda, ne curationem producat. separet enim illam natura crescente carne.

18. Id tamen rariùs præstandum est, quam communiter fiat: vulnerato enim capite statim ab effuso sanguine impeditur operit, & ad sistendum sanguinem statim aliquid imponitur: neque ex calore obscuriore statim colligendum, emortuam esse superficiem, quæ sæpè ab externis comminatur.

19. Neque verò abrasio semper eò usque ducenda est, usque ad ossem sit, donec ab osse, sanguis effluere videatur. neque enim per omnes ossis partes externas venulæ diffunduntur; neque craniorum eadem est crassities, sunt apud ossa capitis crassissima ad miraculum usque, sunt & testacea testam gallinæ cui subtilitate æmulantes: sunt igitur in officio hoc præstando, si abradamus ad mortificationem coloris ossis.

20. Sed animaduertendum aliquando etiam emori superficiem cranij ob defectum curantis Medici: qui autem consuetam detectionem vulneris, mortificationi externæ

sectio in fronte per rectum faciendæ, & cur.

Ut in occipitio.

Abrasio ossis cur fiat.

Abradendum rariùs

Abrasio raro esse debet profunda.

Superficies cranij emortuæ per se sæpè detecta.

superfici ei ossis occasionem dederit, aut quod defectum
 rius ab iniurijs ambientis diligenter non defenderit :
 que cum damno laborantis aut carnis generationem de-
 dendum erit, aut naturæ ope abscedet, sicque semper cu-
 tio prorogabitur cum damno agrotantis, & magno me-
 ignari, an auari, prouentur.

Abrasio 121. Sectione igitur vno die facta, & ficcis penici-
 quo admi- appositis, vt hians vulnus permaneat, die sequenti ad se-
 nistranda. pendum accedemus; illud primo obseruantes diligenti-
 quod à Celfo lib. 8. c. 4. annotatum est, ita agendum;
 cum scalpro vllam partem aut cutis aut periostij attin-
 mus, aut impingamus, quod fiet si à ministri digitis la-
 distrahantur, & per alterum ministrum immotum in ab-
 sione caput detineatur.

scalpro 122. In abrasione scalprum non attrahatur; & ren-
 quo vtrū tatur, sed attractione ad se sola eleuato scalpro semper p-
 ficiatur. sic enim minor fiet concussio, minorque tū in o-
 tum in scalpro calor inducetur; & si diutius in hac e-
 ratione insistendum, aut mutanda sunt scalpria, aut aqua
 frigeranda, sed mox exsiccanda; & quod intercesserit in
 uallum vulnus linteo calido superposito ab iniurijs ambi-
 tis defendemus.

scalpro su- 123. Suturas abrasione non attingemus, aut scalpro.
 turæ ne at- ob interpositas fibras communicetur dolorosa affectio-
 tingantur. ræ meningi; vnde inflammatio in illa, & cerebro excite-
 ra meningi; vnde inflammatio in illa, & cerebro excite-

Abradēdū 124. Abradendum autem donec rima euanescat: &
 donec rima ad medullam perueniat, itidem obseruandum est, an v-
 quanescat. pertingat: & si signa adfuerint, quibus & Hip. lib. de vi-
 cap. & Celsus lib. 8. cap. 4. coniectandum ducunt la-
 nem ad membranas peruenisse, ad ossis perforationem
 deueniendum, vt si qua materia sub ossē contineatur, pe-
 re illi exitum possimus.

In rima lō 125. Sed verò si rima multum in longitudine ex-
 ga no tota datur, ita vt non parua illius pars sub cute abscondatur
 abradenda inde colligatur, certò rimam ad penitiora peruenire, cum

ando corpore longitudo talis esse non possit sine altiori funditate non erit tota discooperienda, incisa cure superiori, & inferiori, sed dilatato bene vulnere in medio peratio erit facienda.

26. Vidi tamen non semel in nouo hoc curandi multa capitis vulnera cum rima in caluaria curata sine asione, & perforatione; modo non præfuerint signa à prioribus descripta, quibus coniectamur læsionem ad intra penetrasse: nisi enim multum hians fuerit, ut per conijcere possimus penetrasse sanguinem, aut ichores, ad medullium vel membranas permeasse, aut ope naturali agglutinetur per se pars, aut auxilio externo concurrenti balsamorum artificialium, vel Peruani, olei terebinthi, abietini, olei Hispanæ, vel de hyperico, sicque effugiet, & iniurias, aeris, & pericula, quæ & in profunda abrasione, & in perforatione sæpe eueniunt.

27. Vbi verò vulnus capitis contingerit cum sede tantam tamen crassitiem, non penetrante, abradendum, ut aliquantulum est, ut fragmenta ex incisione, si sunt, abstergantur, & diligenter peruestigemus an præsedem per ictum rima ossi inducta sit; tunc enim abradendum, donec deleatur. Quod si nulla rima vel confusio ariatur, aut si adsit, aboleatur rasorio scalpro; in curatio vulneris ita erit progrediendum, ac si sine fractura ossis set.

28. Quod si rima sub sede adsit, si parens fuerit, & ad membranas peruenerit, ita in vulnere curando nos geremus si perforassemus os; si verò ita non pateat, ut liber mater collectæ exitus concedatur, vel scalpro excisorio, vel modo, vel serrata terebra, trepano dicta, erit aperienda.

29. Si vero sedes punctim facta fuerit, si totam penetraverit substantiam, abrasorijs scalpris tota erit anda: sin totam caluariam permeauerit, terebra tota ea erit auferenda ita, ut pars cum foramine excin-

In rima
semper a-
bradendū.

In sede quo-
usq; abra-
dendum.

In sede sub
rima quid
præstādū.

In sede ex
ictu puncti
uo quo cu-
randum.

In ossis col
lissione quō
abrafione
vrendum.

130. In ossis collisione, ne impedita transpiratione h
tuum, & euacuatione ichorum inducatur, calor præter
turalis in osse, communiceturque etiam læsio meningis
cerebro, os collisum est abradendum; donec ad sanum
ueniamus, siue in longitudine, siue in latitudine, siue in
funditate, donec etiam ad medullarium peruentum sit:
ubi eo peruenerimus, si stillæ sanguinis eruperint, signum
erit, non ulterius esse abradendum, quod ex compressio
sanguis expressus exitum per interna non inueniret; quod
si nihil erumpat, signum, rimam in interna parte ossis
contusione esse factam, per quam sanguis expressus ad
ningem duram percolauerit; & ideo perforatio erit in
ducenda.

Caluariæ
incisæ in
trocessio
cum exitu
quod re
quirat.

131. In caluariæ introcessione cum apertis fissuris,
per eas collecta sub membranæ materia exitum habeat,
randa, ut vlcus cum ossis contusione, non auferemus ossa.
erunt pro tegumento; nec vim inferemus tunicæ ad
renti, & aut agglutinabuntur, aut per se secedent natura
perante.

Caluariæ
retroressio
cæca quæ,
requirat.
Introressio
caluariæ cum
fractura os
sis quō cu
retur.

132. Sed si introcesserit cum obscuris fissuris, tunc te
bra os erit aperiendum, ut exitus materiæ pateat.

133. Quod si ossis omnino aliqua portio secesserit
alijs, aut in superna tabula, aut in interna, aut punge
duram meningem lædat, auferenda erit; ne ex punctione
flammationem inducat, aut calore vitali orbatum, & m
qualitate affectum membranam subiectam afficiat.

134. Quid si secante telo portio ossis penitus a cal
ria sit abscessa; si versetur in externa tabula, & portio
tis adhuc cum alia sit annexa; absterfo osse, quod reman
abscessa pars ossis erit auferenda, mox cutis consueunda,
confibulanda, & curandum vlcus ad agglutinationem,
iam docuimus. Quod si totum ad membranam usque c
sectum fuerit, periculumque subsit, ne a superinducta cu
membta comprimantur; antequam cutis superinducatur
super cranium, lamina plumbea, argentea, vel aurea; e
im-

ponenda, quæ impediatur compressionem cutis superpositæ; quæ tamen nisi ex parte suenda erit, ut exitus materiæ evenerandæ pareat, & lamina auferri possit, ubi caro membranam cooperuerit. Quod si non solum os penitus sit abissum, sed & cutis circumuestiens, tunc maximè lamina minimis osculis foraminulenta erit superponenda, ne lintei medicati superpositi membranam comprimere possint; hæc tamen magnitudine solum tanta sit, quanta opus sit ad membranæ protectionem, ut ad libitum subtrahi possit.

135. Quid verò agemus, si materiam collectam considerimus in magno vulnere cum ossis fractura? secantur ea erit ad educendam materiam, ne piam corumpat; ad evitandam enim mortem evitandam, aliquid etiam cum periculo tentandum; & in curatione procedendum, ac si vulnus curatum eousque processisset.

136. Quid ampliùs; si integro osse venula aliqua in membranis aut cerebro disrumpitur, symptomata induceret aliqui multis in locis, ubi ob casum verisimile esset sanguinem corruptum contineri, terebra perforandam esse calvariam censent. sed hoc mihi per fortunam curationem tentare esse videtur. neque enim locum certum habemus, ne an læsio sit in cerebro, an in membranis cognoscimus. nimò hæc est calamitas illa, cuius nullum esse remedium crebat Hip. lib. de vulneribus capitis. Sed si quid faciendum est, aut erit insistendum in indicationibus à Gal. tractis 2, de compos. med. sect. gen. 2. remedijs in inflammationem prohibentibus, & ijs, quæ materiam collectam digerendi, & euocandi vim habent capiti applicatis; ijs addis quæ facultatem habent ad penitiores partes medicamentam vim deferendi. qualia sunt emplastra ex floribus nymphæ, meliloti, anethi, rosæ rubeis, betonica, absinthio, dano, gummi elemi, terebinthina, farina hordei, seminis ani, & fenugreci, oleo rosato, posca, vel vino subaustero pauperi, sed adstringente, in usum etiam foris ex vino ru-

Calvaria
incisa &
materia
collecta
quid agen-
dum.

Calvaria
in ictu inte-
gra, & san-
guine sub
effuso quid
agendum.

bro subastringente paratur, in quo ebullierint pleraque eius, addita saluia, folijs lauri, additis oleo rosato, lilia ceo, irino, & similibus. Inuitabimus etiam materiam ad exitum gargarismis, erihinis, & narium inunctionibus. Obseruauimus enim non semel in magno hoc nostro valetudinario delapsos aliquos ab alto, capite ob varios ictus multis in locis pratumido, sanguinem e nariibus, & auribus emittentes, attonitos, mutos per multos dies, emplastris adhibitis & fomentis conualuisse, multis sanie per os, nares, & aures euacuata: & alios, licet rariùs, discussa materia sine euacuatione sensibili ad sanitatem esse deductos. Vt proinde non sit adeo deridenda Conciliatoris sententia differentia centesima octuagesima prima, qui rarò admodum terebratione utendum ob pericula dicenda censuit; sed emplastris absorberi posse, & ut uocari ad externa materiam intra cranium contenta, derastris capite, ac emplastro appposito ex gummi elemi vncijs tribus, resinæ purissimæ vncijs quatuor, ceræ vncijs sex, olei rosati vncijs tribus & dimidia, ammoniaci vncijs duabus, & terebinthinæ vncijs tribus & drachma media, ex arte commixtis. quam sententiam secutus est Lanfrancus, qui multos plures sic vulneratos se obseruasse fuisse sanatos hoc modo testatur, quàm terebratione: quam opinionem licet non omnino recipiendam censem, posse tamen aliquando sperare nos salutem sine perforatione ea ostendere potest.

Aquatitæ 137. Non est tamen recipiendus in hoc casu eorum terebrandi modus, qui derafis capillis lintea aqua ardente imbuta parti apponunt; aut facticio balsamo totum caput imbuunt; quum inde phlegmonem excitandi non paruum impendeat periculum.

138. Quamuis non negauerim ego & ad eximenda ossa pungentia membranam vestientem cerebrum, & partes subiectas, ad parandum materiam sub caluaria collectam, & colligendam, exitum, necessariam esse cranij terebrationem; mirari tamen satis non possum indoctorum

orundam audaciam, qui in leui qualibet colligenda materia suspitione ad operationem hanc descendunt, in ea se exercentes, ac si ollam aliquam terream aut fictilem resarciendas disruptas partes perforarent: non animadvertentes, quam periculi plenam iudicarint hanc operationem, etiam à perito factam, Hip. lib. de vulneribus cap. & Celsus lib. 8. c. 4. & potissimum Gal. 6. Meth. 6. tum ratione partis sanæ, quam perforamus, tum ratione actionis, quæ per circumductionem, & cranium, & instrumentum nascitur, tum ratione fibrarum ossis inæqualium, quæ tra dilacerantur, tum ob sanguinis effusionem ex venis medullaribus, tum ob difficilem cognitionem crassitie calvariarum, tum propter connexionem duræ meningis cum interna ossis superficie, à quo necesse est in euulsione ultimi partis ossis à membrana læsionem aliquam pati, ut proximè verear ne non pauciores ex hac operatione etiam bene rectè exercita moriantur, quam ex ipso vulnere. Aliquando indignabundus aliquos sentiam dicentes, minime quinimo quamprimum veniendum esse ad hanc perforationem: quod si etiam nihil collectum inueniatur, nihil amius mali inde impendere, quam quod aliquantulum promoveatur curatio, aliqua igitur in ea exercenda erunt à nobis ore nostro animaduertenda.

139. Et primo consideranda sunt signa, quibus Celsus lib. 8. c. 4. coniectandum dicit; an calvaria sit fracta, intus adsit læsio apertionem ostendens; Num bilem vomuerit; Num oculi eius obcæcati sint, num obumtuerit, num per nares aure sue sanguis effluxerit, num conciderit, num sine sensu quasi dormiens iacuerit; si torpor accesserit, si mens non existat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est. Quin & considerandum est, an lapide, an ligno, an ferro, an telo percussus sit; & hoc ipso leni, an aspero, mediocri, & vastiori; vehementer, an leniter. Præterea vero contemplanda & consideranda est plaga specillo etiam immisso, ut ossis fractura adsit, & qualis ea sit, colligamus.

Rarò terebrandum.

Terebratio nis periculosa.

Terebratio nis exercenda signa demonstratiua.

Terebratio
nō semper
necessaria
osse fracto
Terebratio
nis exer-
cendæ, &
temporis si
gna.

140. Neque tamen semper fractio osse terebrandum est; si enim materia liberum habuerit exitum, terebra non est vtendum; & si os pungens, aut comprimens, lenticuli osse fracto scalpro, aut alio ferramento tolli potest.

Terebratio
nis exer-
cendæ, &
temporis si
gna.

141. An vero expectanda sint signa à scriptoribus tradita, ac exercendam esse hanc operationem indicantia, scio id controuersum esse. sed ego sic sentio; ex signis aliorum sunt, quæ probabiliter persuadere possunt, facile in absconditis colligi posse materiam, quæ ab initio apparere solent qualia sunt, ex Celso enarrata; aut sunt, quæ progressu temporis collecta materia superueniunt, vt rigores, febres, bilis, si vomitus, pondus in parte, obmutescentiæ superueniente dolores in collo, & similia; aut quæ punctiōnem in parte ossis portione indicant. sine primis quamuis aliquando, se raro, succedat materiæ collectio, nunquam tamen terebrandum censerem, ne in vsum ducamus remedium periculum plenum, sine urgente necessitate; vnde tamen, & curatio tardior redditur, & cum maiori periculo. at vbi alia signa superuenerint, & si spes salutis sit in angusto, si locum coniectari possimus, vbi collecta sit materia, omnino tentandum est terebra exitum quamprimum parare; in punctura membranæ, antequam per eam inducatur inflammatio, aut terebratione, aut alio ingenio, procuranda pungentis ossis exitus portio.

Excisio ossis
quō pre-
standa.

142. In quo etiam seruandum, quod à Gal. 6. Methodum ultimum propositum est, vt quamuis multa ossis portio confracta sit, eam potissimum subtrahamus, quæ membranam comprimit, aut pungit, non autem vniuersam partem confractam confertim, ne ex improvisa detectione magna membranæ, & cerebrum, noxam sentiant inemendabilem reliquæ vero partes confractæ excisionis ferramenti, & lenticula erunt excidendæ.

Terebratio
in futuris
quō exer-
cenda.

143. Fugienda hæc operatio in futuris, etiam si ibi sit ossis fractura, Hip. teste lib. de vuln. cap. & Gal. 6. Methodum cap. 6. & si urgeat necessitas vtrinque futura euitata exerceri.

peripoterit; sic enim in inflammationis periculum non incidemus.

144. Quod fugiendum quoque ex omnium sententia, si ossis fractura conigerit sub musculis temporalibus, quos secare opus est periculi plenum, convulsionem ex eorum sectione inducemus, & arteriosi sanguinis effusionem ob arteriam ibi obrepentem; quod si apertionis adsit necessitas, vicina lateralía loca ad hanc operationem eligemus.

145. Tempus terebrandi tunc sit, cum urgeat necessitas: in depressione ossis, & punctione membranarum, quamprimum id erit præstandum, ne inflammatio inducatur: in transfusa, & collecta in internis partibus materia, & sanguine, cum sopor instat, aphonía, & alia, quæ ibi grauantem materiam ostendunt. nam quamprimum exitum parare oportet. at si indicans non fuerit præsens, ut non urgeat, nec symptomata præsentia, quoniam materia non semper statim colligitur, dantur indicia, & æstate, si fieri potest, intra quartam; vel ad summum intra septimam; in hyeme intra septimam, ad summum ante undecimam, perforatio erit exercenda.

146. In terebratione cum ad vitream peruentum est, cæpius terebra est eximenda, atque perpendenda crassities ossis incidendi, stylo tentanda sectio, & coniectandum quantum ossis excindendi superfit, & mutanda terebra, ne calidum ex circumductione lædat, aut aquæ immergenda, ad calorem tollendum.

146. Si primis diebus perforationem aggrediamur, cum cæpè nondum collecta aut suppurata est materia, præstat resistere à perforatione, & sinere ossis separationem naturæ; aut ea id non præstante, tutius, quod ossis superest, sequenti die per ulteriorem terebrationem excindemus; quod eo tempore soleat membrana, quæ ossi erat annexa aut separari per se, aut saltem non adeo annexa facilius separari; neque nec vis parti separandæ inferretur, nec adeo ex improviso internas partes ambientem exponemus; & hæc Hip.

Terebratio fugienda læsione ossis sub musculo temporali.

Terebratio nis tempus

In terebratione quando subsistit dū & quando mutanda terebra.

Perforatio primis diebus facta cur magis periculosa.

sententia lib. de vuln. cap.

Terebran-
dū statim,
si collecta
sit materia

147. At si materię sub osse contentę signa adsunt; statim oportet os ad membranam vsque perforare, & amouere, vt materię quamprimum detur exitus, & viterut corruptio materię, & membranarum corruptio: sic enim agentes neque membranę dilacerandę periculum subibimus, quam iam abscessisse supponimus, neque aeri exponemus partem externis iniurijs iam assuetam, & hoc etiam ibidem docebat Hip.

Terebratio
sit recta &
æqualis.

148. Obseruandum etiam in terebratione, ne inæqualiter circumducatur terebra, ita vt periculum sit, ne ex vna parte os ad membranam vsque incidatur, altera parte integra remanente: sed si in extractione terebrę errorem hunc cognouerimus, aut super integram partem terebram incisoriā comprimemus magis, vel separationem à natura faciendam expectabimus, quę solet in tali casu id breviori tempore præstare.

Terebratio
& exciso
esse quid
agendum.

149. Exciso osse quid in curanda membrana faciendum sit, non ita concordēs sunt medici; alijs siccantibus vtendum, ne corruptionem contrahat, sic Hip. lib. de vuln. cap. nu. 24. persuadente, & Celso lib. 8. dum vtitur aceto, emplastro Isidis, & Iudæi; Alijs demulcentibus, oleo, rosato, sanguine columbę, & oleo vitellorum oui, vt inflammationem prohibeant. Galen. 6. Meth. 6. vtramque probasse videtur, sed si statum membranę varium consideramus, non erit difficile veritatem hac in re eruere. Si enim sanam omninō membranā inueneris, blandioribus non valde siccantibus erit vtendum, sed roborantibus, vt oleo rosato ex oliuis immaturis; quo & roboramus calorem naturalem, & adstringenti facultate repellimus, nihilque habet mordacitatis, sed potius habet aliquid anodynum, & moderata eius potentialis frigiditas, nonnihil ad reperciendum facit. Resina terebinthina, & abiegna lota, & ipsa moderato suo calore natium membranę calorem fouent, moderatęque adstrictione repellunt, & roborant, mordacitatē

que

que sunt expertes; immò, si maluarum aqua eleuantur, magis anodynae red dentur; ideo si oleo rosaceo permisceantur aptissimum conficiunt medicamentum sanguis columbarum, & oleum vitellorum oui, cum laxantia sunt, & humectantia sine vlla repulsione aut corroboratione, cur in vnum venire debeant, non video: nisi forte in seiuigenda abesse membrana dolore excitato ad dolorem mitigandum administrentur: oleum tamen rosatum, aut solum, aut cum terebinthina, magis erit ex vsu.

150. Vnguentum isidis, aqua ardens, mel rosatum, saua membrana existente, vt & oxymel, non est quod in vsum veniant, vt passim fit. cum enim nihil adesse suppenamus, quod absterfione indigeat, nec superflua adsit humiditas, quae siccitate opus habeat, neque vehementer calefacienti- bus indigeamus, non video, cur hæc administralari debeant. quod si qui & siccantibus, & contra lenientibus curantur, vt Galen. 6. Meth. 6. obseruauit, censendum est, id ex sanita- na membranæ contigisse, quæ detrimenta ex impositis me- dicamentis superat. Hip. autem lib. de vuln. cap. cum sic- andam docet, supponit ichores ibi effluxos, vnde putre- fctini periculum impendebat, vt ex eius verbis colligi potest, vel certe persuadet filis mollibus vel gossypio exsiccandâ membranam, ichoribus absterfis: lib. enim de vlceribus nu- . vsus est hoc nomine siccandi, pro absorbenda & absor- cunda humiditate ab vlcere; sed vbi bene se habet mem- brana, illis huiusmodi siccantibus non indiget.

151. Peccant, qui exciso osse linamenta imponunt: sic nim. contra præceptum Hip. agunt lib. de vuln. cap. n. 18. artem distendunt; sic carnem in lateribus distendentes, & fluxum puris impediunt, quo retento sæpe inflammatio- es excitantur.

151. Facta igitur perforatione, & exciso osse, gossypio osse exci- siter detergetur membrana, si sanguis aliquibus per- solauit, postea vna aut altera gutta terebinthina, vel a- standum, ietinae lacrymæ, vel olei rosati, vel aliquid ex his mixtis

Membrana
saui neq;
aqua ardē-
te, aut mel-
le rosato,
aut oxy-
mellite vtē
dum.

Osse exci-
so nō sunt
linamenta
imponēda.

Osse exci-
so quid præ-
standum,

instillatis, post illitis labijs medicamento, quod vim habeat fouendi calorem naturalem, vt terebinthina, oleo Hispanæ, & similibus iam enarratis, & tegumento ex iisdem, vel propositis parato, & superposito tegumento ex triplici linteo, vellana, vel gossypio, ad fouendum calorem, & protegendâ partem ab iniurijs ambientis, vt diximus, illisque ligatura firmatis ita permittatur.

Effluxus 152. Et quamuis, effluxus puri generando parari de quo parandus. beat; quia tamen illius portio ad membranam pertingere posset, laudo consuetum morem apponendi sericeam telam ex chermes, qua etiam fouebitur calor naturalis partis: aut

A terebratione solutâ 153. Laudo tamen in hoc casu vt intermedio tempore dū aliquâ bis & ter solnatur, & detegatur vulnus, & membranam prodo vulnus. curemus, vt iam propositum est.

Quib. vulnus terebratū abstergi debeat. 154. Nec semper in rosaceo persistendum; sed humidi- tate affluente, mel rosatum, vel syrupus in usum venient, vt sordes abstergantur. Laudatur etiam terebinthina, vel sola, vel cum oleo rosato mixta: & si fortioribus opus erit, oxymel saccharinum conueniet.

A terebratione si sanguis sublit, quod agendum. 155. At si materiam vel sanguinem sub osse terebrato supra membranam inuenerimus, abstergenda leniter & blâdè erit gossypio, mox iutebimus, vt clauso ore, & naribus, vulneratus spiritum vi quadam ad nares impellat: intumescit enim membrana, atque ad foramen materia propellitur: quod si, ob extumescentiam introductam membranz exitus materiæ impediatur, exitum parabimus decussatorio vocato instrumento, leuiter membranam deprimentes, mox instillantibus terebinthinam vel lachrymam abietinam cum portione aut mellis aut syrupi rosati ex rosis rubeis, vel ad summum oxymelle saccharino curationem transigemus.

Detegere vulnus sepe quando debemus. 156. Sed is est casus, in quo non ad eò rarò detegendum est vulnus, sed vel quotidie, vel alternis diebus, vt purulenta materiæ exitus præparetur, sordes detergantur. & medicamenta instillantur.

157. Quod si concretus sanguis ossi subsideat, & membrana adhæreat, procuranda erit illius suppuratio, prius ab-
 isto eo, qui minus adhæret; quod fiet terebinthina oleo
 rosato admixta, vel cum oleo ex vitellis ouorum.

158. Si vero denigratam ob corruptionem membra-
 na inuenierimus; coercere eam tentabimus melle rosato
 in modica terenbithina: sed si progrediatur, ad oxymel
 veniemus cum aqua ardente, vel ad mel rosatum cum
 oxymellite & aqua ardente: vnguentum isidis melli rosa-
 to admixtum conueniet. Imo si in extremis versabimur, ad
 præcipitatum veniemus lotum ex aqua rosata, & admixtū
 vnguento rosato.

159. Quod si ex refrigeratione nigredo prouenerit, vt
 vulnere cum detectione membranae diuturna, calefacien-
 terunt instillanda, vt oleum abietinum, terebinthina, a-
 qua ardente, & similia, & id quotidie, diligentia semper ad-
 dita, vt quam minimum detectum vulnus maneat. Ex-
 oleis scilicet ceratis calefacientibus fouendus erit calor na-
 turalis, balsamis artificialibus, & Peruano terebinthinae mix-
 tæ cerato de betonica, addito balsamo aliquo, & alijs simi-
 lis.

160. Quod si post terebrationem membranae fungus
 creuerit, validè exsiccantibus vtetur; Sabinæ puluis ad
 craculum conferet; vel puluis corticum myrabolanorum
 cinorum. Validiora erunt, aluminis vsti puluis; validius
 vnguentum Isidis; deinde etiam præcipitati puluis;
 si excreuerit ad vulneris ora, excidendus sericino filo al-
 lato, & paulatim constricto.

161. Si vero ad renuem membranam, vel cerebrum,
 nus peruenierit, eadem vtendum est curandi ratione; sed
 resecatio maior erit addenda, sic terebinthinae vel abiegnæ
 rymæ addendum erit vel oleum de hyperico, vel balsa-
 um artificiale, vel aqua ardens, & oleum abiegnum, vel de
 terebinthina erit instillandum.

162. Pulueres cephalici, quibus passim vtuntur me-
 dici

sanguine cō-
 creto sub
 caluaria
 quid agen-
 dum.

Mēbrana
 denigrata
 quō proce-
 dendum.

Mēbrana
 ex frigore
 denigrata
 quid agen-
 dum.

Fungo in
 mēbrana
 nato quō
 medendū.

Vulnere ce-
 rebrū attin-
 gente, quō
 procedendū

Cephalici
pulueres
sunt inuti-
les.

diei in capitis vulneribus osse detecto ad preservatione
osis à corruptione ex myrrha, thure, aloë, radicibus iridi
aristolochiæ, crui farina, corticibus radicis panacis, & h
iusmodi, quibus os natura sua siccum in sua conditione co
servari aiunt, id persuadente Gal. 6. Meth. 6. nullo mo
necessarij sunt; si enim sanum os fuerit, maiori non indi
get exsiccatione; si demortuum, nihil facere puluerem co
gnoscent, ad actum non valente mortua facultate deduc
re: sed si nouo hoc modo medendi vtantur effluxu pu
parato, raroque detecto vulnere, cognoscent neque super
ciem ossis emori, & si qua pars exterior emortua fuerit
facilius sine pulueribus abscedere, quam ijs aspersis, mox
ossis & partis calorem naturalem foueamus, neque aeri
sapius exponamus.

Nigredo
caluarie
quò curan
da.

163. Quod si in osse nigredo appareat, semper est ab
dendum. aut enim emortuam partem auferemus, aut si
meditullium peruenerit, perforatione opus esse ostende
communicata ossi corruptione à subiecta materia. Men
ni nobilem adolescentulam ex Burrorum familia, cū
imaginem quandam appendere tentaret, ex scabello de
disse, atque occiput ad terram albisisset, quem ictum cum
hili fecisset, sed & caput lauisset, & in exercendis sanoru
operationibus ne tantillum quidem se abstinuisset, tande
in vigesima dolere posteriori parte capitis capit, quæ etia
pars intumuit, mox inæquales superuenire rigores, & feb
non multum vehemens, neque tamen decubuit; sed acci
operatio practico cū in tumore materiam ex inundati
ne subesse coniectaretur, & ferrum respicere ægra, caus
co viam puri fecit, vnde multa illius copia effluxit; cui
que ego, & chirurgus acciti essemus, nigredine insig
inspecta, cum lationem in osse inde coiectaret, chirurg
autem ex caustico appposito contractam in osse assereret
gredinem, scalpro rasorio meo iussu abrasa superficie pe
lo post pus erumpere capit. terebratione igitur statim
cta multa puris copia proflijit, etsi nisi ad meditullium p
uen-

Historie
medicæ no
tatu digna

entum esset : cumque in circumductione terebræ ossis alia
 præsentiretur cōmotio, cognitum est ossis superni par-
 tem non leuem abcessisse . incisa igitur in crucis formam
 te, facillimè magna pars ossis primæ tabulæ cecidit; cum-
 que retento spiritu, & occluso ore, & naribus, iterum ex la-
 ribus multam puris copiam ex fissuris erumpere videre-
 mus, lenticula per rimam dextram imposita, & vitrea ele-
 uata ab ea parte tantundem vitreæ partis ossis abcessit; e-
 rat autem magnitudinis palmi magnæ manus, suberat non
 minus puris quantitas; qua absterfa, & membrana vino ca-
 lido lota, sine macula membrana reperta est; & curatione
 arte instituta optimè conualuit, proinde tamen non prius
 effectè cicatrice inducta, quam quatuor menses præteris-
 sent: viuit adhuc senio iam confecta. similem casum post
 sex annos obseruavi in alia senio confecta ex nobili Gala-
 torum familia, quæ ob glaciem cum supina cecidisset,
 accipit ad glaciem duram alliso, à contusa parte vt dolo-
 rem amoueret, emplastro ex pane in lixivio imbuto cum
 sinthij folijs, floribus chamæmeli, & fundo olei rosati
 in vfa esset; dolore non amplius infestante tanquam sa-
 tis in domesticis negotijs assidue se se exercens: post vi-
 gesimum quintum diem cum dolere ea parte cepisset, &
 gressus superuenissent, & febris continua, & dolor in collo;
 cordatus præcedentis historię iniunxi, vt cutis in ea par-
 te in magnæ crucis formam secaretur, & obseruari quæ in
 terea a. tolescentula obseruata dixi, magna pars caluariæ
 ablata est, & eadem curandi ratione vfa conualuit, sed post
 sex menses.

164. Nollem hic aliquem censere me in eorum hæresi Purgatio-
 nis in cura
 se, qui nullis medicamentis electiue soluentibus in capitis nes in cura
 aliarum partium vulneribus vtendum censuerunt; quod tione vul-
 Animaduersionibus ijs ad curationem vulnerum & capi nerū con-
 s potissimum nullam purgationis mentionem fecerim. cū ueniant,
 um hic chirurgicas solum cautiones prosequar; non solū
 æ ad purgationē, pertinent omissa sunt, sed et quæ ad san-

guinis euacuationem per sectam venam, & ad victus rationem, & sex res non naturales. ex primis enim libris omnino hæc desumenda erunt. Illud solum in hac ad purgationem pertinente materia assertiuè cum Hip. & Græcis & Mauritanis omnibus assero, omnino purgationem conuenire ad auertendam fluxionem, & fugiendum periculum inflammationis; Quicquid dicant ex recentioribus aliqui; quorum rationes accuratè admodum profecutus est, & dissoluit Philippus Ingrassias libro huic materiae dicato, & Cesar Magarus lib. 2. cap. 57.

Vulnera oculorum quò tractanda.

165. In oculorum vulneribus illud solum animaduertendum est, fugienda omnino esse ea medicamenta, quæ mordicationem in se habent; sed omnino in usum ea erunt ducenda, quæ cum leui exsiccatione vim habent dolorem leniendi; qualia sunt abietina lachryma ex aqua rosarum lota, gummi arabicum, tragagatha, sieph album sine opio, rutia preparata, sarcocolla, & similia, vel per se, vel cum albumine oui agitato diutius per se, mox subtilissimis aliquibus ex ijs pulueribus additis in mortario plumbeo diutius ducto. quod si dolores adhuc virgeant, oleum ex vitellis ouorum omnino conueniet.

Adnata tunica vulnerata quò curanda, Nasi vulneribus quò medendū.

166. Quod si in adnata fiat carnis suberescencia, ob eandem causam; ad exsiccandam & absumendam carnem illam, leuiora venient in usum, vt puluis ossis sepiæ, testè ouæ calcinata, & calchantum vsum, & lotum.

167. Naso & naribus incisis, ne distorqueatur, formatum i ex plumbo paretur, & linea peria idoneo medicamento imbuta intus extenta parti applicetur, formulis ex cera pro naribus paratis medicamentis agglutinantibus illitis, & naribus impositis.

Sternutatione impediēte curationē quid agendum.

168. Sed quoniam sæpe dum introducuntur, sternutationum promouent, vnde dilatur vulnus, & sæpe puncti disruptis pars dilaceratur, animaduertendum, dum introducuntur, perfricandos esse angulos maiores oculorum. sic enim huic symptomati succurrere solemus.

169. Vulnerato thorace penetrante vulnere in bene ha-
 to corpore non semel obseruauī curationem longe fa-
 cilius, & citius absolui, si tubulo ipso, ut sanguis effusus &
 sanitate conceptus per viuum auralterum diem procure-
 re educi, decubitu facto super partem vulneratam; & cum
 illa superesse signa contentæ materiæ viderimus tubulo
 tracto, vulneris, ut vulnus est, curationem prosequemur.

170. Quod si vulneratis internis partibus indies aggre-
 scitur materia, tubulus non erit remouendus, ut aperto ma-
 terie osculo exitum per eam partem materia habeat: ne-
 que enim, quod aliquibus visum est, sperandum est, posse
 per tussim commodè expurgari, ut ex Gal. colligunt 5. de
 affect. 3. cum difficultate enim ad pulmonis bronchia
 oppellitur, cum potius inde ad Thoracem permeet, cum
 ille motus naturali contrarius, & præterea violentus ab
 his ad superna.

171. Quin violentia, per tussim partes internæ perpeſſa, dif-
 ficilius agglutinari poterūt; satius igitur erit per vulneris ori-
 ſum percolare, & si nō satis apertū fuerit præstabit dilatare.

172. Tubulus cauius, qui introductus, ut exitus, & pare-
 ti, & conseruetur, longitudine crassitiem thoracis non de-
 bet excedere, ut contenta materia facilius ingressum pro-
 pitu obtineat; neue longitudine partis internæ vulnus in
 totu pulmonum perficando offendar. quod si aliquantū
 longius imponatur, utrinque perforatum esse debet, ut per
 oscula illa materia penetrare possit.

173. Alatus sit, ne capacitatem thoracis ingredi possit;
 sed ligari debet ob eandem causam.

174. Superponatur tegumentum ijs imbutum, quæ di-
 citur fouere calorem naturalem; ita tamen disponatur, ut
 non impediatur effluxum materiæ; quamuis alæ ipsæ tubuli
 parte huic rei inserviant.

175. Super vulnus decumbat, quo materia pondere suo
 vulnus feratur: Quin per interualla ore naribusq; oc-

clusis spiritus comprimat, quo intumescant pulmones, quid præ-

Vulnerato
 thorace cū
 perforatio-
 ne quid
 agendum.

Tubulo v.
 tendū pro
 materiæ
 ex purga-
 tione.

Per-
 tussim ma-
 le educitur
 materia in
 vulnere
 thoracis.

Tubuli
 quantitas in
 vulnere
 thoracis.

Tubulus
 qualis.

Tubulo
 quid super
 ponendum

Vt effluat
 materia
 quid præ-
 standum

contrahaturque diaphragma, sicque materia ad orificium exprimitur.

curatio per 176. Non placet communis curandi ratio per lotiones siphone iniectas ex mulsâ, vel vino mulso, vel decoctis ex iectas thorâ hordeo, lentibus, & huiusmodi addito melle rosato, vel syrupo ex rosis rubeis, dimoto hinc inde corpore, ut omnes partes à purulenta materia abstergantur: iubendo etiam vt tussiant, & vehementer, vt & pus cum lotione facilius exeat nullaque lotionis pars intus remaneat. Nam per tussim illam, & per corporis agitationem vulneratæ partes magis dilacerantur, pars vulnerata sæpe non attingitur; ab alijs partibus ad vulneratas magis confluit materia; & quod maxime est momenti, & calor naturalis partis dissipatur, acrisque iniurijs spirituales partes magna cum læsione nimis exponuntur.

Lotionib. 177. Non negandum tamen aliquando lotiones has esse necessarias, ubi grumi adsint sanguinis: vel purulenta materia crassior fuerit, & viscidior; rarius tamen, etiam in eo casu, in usum venire debent, nec tam per longum tempus vt fieri solet. hoc casu excepto tota fere curatio naturæ erigenda: medico illam adiuuante in effluxu paranda in decubitu super vulnus; & in compressione spiritus, vt diximus.

Tussis non 178. Tussis non promoueatut aut inuitetur, ne concitetur; promoueatut sanguis, aut vulnus dilatetur; ne ve a pulmones materia purulenta inuitetur: quod si eo affluat materia, blandis lambitiuis tentabimus illam excernere.

Acetosa 179. Quæ acetum habent lambitiua omnino erunt erigenda: ne validiorem tussim concitent.

Pulmonib. 180. Si pulmones & partes internæ spirituales vulneratæ sunt, non placet instillare agglutinantia, quod plerique faciunt. naturæ enim totum negotium est committendum quæ salutis suæ curam habet. quod quæ iniectur, aut instillantur, cum extranea sint, expelli omnino debent, alioquin noxam afferunt; vtilitatem autem vix vllam inde sperari possunt.

possumus; cum non sit exploratum, vbi nam sit vulnus, neque in partem laborantem medicamentum attingere possit; uare ad aliam quamvis partem sæpe potius feretur, quam ad vulnus; & ita nulla utilitas, inde colligitur, damnum vero non leue emanabit.

181. At vbi copiosiora in dies generari excrementa viderimus, vel ob errata in victu, vel exuberantiam prauorum humorum in toto, vel ob malitiam vulneris; euacuato corpore, & transacto inflammationis, tempore placer vti aliqua vulneraria potione per plures dies, donec absumpiam narium viderimus, ex sarza parilia, plâtagine, quinq; folio, ilosella, cariophyllata, pyrola, scabiosa, radicib. consolidæ, ormentillæ, bistortæ, dictamni, rhapontici, & similibus; ex quibus variæ formulæ potionum parari solent, sed præstantissima iudicatur Iudei potio, cuius descriptio ponitur à Iacobo Carpenfi, & Fallopio, & alijs.

182. Si quando verò vulnerariæ eæ potiones in usum aut ducendæ; id fieri debet cum septum transversum est vulnere Galeno auctore s. Meth. c. 9. tuncque tubulo vulneri imposito conandum est vulnere succurre siccantibus.

Vulnera-
rium po-
tionum usus.

Vulnerati
diaphrag-
matis cura
tio.



Lectori beneuolo.

DEcreueram, benigne lector, Animaduersiones has & Cautiones chirurgicas, quas septē libris precedentibus coactus amicorum precibus, quin importuno etiam studiosorum medicinarum impulsu adiunxi, ad curationes quoque vlcerum, & tumorum præter naturam deducere; sed multa me ab hac sententia retraxerunt: Et primum munus nuper mihi impositum Archiatri Regij; vnde multa ac magna mihi superaddita esse videbam negocia: inter quæ illud erat præcipuum visitandi Pharmacopolia totius huius provinciae; in qua cum pharmacopolæ nullum certum, quod sequantur, habeant Antidotarium, in multos errores incidebant, quos etiam sæpe excusare solent, quod in ijs componendis obseruent auctores varijs inter se certare opinionibus. cui incommodo, vt quamprimum occurrerem, ommissa chirurgica materia, necessarium duxi in ijs statim Cautionibus & Animaduersionibus insistere, quæ ad medicamentorum componendorum varietatem pertinent, potissimum quoniam videbam, si in primis illis institissem, octauum hunc librum in nimis magnam melem euasurum, & in re non adeo necessaria; cum videam chirurgiæ partes illas diligenter, & ab antiquis Græcis, & Mauritanis fuisse pertractatas, & à mediæ ætatis medicis auctas, postremoque à recentioribus illustratas, & perfectas; quod in cruentorum vulnorum curatione ob nouiter inuentum illum medendi modum non adeo adimpletum animaduerteam. Deinde in hac ætate iam efflata septuaginta sex annorum, in tanta negotiorum mole, muneris Archiatri, & assiduarum, & scriptis & voce, consultationum medicarum non plus operæ licuit collocare: præterquam quod quotidiana etiam studia, & iamdiu impositum munus

LIBER VIII.

71

Libros Aristotelis morales & politicos ciuibus meis inter-
pretandi parum mihi otij concedunt, idque breuiori tem-
pore, quam hoc institutum nostrum breue quidem, sed
periculum, exposulasser. fruiere igitur, amice lector, labo-
ribus fortasse postremis ijs nostris, & venia dignum
me cense, si in re fortasse à genio meo aliena, &
in prouincia quasi inuitus suscepta contra-
cto ambitu verborum, pressaque pe-
riodo quædam transacta sunt,
& in sequenti libro tran-
sigentur: in tam
numerosa e-

nim

medicamentorum turba, potior est
verborum, moderatio, breui-
busque sententijs res
potius premen-
da videtur.
vale.



72
L V D O V I C I
S E P T A L I I
P A T R I C I I M E D I O L .

Protophyfici generalis Status Mediolani , &
Actiuæ Scientiæ publici in Patria
Professoris,

Animaduersionum , & Cau-
tionum Medicarum

L I B E R N O N V S .

Continens eas quæ ad medicamentorum
compositionem pertinent .



Enigmæ illius ac sapientis parentis no-
stræ naturæ perpetuum studium fuit
vt quam diutissimè opera sua ab inter-
ritu vindicaret. vnde certo quodam di-
stinctum viuida quædam Dei vis sit, et
fecundo illo gremio abundè profici-
efficacem remediorum potentiam, quæ
ferocissimi humanæ vitæ hostes abigi possint, ac opera sua
quam diutissimè ab interitu vindicemus. Quamuis autem
omnibus, & medicis, & ægris, illud oprandum foret

sponte nascentibus, & quasi è gremio naturæ effusis
gram corporis valentudinem conseruare, & aduersam
cellere possemus; hoc enim certius, & expeditius foret
ga illa, & ambitiosa remediorum mole. & re vera
npermixti essent morbi, nulla arte, sed simplicibus, vt
ois à summo Deo concessa sunt, satis contenti esse pos-
uis, quæ tamen in simplicitate sua varijs potentijs de-
ata fuere. Sed cum id à natura obtinere non poteris-
is, naturæ ars imitatrix implicitis, & remixtis morbis,
iè combinatis, aut dissimilitudine pugnantibus, ac insa-
ntibus variè, commixta remedia, inuenit. Multas com-
scendorum medicamentorum causas enumerauit Aera-
l. 7. cap. 2. Cum morbo profligando deest medicamē-
n aliquod simplex omnino contrarium, tunc duo, aut plu-
commiscesmus, vt quod optamus facilius obtinere possi-
is. cum violentiam medicamenti obtundere, vel eius
nauiam promouere volumus. cum varietas affectuū ad-
erit, partium laborantium, tum & diuersitas humorum
stantium: cerebro enim pulmoni, cordi, epati, & alijs
tribus malè affectis, id dari debet medicamentum, quod
gulis prospiciat, & à causa morbifica liberet. Situs quo-
e, & dignitas partium affectarum compositionem neces-
iam commostrant. nam pars quælibet ex principibus nō
um peculiaribus remedijs est roboranda, vt cerebrum ce-
alicis, cor cardiacis, ex Gal. 1. de comp. med. sec. gen. 1.
sæpe non solum alteranda, sed etiam ab humore pec-
ate expurganda, quod vno atque simplici medicamento
estari minimè potest. Pars insuper longè à remedijs dis-
a ostendit sæpe attenuantia permisceri debere, vt faci-
is qualitas medicamenti ad partem deferatur. Hinc tes-
antia diaphoretica, & purgantia, liberata à materia ter-
stri, & crassa, latius suum faciunt officium. Aliquando
cebat Galen. 1. de compos. med. per gen. 3. ob vniuersi-
tatis vehementiæ obtundendæ gratiam, vel insinuatiss
ingandæ, qui veratro daucum, vel sceleri, vel cuminum,
vel

Medica-
mentorum
miscendo-
rū causa.

**Proportio
inter misce-
bilia seruā-
da.**

**Recitiorū
errores in
formulis
composito-
rū mutan-
dis, & illo-
rū causā.**

**Causę scri-
bēdi has a-
nimadu-
er-
siones.**

vel anisum, vel aliud odoriferum admiscuit; demonstrum enim insuauitatem in potu moramque in ventriculi condimentum requirere. Has omnes causas permiscens simul medicamenta diligenter enumerauit Auer. 5. collect. cap. 57. semper tamen proportionem quandam inter miscibilia seruandam censuit, ut ab ipsa resultaret, & emergeret natura quædam, & specifica forma, ut docebat Gal. lib. de Ther. ad Pisonem cap. 10. varijs exornata facultatibus, diuersa à singulis componentibus, à qua non raro ac mirandę exoriuntur operationes: etiam si fere semper in titium omnium operationum ab aliquo simplici, quod B. sim medicamento illius dicunt, trahat, & ducat. Ut mira sæpe contigerit iuniorum, quorundam audaciam, qui in antiquorum compositis medicamentis describendis, diuerso quin & quandoque contrarios ac repugnantes componendi modos, & ab Auctorum præscripto plerumque recedenscriptis mandarunt, ut sæpenumero vix duos inueniamus in eadem compositione tam describenda, quam fabricand consentientes. obseruauimus præterea ex Pharmacopœi non paucos, non ex Mesueo alijsue classicis auctoribus, neque ex vulgatis Antidotorijs formulis desumptis suas formare compositiones, sed ex schedis quibusdam mutilis & obsoletis à præceptoribus, à quibus artem didicerunt, quasi per manus traditis: Alios videmus, qui, cum non attigerint causas componendorum medicamentorum; vix simplicium medicamentorum naturam, & facultates nouerint; nouas suę inuentionis, ut aiunt, sine methodo, sine dilectu multiplicibus herbis, seminibus, radicibus, fructibus, metallis; in vsum collectis, non ad correctionem, non a vigorem addendum, non ad penetrandum describunt, & tanquam ad omnes morbos accommodatas, tanquam Agyræ & circulatores miris laudibus ad cælum euehunt. Hæc ita esse periti medici cum quotidie obseruauerint conquesti sunt aliqui ex ijs mecum; quod cum Cautione & Animaduersiones medicas cōscripserim, & chirurgicas

quæ ad compositionem medicamentorum pertinent ;
 nino intactas reliquerim . quorum querelis vt pro viri-
 satisfacere , precedenti libro eas prosecutus sum , quæ
 medicina ad manualementum operationem pertinent ; Nunc
 ijs , quæ in compositione medicamentorum positæ sunt ,
 hi versandum erit . In quibus licet quamplures exercue-
 ingenium , quoniam tamen sæpe adeo inter se dissident
 artifices hæreant animo , neque sciant , cuiusnam opinio-
 in sequantur : Et propterea in magna hac nostra ciui-
 non determinatum vnum auctorem aut Antidotarium
 uentes , varij vario modo medicamenta componunt cum
 gna ægotantium iactura , & nostratum medicorum no-
 quod magis censendū est euenire in tota hac Mediola-
 si ditione : cui incommodo , vt occurramus pro munere
 c impostito Protophyfici , dum cum consensu collegio-
 aliarum ciuitatum Mediolanense Antidotarium par-
 ur , Animaduersiones has adscribam , quæ excitare ad ve-
 tem ijs in rebus eruendam animos aliorum facile po-
 unt .

1. Et vt primum à delectu Simplicium generico exor-
 13 Plantas , & herbas docebat Aristot. lib. de Plantis eas
 eligendas , quæ semine perfecto , loco conuenienti , aqua
 derata , & aere consimili producuntur ; quibus si defi-
 nt , imbecilliores euadunt ; aerem enim , & locum ma-
 nam plantis vim impartiri præter Teophrastum lib. 1.
 causis plant. c. 9. docuit in can. Mes. ad particularia e-
 n descendens ; ad quem pro hac re , ne præter proposi-
 nostrum longior sum , lectorem remitto . quæ omnia
 ampta sunt tum à Diosc. lib. 1. tum maxime à Galen.
 le Antid. ca. 13. namque inquit Diosc. quæ in campe-
 bus , riguis , & opacis , cæterisque locis à ventis silentibus
 scuntur , plerunque degenerant , & minus viribus va-
 . Sed nec locorum & natalis soli indagationem hanc
 icere censuit Galen. 1. de Antid. cap. 3. & 13. & 1. de
 apof. med. per loc. cap. 2. nisi etiam cuiusque saporis ,
 odo-

In simpli-
 cibus eligē
 disquid ob
 seruandū .

odores, colores, substantiam, magnitudinem, figuram, diligenter perpenderimus.

Radices
quādo col-
ligendæ &
conseruari-
dæ.

2. Colligantur radices docente Dios. lib. in princ. vt 1
condantur, cum herbæ suis folijs exuuntur; nempe autum-
no finiente, & hyeme incipiente. cum enim caulem proc-
cunt, cum florent, cum semine grauidæ sunt, languidiore
euadere docebat Gal. 2. de alim. fac. c. 61. Siluestres,
saxosis locis natæ seligantur; expurgatæ siccantur, sed ter-
aut puluere obsitæ prius eluantur aqua; quæ magnæ sunt
in intimis exsiccati nequeant, in frustula secantur, & in um-
bra siccantur, & traiectæ filo recondantur sic docente Di-
oscor. cap. de Helenio, & de Iride. sed cum ex radicibus
liquæ sint, quarum vis in cortice solo reposita est, hæc ex-
patis internis partibus sæpè lignosis, asseruari debent. sic d-
cuit Gal. 7. simpl. de corticibus radicum capparorum.
Diosc. de radice Rum icis. sic Mesue cap. de secaniabin,
plerique Mauritani.

Quales herbæ pro vsu medicinæ eligendæ sint, & qu-
modo conseruandæ, docuit Gal. 1. de Antid. c. 2. de ijs loqu-
quæ exsiccatæ ab alijs regionibus deferuntur his verbis. 1
herbis siquidem quæcunque vna cum semine summis
musculis adhærent apportantur, pro cuiusque tamen con-
tione plurimum seminis habentes, vegetas exilibus, pond-
rosas, leuibus, cōpactas flaccidis, tempore non consumptæ
absumptis potiores arbitrantur. at 4. de San. Tuenda c. 4.
cebat: Herbæ autem, quæ apud nos reperiuntur vna cum
floribus, minutissimis, tenuissimisque festuicis colligantur
quibus quidquid lignosum est, abijciendum. In umbrā
centur ex Gal. 5. de compos. med. per gen. 9. Quæ ran-
scantent, dicebat Diosc. li. 1. in proem. sicut stēchas, Ti-
sago, Polium, Abrotanum, Absinthium, Hyssopus, & alia
genus, semine prægnantia demetantur. subdit, sola ex h-
baceis medicamentorum generibus, veratri genera,
grum, & album multis edurare annis; reliqua à tri-
mutilia. at id meo iudicio solum intelligendum est
his,

, quæ insigni caliditate præditæ sunt, quæque ex calidioribus locis, & siccis deferuntur; multæ enim, potissimum apud nos nascuntur, post annum proprijs viribus destituuntur.

3. Flores non colligantur rore madidi, sed iam à sole imiditate absorpti. neque tamen à vi solis nimium strigati, ut odorati remaneant. Tempus colligendi non sit, cum sunt decidui, neque vltima referatio illorum expectanda est, ut Auicenna placuit, tunc enim in odori remanent: sed nec colligendi, cum maturi quidem sunt, sed tamen alio modo conuenient, sic iubente Gal. 4. de san. tuenda. siccentur in umbra, Dioscoride admonente, sed interim aduè versandi sunt, ne muceant, neque post sitis illis insint. Alij flores, ut rosas & violas sole exsicccandos imperant; ne situ contracto odorem, & colorem amittant. at solis vitæ calore igneæ & æreæ partes odoratæ absorbuntur, & exhalant; substantifica verò tenuis illa humiditas penitus siccat.

4. Semina legantur, ubi ficcari ceperint, antequam desiccent, Dioscoride in præmio docente: sint præhumida, plena, ponderosa, ex Gal. lib. de cibis boni, & mali succi cap. 2. humidum est enim sufficientis materiæ, & viuidi caloris consequentis. Quousque reposita durent docuit Gal. cap. 10. de alim. facul. cum dicit: Horum porrò terminus est, cum ab ipsis diuisis quasi puluis quidam tenuis concidit.

5. Herbarum succus ex folijs non nisi germinantibus, tunc cauliculis teste Dioscoride, exprimendus est: tunc enim cum facultas maximè viget, cum in semine producendo, cum vim suam vires exerunt.

6. Non placet eorum opinio, qui ante ortum solis colligendas esse herbas, quin & flores ad eliciendos per expressionem ex ijs succos. sic enim nec sinceris habere possunt succos, ob roris admixtionem, nec innoxios; quod roris admixtio nitrosam inducat naturam: sæpe obseruatum, rosarum rore aspersarum infusionem, & expressionem,

Flores quādo colligendi & quō cōseruari.

Semina quādo colligenda & quō seruari.

Succus ex herbis quādo extrahendus.

Succus ex florib. aut herbis non extrahendus ex ijs collectis ante ortū Solis, ob rore.

validiorem quidem in euacuatione esse, sed torminosam
maximè, doloresque in testinis inducentem.

succi vt cō 7. Vt à putredine vindicentur succi, superflua hum
seruentur, ditas elixatione est absumentur, simulque inde terrestres
sunt prius partes segregabuntur deorsum latæ, tenuiores verò & ven
elixadi & tose partes, tum & excrementitiæ, per despumationem to
expurgadi lentur. sic docuit Gal. 3. simp. cap. 15. In succis omnibus

dicebat, aliud quid grauissimum, aliud leuissimum, aliud
terreum est illi permixtum: vnde euenit alios acescere, &
alios corrumpi, & ideo indigent ab initio coctione quadam

succi, vt cō 8. Decoquendos docet Mesue ad tertiæ partis consum
seruentur, prionem, despumando, percolando; & antequam reponantur,
quousq; eli tur, permittendos donec resideant, tuncque transfundendo
xadi & qñ & oleo angusto vasis orificio superinfuso seruandos. Aui
reponendi. ad dimidias decoquit; sed hoc modo subtiliores partes ni
mum dissiparentur. Tutius autem est succos hos decocto

& depuratos saccharo vel melle addito à putredine vindicare;
quamuis aliqui ex succi sola insolatione sine elixatione,
ne, ob eorum aciditatem, vel potius acerbiteriam, aliquandi
conseruari possint, vt citriorum, citoniorum, granatorum
& vuæ acerbæ; ne tamen corrumpantur, aut sunt saccharum
condiendi, aut oleo superfuso conseruandi.

Succi ali- 9. Succi iidem inspissantur, & quasi exsiccantur decocto
qui vt con prius, & depurati, vt diximus, aut igne, aut insolatione,
seruentur docet Gal. 6. de compos. med. sect. loc. 2. ex Androm
exsiccantur. cho. insolato, aut coquito ad spissitudinem & cap. 3. Qu
dam vero succi etsi ad Solem estiuum exsiccentur, ad m
deratam spissitudinem, per tempus tamen exarescunt;
vuæ acerbæ succis, Centaurij, glycyrrhizæ succus; quibus
suadet aliquid mellis addendum, ne ita resiccentur.

Succi soli 10. Vt puriores euadant, persuadet Gal. 6. de compos.
expositis med. per loc. 2. vbi soli exponuntur, vt tenui aliquo regi
cooperiendi mento operiantur, ne aliquid in ipsos decidat, quod & pre
cepisse, & obseruasse videmus Diosco. libr. 4. cap. 156. c
Elateio. Humor, inquit, in pelui agitur, & linteo ope

us soli exponatur.

1. Cauendum igitur, ne per ignem succos incrassandos fiat ardentissimo igne, ne illos adurat, nimium exsiccat, quod ex Galen. omnino fugiendum esse iam docuimus. ideo Auic. Elaterium, ut excedentem vim caloris efficeret, super cineres calidos exsiccat.

2. Caueant autem quam maximè pharmacopæi, ne succos igne condensare conantur, igne id præstent venientiiori, sed maximè ne in æneo vase succos hos condensandos igni exponant, tum ne æstuantis caloris vi eo facultas destruat, neue a vase perniciofa introducantur facultas: præcipuè cum ob introductam in illis crassificationem, dum à vase condensatum succum eximere voluerint, necessarium sit detergendo aliquam etiam aris portionem adhibere, præter eam qualitatem, quæ in coctione imprimi solet.

3. In mucilagine ex rebus viscedinem in se continens extrahenda video etiam errores committi: aliqui enim semina puta lini, sceni græci, psyllij, vel radices, ut malualtheæ, & similes linteo lineo impositis decoquunt, & cum manibus vel ligneo aliquo instrumento placide exprimunt, ac mucaginem exprimunt. Alij in calida aqua eadem per diem integrum infundunt, mox verò quasi ignantes valenter exprimunt, mucaginem colligentes: verò aquea humiditas admixta alsumatur, vniua facta collitione id obtinere tentant. Mesue cap. de Psyllio, a frigida macerat illius semina, atque agit ad mucaginem extrahendam. sed is id præstat, ut ab externis partibus, quæ frigidæ sensuunt, mucaginem eliciat, neque aqua, cui inmergitur, internas calore attingat, quas calidas & siccas sensuunt: sed quam benè, sensu gustus, & Græcis omnibus medicis repugnantibus, alij viderint. decoctionem solus Aesculapiades ex antiquis admisit, cum alicui per eam viscedinis immittatur attenuata materia. Satis igitur erit, si aqua immergantur per diem & noctem, ut docuit Auic.

lib.

Succi igne incrassandi igne temperato.

Succi igne incrassandi, ne eo vase excipiantur.

Mucilaginibus extrahendis varij modi, & quis melior.

lib. 5. can. in compositione diachylonis. sed cum per immersionem hanc mucago aqua referta esset, leui ebullire ne absumendam post expressionem docuit Damocrater pud Gal. 2. de compos. med. per gen. c. 10. & Auic. lo proposito.

Gummi & lachrymæ
quò paran-
dæ, vt in
vsum ve-
niant.

14. Ex gummis, & lachrymis aliquæ teri possunt, si lachrymæ toris & humiditatis sint expertes, leuiter, tamē & lentē fillo hinc inde in mortario circumuoluendo, ne in placet tam coeant Gal. 2. de Antid. ca. 15. de Thure & Gummi Quæ vero multum lentorem in se habent maceratio emolliri & dissolui possunt, docente Galen. 7. de comp med. per loc. 1. de Arteriaca Critonis agens, de styrace: tamen prius pistillo crasso confrāgantur, melius esse ce fuit Gal. 1. de Antid. 5. & 2. de Antido. cap. 15. possu tamen, si in paruas partes confrangantur, & alijs triturbibus misceantur, paulatim etiam in puluerem deduci, sic ce cente Gal. 2. de Antid. 15. de gummi cum thure pulue zando.

**Metallorū
& metalli-
corum va-
rij lauandi
modi.**

15. In metallorum & metallicorum ablutione va modo video Galenum procedere, pro varia medici intutione. si enim excalefaciendi vim, & mordicationem in minuere voluerimus, cum siccandum fuerit, bis, ter, & (pius ex aqua lauabimus, prius tamen ijs leuigatis vt 9. suplic. docuit. quomodo id faciendum sit docuit 2. de compos. med. per gen. dicens; ijs exactē comminutis ex aqua fluiali purissima esse abluenda, deinde priori effusa sapiquoad nihil in aqua innaret, maneatque prorsum à contramedicaminis qualitate illa immunis. sed in Argenti smæ, lithargyri abluendi modo tradito à Gal. 3. de con med. sec. gen. cap. 10. cæteri lauandi modi colligi possunt. Porro, dicebat; poterit tota die diligenter contritum cum liquore per noctem relinquere: postero die illum mne auferre: alium mox superinfundere; postea rursum rere similiter; iterumque sequenti aurora liquore emittet: quod faciendum est, donec simul cum humore Argenti

na, veluti tenuissima quædam portio appareat: cumque nihil amplius innatat, nihil etiam magis effundendum erit: attamen contere diebus plurimis, etsi nihil ei insittat, id tunc sole feriente satius est. ita enim accedit, ut medicamentum exsiccet valentius. Porro nouerunt omnes id æstiaton solum in Argenti spuma; verum etiam in alijs, quæ hodie præparantur, fore commodius: siquidem Cadmia, tris squamma, æs vstum, Diphryges, cerussa, misy, sery, inni, & omnes lapides, præterea & calx, perinde ut Argenti spuma cinguntur, & læuigantur.

16. Quod si fortia metallica hæc fuerint, & sensum tantus acrimonia exasperantia, ut malitiam imminuamus, xsecationem tamen augeamus, acerrimo aceto per solem ut ignem per plures dies eluenda esse præcipit Gal. 2. de compo. med. per gen. 2. cum dicit: siquidem meminisse os puto, & huius, quod toties repeto, fortium medicamentorum, ut Aerugo, Misy, chalcitis, Sory, Aeris squamma, el chalcantum, ex aceto diebus pluribus contritorum norsum obtundi, & bonitatem augeri. & cap. 12. Metallica dicebat, pluribus diebus aceto longè acerrimo atterio, & potius in Sole, & non raro loco caloris ex Sole, igne vtendum. quoniam huiusmodi omnia æstiuo Sole meliora fiant, multis diebus trita, quædam ex vino, quædam ex aceto. Sed libro primo sect. loca cap. 18. quando iam ex aceto, quando ex vino, quando ex aqua marina, & quando ex aqua simplici pro varietate indicationum medicarum abluenda sint metallica, medicos docet.

17. In prætumidis vlcibus, inquit ibi, & duris, ex aceto & marina: in quibus autem acre & mordax humilum fuerit, ex aqua terere frigida potius singula metalla varijs necessesse est; quemadmodum ex vino, cum copiosus humor influens appareat. sic 4. per genera cap. 7. subtiliora, quæ abluenda, ex aceto, & ad cicatricem inducendam ex vino melio-

Metallico
rum aceti
perfectus
lauandi mo-
dus.

Metallica
quo & cur
varijs li-
quoribus

**Metallica
adusta a,
qua abluen
da.**

18. Aduruntur quandoque metallica, vt ignæ partes quas multas, terreis & aqueis mixta habere 9. simpl. docuit Gal. ex parte euanescent; siccitas vero remaneat. Quoniam tamen ex ignis actione caliditas quædam extranea intro ducitur, censuit Gal. 9. simpl. c. 1. omninò aqua post adu sionem esse abluenta his verbis: Sanè combustorum om nium nullum planè est frigidum; relinquitur enim in illi ignitio quædam, vt Aristoreli placet; hæc autem per ablutio nem auferitur: vnde id, quod manet, terrenum simul, & fri gidum est.

**Metallica
adusta, vt
mitiora
fiât elixan
da.**

19. Quod si compescere adhuc magis illorum acrimo niam & mordicationem medicus voluerit; ebullitione in a qua longiore, faciliè id obtinere posse docuit Galen. 4. de compos. med. per gen. ca. 6. & 2. eiusdem ca. 2. Nam quæ metalla, inquit, præparas ad siccandum si ne vllò moris coquere diutius oportet.

**in decoctio
ne simpli
ciũ vt pro
se aut per
dicēdis sy
rupis cano
nes Mesue
seruandi &
dosium.**

20. Simplicium decoctio, quæ & per se, & pro diluendi syrupis in vsum medicum frequentissimè venit, vbi non pro compositione medicamentorum paratur, eo modo exer cenda est, quo in canonibus Mesuei est traditum: cùm co ctionem non sustineant elixabilia omnia equalem; sed alia leuem, vt quæ facultatem habet imbecillam, facile dissolu bilem, & substantiam raram; quæque virtutes habent in ex timis partibus; ne eorum virtutes dissipentur, & euanescant alia validiorem coctionem sustineant, quorum nempe sub stantia firma est, crassa, densaque, & virtus non facile resol uitur; Alia mediocrem, qualia sunt, quæ inter duo illa ne dia sunt; vt fructus, qui nec tam leniter, vt flores, & adian thum; nec tam validè vt radices elixari debent.

**in decoctio
nib. cū præ
cedere infu
sionis nō ē
necessaria
tempore in
graduatio,
& cur.**

21. At in decoctis ad compositum aliquod parandum factis; sæpenumero ab auctoribus eorum, quin ab institutio ne canonis illius, secus factum videmus. omnia enim eodè tempore in aquam iniicere imperant, ac macerare, quæ po graduatio, stea etiam simul ebulliunt. sic Mesue in syrupo de Absyn tio, & de Mentha, & in decocto epithymi parati pro Tri phe-

nera Persica, & in decoctione pro confectione Hamech, in maximè in decoctione parata pro pilulis Alefanginis; in quibus & aromata, & flores, & crassiora quædam dem tempore maceranda, & decoquenda imponit, & ad midias simul excoquit nulla subtilium à densis facta distinctione. sed omnino à primorum institutorum compositum illorum prouisionibus non esse recedendum semper existimaui. neque præter rationem ita constitutum esse suo loco demonstrabimus. Nunc verò in vniuersum dicemus, ut de simplici decoctione agimus sine præcedente infusione, & maceratione, omnino seruandum esse canonem illum. At ubi longa præcedit maceratio, cum diuersæ illæ qualitates extractæ quasi vniantur, & coeant; & crassiora, & scidiora prohibeant tenuiorum dissipationem, ac exhalationem: tenuia verò, & calida mediante calore elixantes citius ex solidioribus qualitates in profundioribus partibus persistenter extrahant, credendum inde mixturem quantum produci maximè accommodatam illi medicamento. Et forte Mese in decocto pro pilulis Alefanginis Mastim indidit. ut eius lentore aromatum subtiliores partes, facultates conseruarentur, & myrabolanorum virtus solens in longa ebullitione conseruatur per inunctionem & frictionem manibus factam oleo amygdalino.

22. Aquæ quantitas, si decocta per se parentur, aut pro fluendis syrupis, certa pro variare coctibilem decerni non potest; certum tamen est maiorem esse debere, ubi liqua aut radices prævalent, ut eorum virtus aquæ possit communicari.

23. Sed si in duplici vase, vel operculo benè occluso, ut non exhalet, decoctio etiam solidiorum fiat, dimidio minus aquæ quantitas erit indenda, cum & blandiori calore perficiatur, & circulatione facta minima portio absumentur.

24. In decoctis autem pro compositis parandis medicamentis, omnino mensura seruanda est ab illis constituta; pro cõpo-

Aquæ quantitas pro decoctis parandis incerta

decoctio in duplici vase minorè requirit duplo aquæ quantitatē.

In decoctis pro cõpo-

nēdis medi neque statim, quod maior videatur, quā res decoquenda
 camētisnō dā requirant, inmutanda est, quod plerique faciunt : fas-
 est mutan- pe enim sit ab autoribus, v. per longam coctionem terre-
 da aquae stres medicamentorum partes extrahantur, vel calidā ni-
 quātitas, et mis, & igne exhalent, aut propter vtrāque causam me-
 si maior lior quaedam introducatur symmetria : saepe etiam dum ad
 aut minor simplicium ingredientium quantitatem, respectu aquae
 videatur, respicientes, minorem debito esse censent, & augendam
 & cur. iudicant, decipiuntur; non animaduertentes decoctionem
 illam adeo pressam ac à regulis senotam, esse in dupli-
 ci vase, & per balneum aquae faciendam, in quo modo eli-
 xationis longē minor quantitas aquae necessaria est; nec a-
 dustionis vilius subest periculum.

Decoctio
 ocluso & 25. Si etiam ocluso, & lutato vase elixatio faciend-
 lutato vase est, igne secco, non per balneum : vt minor multo aquae
 minorē a- quantitas indenda est, quod circulo per euaporationem fa-
 quae quāti- cto, ex euaporatione denuo aqua defluat, minimumque aquae
 tatē requi- quae absumatur; ita ignis multo minor quantitas, & fin-
 rit, & mino- flamma erit subdenda; ne ex vehementi ebullitione eleu-
 re ignem. ris cum impetu exhalationibus, & vaporibus vas fictile, &
 vitro illitum disrumpatur.

decocta sic 26. Decoctiones hoc modo factas lento igne carbo-
 co igne fa- num, potissimum si decoquenda sint res durioris substanti-
 cta longe- tiae, multo validiores quilibet experietur, quā si fiant ad
 sunt valen- balneum aquae calentis. Quamvis enim calor is blandus,
 tiora quā diu perduret pro maceratione ad vires medicamentorum
 quae in du- extrahendas, & aquae communicandas sit aptissimus: ad e-
 plici vase. lixationem tamen, aut simplicem, aut post macerationem
 vt ex penitioribus partibus qualitates medicamentosa eli-
 ci possint, & aquae communicari, ignis caliditas sicca mul-
 tō est potentior : & si quis decocta hoc modo parata, vt e-
 guaiaco, radice chinae, sassāfras, radicibus, & herbis calidis
 gustu, & olfactu de perfectione illius periculum facere
 voluerit; & illud comparare cum eo, quod elixatione pe-
 balneū aquae calidae factū est; facile cognosceret, illud multo
 esse

le potentius, meliusque concepisse facultates ingredientium.
 27. Ut quantitate aquæ pro decoctis parandis vari-
 andam esse pro conditione simplicium ingredientium do-
 cimus; & pro vario modo elixationis; ita video scripto-
 ris varios in termino ebullitionis, nunc ad tertie partis
 consumptionem excoquentes, nunc ad dimidiam, nunc ad
 tertias consumptionem expectantes: ut videre est Da-
 vocratem fecisse, radices filicis, & aromata ad consumptio-
 nem dimidij excoquendo apud Galen. 2. de compos. med.
 per loca 2. & 9. lib. eiusd. 1. ex Archigene ad tertiam par-
 tem & c. 4. ex Asclepiade & 2. per gen. ca. 17. aut ad ter-
 tias lib. 8. c. 2. statuit autem Gal. 7. local. ubi de confectione
 capitum papaveris agit, tandiu esse res ebulliendas, quousque
 simplicium natura sit liquori distributa; id verò dicit esse,
 cum simplicia sunt flaccida.

28. In decoquendis simul in aqua rebus diversis substan-
 tiis, quæ ad communicandam vim suam aquæ diversitatem
 exposcunt, cocturæ, temporis, conditionis ignis, & forte
 mensuræ aquæ, quoniam video, duos diligentissimos
 pharmacopæos Hispanos maximè inter se dissentire; & in
 aliquibus cum etiam ab ipsidem ipse sum discors; decreui hoc
 loco longiori aliquanto oratione præter morem, & institu-
 tum meum uti, ne in re tanti momenti in posterum phar-
 macopæi aberrent. decreui autem eorum dissentientes senten-
 tias in medium proponere, & denique meum ea in re interpo-
 nere iudicium; Franciscus Velezius primò ex Mesueo sibi su-
 mit in decoctionib. duo esse perpendenda, substantia rerum
 decoquendarum, & commensurationem proportionemue ca-
 poris ad debilem, vel fortem substantiam rerum excoquen-
 darum; cui tertium addendum censet quantitatē rerū co-
 quendarū, & liquoris, in quo res illæ sunt excoquenda; Primum
 illud licet cogniri difficillimū sit, quod gradū, substantiæ co-
 gnoscere paucissimis sit datum: ad tres tamen gradus redu-
 cenda ea iudicavit, quæ crassam solidamve habent substantiā;
 quæ mediocrem; & quæ tenuem, in radicibus seminibus,

Elixationū
 termini va-
 riantur pro
 varietate re-
 rum exco-
 quendarum

Digressio.
 decoctio re-
 rum substan-
 tiarū diversa
 rum quā pro-
 portionem
 exposcant
 temporis, i-
 gnis, & a-
 quæ.

Francisci
 Velezij
 hac in re
 sententia.

& floribus expressam . e quibus vt decoctio mediocris suffiantie haberi possit, qualitatibus correspondentibus prædta, censet pro libra radicum sex aquæ libras esse sumenda; & per decoctionem tres esse absumendas, vt ex solidio substantia medicata qualitates aquæ communicari possint pro feminum libra excoquenda; cum mediocris sint substantia, quatuor libras aquæ cum dimidia vult esse sumenda & per coctionem libram & mediam absumendam. Ad florum libram elixandam tres aquæ libras & vnciam sumit absumendam verò solum vnciam . Quod si simul res h tres excoquenda fuerint; ait, hoc modo esse procedendum . Quoniam si seiunctim decoquantur, eorum virtus in libram nouem aquæ relinquebatur, vt hoc idem in decocto rerum simul coctarum facto relinquatur; duodecim libris aquæ sumptis, primo libra radicum imposita, absumenda erit coctione libra vna & media aquæ, mox libra feminum addita per iteratam vltiorem elixationem septemdecim vnciæ absumuntur amplius aquæ; & florum post addita libra, leui facta ebullitione, vna absumpta vncia, nouem decoctionis supererunt libra: quæ tunc percolari poterit, vbi reppes nullum amplius emiserit fumum . Hanc graduationem seruandam censet, si media libra excoquenda eorum sit in sex quidem solum aquæ libris: pro radicibus tamen sesqui libra absumpta, & additis seminibus, & floribus, eadem ac proportionem absumpta aquæ quantitate. & secundum hanc proportionem, dicit posse nos & quatuor vncias, & duas libras earum coquere. Contendit Ouiedus modum hunc elixandi res substantia differentes malum esse, atque liquorem cum illis hoc modo excoctum multò minores vires in se continere, quàm si singula: per se excoquerentur, primò quia aquæ qua pro elixatione vtimur, pars absumitur, pars seruatur; quæ absumitur, proportionem respōdet substantiæ rei, quæ coquitur pro crassa, media, aut tenui substantia rei excoquenda; aut pro centrali aut superficiali virtute medicamenti excoquendi: & quæ superest proportionem habebit ad virtutem, quam

Ouiedi re-
futatio.

quam ē medicamento in aquam tentamus extrahere, vt si
 libram radicū excoquamus in libris sex aquæ ad con-
 sumptionem medietatis; eam vim radicū extraxisse sup-
 ponemus, quæ pro moderata dosi requirebatur; quod si vl-
 terius procedat coctio, & selquilibra sola supersit, multò ef-
 ficacius reddetur in pauciori quantitate aquæ tota præxi-
 gente virtute redacta. At si minus absumatur aquæ, & ma-
 ior quantitas aquæ supersit, minoris virtutis, & actiuitatis
 erit aqua superstes; & ob maiorem relictam aquæ quantita-
 tem, & ob breuiorem coctionem. Si igitur virtus libræ ra-
 dicū coctarum in sex libris aquæ perfectissimè relinqui-
 ar in tribus relictis; si in nouem, vt priores volunt, excipia-
 ar, quis dubitat futuram illam decoctionem minoris acti-
 uitatis, quàm quæ in tribus continentur, quæ sex partibus
 minor est. Idem de seminibus, & floribus excoctis eo mo-
 do dicendum erit. Aptissimo id exemplo explicat Oue-
 nus. si ex vase continente tres libras aquæ, in qua liquata
 libra sacchari, & alio nouem libras aquæ continente, in
 qua dissoluta itidem alia libra sacchari, sumamus duo vā-
 cula illarum aquarum, quis dubitauerit multò nos dulcior-
 em eam pensuros, quàm ex vase trium librarum aquæ
 cum libra sacchari; quàm eam quam ex alio nouem libra-
 rum aquæ cum vna sacchari exhauriemus. Pari ratione nō
 est credendum in nouem illis ex graduata illa radicū, se-
 minum, & florum decoctione superstitis, tantam reperi-
 ri virtutem radicū illarum decoctarum; quanta reperitur
 in tribus libris ex sex relictis cum solæ radices elixabantur;
 etiamsi tam in composita ex duodecim libris tres sint ab-
 sumptæ, quàm in simplici, cum ex sex libris totidem tres
 sunt consumptæ: cum vis libræ radicū, nouem libris a-
 quæ communicata multo minoris actiuitatis sit, quàm quæ
 tribus. Iterum decipitur, cum aucta aut diminuta ad dū-
 plum quantitate radicū seminum, & florum, augendum,
 aut diminuendum pondus aquæ ad dūplum, & in absumen-
 da aqua per elixationem eandem seruandam esse propor-

tionem censet. cum enim augemus aut minuius quantitatem simplicium ingredientium, id non praestamus, ut augemus, aut minuius vires illius decocti; sed quod maiorem vel minori indigemus quantitate decocti: at si modum hunc decoquendi traditum à Velezio sequamur primum illud non obtinebimus. Exemplo id probat Quiedus. Penitus medicum velle, quod duae librae radicum decoquantur in libris octo aquae ad consumptionem medietatis, ad quatuor nempe libras; & per hanc absorptionem supponat qualitates radicū satis aquae esse impressas, adacta ad duplum quantitate aquae ad radices, nempe quatuor librarum radicum ad sexdecim aquae; si octo ad proportionem absumantur, vires, & qualitates radicum in decocto imminuantur, cum actiuitatis & passibilitatis cuiusque rei sua sit peripheria, & finis terminus, ultra quem si procedatur, virtutes imminuantur; & si in aereis aut igneis qualitates illae insideant, per vltiorem coctionem euanescent. Pari ratione, si ad duplum inminuamus; ut si radicum libras in aquae quatuor libris coquamus ad consumptionem medietatis, duatum nempe librarum radicum virtus aquae & perfectè non communicabitur; quod longiorem expossant elixationem, ut virtus radicum perfectè aquae communicetur. Quod si respondeat ad extrahendam virtutem ex duabus libris radicum in octo aquae, requiritur quidem ebullitionem ad consumptionem quatuor librarum aquae; ad extrahendam ex vniua libra radicum in quatuor aquae, satis erit duarum absorptio. Alio experimento ex Melisso desumpto conuinci poterit. Docuit Melissa in canonibus, capite de decoctis; In ijs compositis gradatione opus esse, cum ingredientia diuersae sunt substantiae: at si eandem sortiatur, eodem tempore medicamentum esse imponenda. Radices feniculi, & apij substantia non differunt; eodem igitur tempore, aquae, ad elixationem erunt imponenda: imponatur igitur radicum feniculi libra, & apij vncia in libris quatuor aquae, & elixatio fiat ad

dimidias, equali tempore decoctas inueniemus, & suas
 aquas communicasse; & tamen hic multum, & parum
 esse scimus. Sed nondum illius animus aquiescit dictis,
 adhuc instat exemplo. Caro multa bubula, & pauca,
 sunt eiusdem substantiæ; sed ad multam coquendam
 cornem, & paucam coquendam, non eadem requiritur
 quantitas aquæ; sic igitur ad elixandum, multum & pa-
 rum medicamenti eiusdem substantiæ, neque assumimus
 eandem quantitatem aquæ. veritatem assumpti quodiam-
 modo coquiorum exercitatio probat, qui pro multa carne eli-
 xanda multò plus aquæ sumunt, & longiori tempore ex-
 coquant, quàm in pauca elixanda. Sed non animaduertit
 decoquendis rebus, duplicem homines finem habere pos-
 se aut vt res, quæ aquæ incoquitur, emollescat, & in vi-
 um, aut vt cibus, aut vt medicamentum veniat; aut vt rei
 coctæ qualitates, & virtutes aquæ communicatæ in vsum
 humanum traducantur. In primo genere decoctionum, e-
 nim si non nihil referat, fiat ne id in musta, an in pauca a-
 qua, ad Sapiditatem rei coctæ; si tamen finem elixationis
 proximum considerauerimus rei illius emolliendæ ac exco-
 quendæ, parum refert in multane an in pauca elixatio illa
 facta sit, modò cocturam habeamus: ac propterea non sem-
 per auctores aquæ quantitatem perscribunt, vt fecit Mesue
 in Diaphatyrion, secundo in decoctione secacul, in secunda
 decoctione cicerni; neque in aqua mellis pro decoquen-
 dis myrabolanis emblicis, neque in iulepro pro excoquenda
 pulpa cytoniorum, & citrorum pro conditis preparandis, vt
 Gal. fecisse videmus primo de Antid. ca. 19. vbi pro vi-
 cinis generis elixandis nullam aquæ quantitatis facit mentionem.
 Et in secundo fine, cum qualitates, & vires rerum coquen-
 darum aquæ communicare tentamus, sectis se habet; non
 solum enim proportionem requirimus rei coquendæ ad a-
 quam absorbendam, sed etiam ad aquam superstitem; quia
 aqua absorbenda proportionem respondere debet substan-
 tiæ rei coquendæ; quæ verò superest, cum virtute ma-

ri vel minori, quàm quærimus aquæ imprimere. Præp-
 rea cùm aqua, quæ absumitur, respondeat proportioni fi-
 stantiæ rei excoquendæ; hæc autem semper est eadē, sem-
 ac medicamentum tale coquitur, absumenda est eadem
 quæ quantitas. At in aqua, quæ relinquitur, diuersa est
 tio; quia cùm hæc proportionem habeat ad virtutem e-
 trahendam ex medicamento, quod elixamus; hæc autem
 proueniat, à meliori, vel minori quantitate medicamenti
 quod imponimus, non eandem semper relinquitus aquæ
 quantitatem; sed maiorem, vel minorem, pro maiori
 minori quantitate medicamenti virtutem communicant.
 His positis facilè argumento contra adducto responde-
 potest. Concedimus enim non eandem aquæ quantitate
 absumi in excoquenda multa carne, & pauca; quia ad mu-
 tam carnem emolliendam, & ad penetrandas intimas pa-
 tes maior aquæ quantitas requiritur: sed hoc nihil facit
 ad concludendum, quod tentabat. hic enim illud vnum i-
 tendimus, vt carnem mollem, & coctam habeamus, in
 autem proportionem aquæ augendæ, aut minuendæ ad me-
 dicamentum, quod coquitur, nisi fortè aliquo modo ex a-
 cidenti ob sapiditatem. cum coctionem carnis ad aptitudi-
 nem ad alimentum requiramus; ad quam si viderimus pi-
 mam non sufficere ob duriciem carnis, aliam aquam supe-
 addemus. At si decoctum consideremus, vt quod superel
 & relinquitur, in quo virtus medicamenti excocti absorp-
 est, in vsum nostrum venire possit: negandum omninò eri-
 ad multam carnem coquendam, aut medicamentum ali-
 quod, vt liquore vtamur, in quo res illa cocta sit, maiorem
 aquæ quantitatem esse absumendam, quàm cùm pauca e-
 coquenda. quia in hoc casu, aqua elixanda, & absumenda
 non debet proportionem correspondere parvæ vel magnæ
 quantitati medicamenti, sed conditioni substantiæ rei i-
 lius. Et vt in multa aut pauca carne, & paucio vel multo
 medicamento excoquendo adest conditio substantiæ; eadem
 semper aquæ quantitas absumi debet, si eadem sit substantia

a, ex qua virtus est extrahenda cum qua proportionem habet, qualiscunque sit illius quantitas. Sed nec in ijs perpetua est veritas: exemplo sit radix cichorij, à qua si extrahere in aquam attenuantem voluerimus qualitatem, quæ in superficie est, leuiter erit excoquenda; si frigidam & terrestrem, longa coctione erit elicienda. Nec recipiendam iam esse censemus proportionem quantitatis rei excoquendæ ad quantitatem aquæ, habito respectu quantitatis absumptæ; nisi ignis consumentis, & temporis, in quo consumitur ratio habeatur. etenim ob ignis vehementiam quantitas, quæ absumetur spatio quatuor horarum, vna quantitasque hora cum absumatur, non poterit eo tempore aquæ communicari. Neque etiam admitti debet, quod à Veleo proponitur; si ad eliciendam virtutem vnciarum duarum medicamenti solidioris requiritur illius decoctio in aquæ libris duodecim ad consumptionem sex librarum: proportionem seruata medicamenti & aquæ, vna vncia eiusdem sex aquæ libris decocta ad dimidias, optimè seruatam esse regulam proportionis medicamenti ad aquam existimandum; si finem illius decoctionis considerauerimus, atque communicationem virtutis medicamenti ipsi aquæ. vt si id fiat moderato igne in libris duodecim vt absumatur, quatuor puta horæ requiruntur; at si vncia cum sex libris decoquatur ad consumptionem trium librarum moderato igne, id fiet horis, puta duabus, quo tempore, centrat illa virtus, duriori substantiæ benè aquæ communicari non poterit; tum ob temporis breuitatem, tum ob minorem actionem aquæ ad ignem. In quo casu, aut minori, & tiori igne vtendum erit, vt longiori tempore absumptio edietatis perduret, aut aliquanto augenda erit quantitas aquæ. & rei huius veritatem experiri qui voluerit, facilius, degustata vna, & altera decoctione cognoscere pote-

29. In vase eligendo sua sit cautio, vt ænea vasa fugia- Vasa ænea
us, ne incocta medicamenta eris malam qualitatem con- in multis

decoctis pa- trahant : & si quando necessitas urgeat ijs vtendi, sint sa-
randis fu- tem stanno illita, vt docebat Flahab. 10. Pract. ca. 19: si ta-
gienda. - men medicamenta incoquenda acetosa fuerint, aut actia
aut salsa, aut vinosa, aut vehementer adstringentia, talia ori-
nind erunt fugienda; ne aut pars aliqua interna vasis con-
misceatur, aut saltem mala qualitas eliciatur. & ideo aut fi-
ctile vas vitro oblitum erit eligendum, aut certe lapidei

30. Sapiennero cum decocta mustarum rerum in pa-

Decoctio- ca aquae quantitate prescripta vident Pharmacopaei apu-
ne in dupli- granitimos scriptores; aut artis imperiti auctores arguunt
ci vase vtē quod quantitatem aquae, ad ebullitionem medicamentor-
dū, vbi a- ingredientum correspondentem non praescripserint, subil-
pud scripto- deque potius assationem quam elixationem subsecutum in-
res pauca- aut certe tanquam corruptum cedicim corrigendum es-
aqua indi- censent; quum potius censendum sit, ita ab auctoribus
ta videtur. conscriptum, quod voluerint decocta illa in duplici va-

per aquam calentem esse peragenda; quo modo multo ma-
nor aquae quantitas satis esse potest: sic enim censēbat Ga-
& ex ratione, nullum impendere periculum adustionis
adurente calore ignis: meliusque nativam humiditatem
ingredientium conservari. antiquis familiare, & sibi ma-
ximē gratum fuisse elixationis hoc genus docuit Galen.
de sanit. Tuenda cap. 8. cum d. Qui verō his sunt ma-
gis curiosi, in duplici vase coquunt. hoc sit, cum in lebi-
te, in quo sit aqua feruens, inferitur vasculum, in quo
oleum, quod nos facere solemus. & alibi scriptis in libr. d
compositione medicamentorum per loca, & per genera,
3. per genera cap. 8. & 7. cap. 12. & sect. loc. in Art-
riaca septima, & in ijs, quae à Critone. & 7. per genera v-
timo ex Damocrate. & 1. de Antid. c. 15. & 10. Meth.
9. & pluribus alijs in locis. & passim Mēse in oleis dec-
quendis Diplomate vtiur.

Trituratio

31. Quae ad triturationem medicamentorum pertinet
nis pēce- siue naturam tritrandorum spectemus; siue trituration
ita ex Me- terminum, siue tritrandi modum, siue instrumenta; ad-
di-

ligenter, & accuratè prosecutus est, in canonibus Mesue, nullus animaduersionum locus hic relinquatur; nisi illa exerimus addenda ad mortarium pertinentia, ne dissipetur tritura ex Critone descripta à Gal. 2. de Antid. c. 78. me hoc loco ommittenda, ne in ijs in quibus breuitatem maxime profiteor, longior sim.

32. Lotio quamuis de eadicatur, quæ cæteris etiam rebus conuenit, quæ ad medicam materiam non pertinent; ita puluis, sordes, & inquinamenta in superficie existentia soluuntur, & absteruntur; reuera tamen cum medici de lotionibus loquuntur, intelligunt, quæ magis est intima, quæ extrahit foris, & per intimam substantiam medicamentum penetrat, quæ vel aqua sit simplici, vel medicata, vel vino, vel aceto, vel liquore aliquo medicamento; pro ut corporis, vel ægri natura, vel occasio aliqua postulat: maiori parte ad noxiâ aliquâ qualitatem amouendam; aliquando ad illam aliquâ introducendam, cum metallica, lithargyrû, tutiâ, ciniam, cæussam chalybem, adipem, olea, resinas, picem, oleum lauamus; id facimus, ad igneas, sæpe acres, & morientes facultates & qualitates remouendas: cum axunginam porcine, cum pinguedines alias, quamuis sæpe id æstemus ut membranas venulas, & fibras amoueamus: quando tamen etiam id fit, ut vilem aliquando quantam frigidam, vel calidam, vel bene olentem introducamus; etiam aliquando fit in olei (lotione) quæ quamuis sæpius fit, ut auferatur aliqua mala qualitas; aliquando tamen etiam ut ex liquore, quo abluunt, aliquid acquirat. sic Mesue capite de vnguento rosato instituit eluendam esse vnguem porcine nonies aqua calida, & toties frigida, ut ipsa non tantum acrimonia deleatur, sed etiam ut vni refrigerandi acquirat, non hæc de vnguento rosato.

33. In aloes lotionem aliquid est, quod animaduersione inueniet, quod videam in ea multos errare, & doctissimos et videri in essentialibus etiam inter se dissentire. Si impura fuerit aloes, arenosa, & laxa, & festucis admixta, genus illud

fueb' & Ga.
2. Antido.
18. desumenda.

Lotionum
varij modi
& vsus.

Aloes purâ.
d. an. o.
di, & iuxes.

lotionis requirit, quod à Diosc. traditum est. Lauatur quod sit arenosum, tanquam inutile subsidat, & pingue, purissimum assumatur. quod vt perfectius obtineamus, & atque iterum exsiccatum atque iterum attrito, præstare possimus, donec purissimum obtineamus. Exeretur genus huiusmodi lotionis in impura aloë. at si succorrina perfectissimam habuerimus, vel etiam hepaticam puram, nulla huiusmodi blutione opus erit. Admittit tamen purissima etiam aloë genus aliud lotionis, non ad festucas, aut arenosa segreganda & rejicienda; sed ad aloës acrimoniam, igneas, & purgatrices, qualitates, & partes, & separandas, educendas, obrundendas, quo modo minus purgatoria redditur. magis tamen tunc roborare ventriculum docuit Gal. & 7. Meth. & 6. de san. Tuenda, & 8. med. loc. cap. 2. cuius causa esse crediderim, quia relinquuntur partes terrestres, adfectionis participes, quæ roborare possunt. tales autem non paucas aloë inesse partes illud docet, quod extrinsecus adhibita vim habet adstringendi.

Aloës dum
verè ablu-
tur, aqua
proijcienda.

34. Sed hoc loco illud omninò animaduertendum est, quod adeò controuersum esse video inter grauissimos etiam viros. an aqua illa, qua aloë abluatur, sit abijcienda, an seruanda, & cum aloë soli ad siccandum exponenda, quæ cum ipsa aloë, in vsum adhibeatur. Ac seruandam esse colligitur aliqui ex Gal. 8. med. local. 2. qui affundere aquam ipsi aloë videtur, & vi Solis æstiu exsiccare: quod etiam Mosuem fecisse coniectare possumus, qui & in lib. simpl. & potissimum in compositione pillularum alexandinarum superius aqua pluuia aloëm lotam in scutella terrea vitreata sili ad exsiccandum eam exponit, vt decoctionem illam aromaticam exsiccatam, & denuo tritam superinfundat.

Quod si quis dubitet, si aqua non proijciatur, cur aloë lota minus purget, cum seruentur partes eius purgatorie respondent, forte dissolui purgatoriam vim aloës à vi solis à qua aloë diluta exsiccat. Ego vero vix mihi persuadere possum, in ablutione aloës, quam 7. Meth. cap. 11. & de

LIBER IX.

95

compos. med. loc. cap. 2. tradidit, seruandam esse aquā.
 diderim igitur in hac ablutione, quemadmodum, & in
 cris, medicamentum hoc esse diluendum, aquam super-
 sum, esse abijciendam; medicamentum aqua maceratum
 ne emollitum esse resiccandum; ac si ita res ferat rursus
 rursus esse identidem & eluendum, & resiccandum : ad
 redendum moueor, quoniam proprius est, & peculia-
 rē modus medicamentorum abluendorum apud Galenum
 Mauritianos omnes, & plerisque alios potissimum Actua-
 n libr. 4. qui est de compositione medicamentorum
 9. in Picra Gal. de ea agens cum aloe lota; illam ablu-
 ocens, aquam summam emergentem abijcit, nec se-
 tantum, sed iterum, atque iterum id faciendum docet :
 d ubi abunde factum sit, medicamentum habebimus
 rursus expertem, & stomacho maximè idoneum : & reli-
 speciebus admixtis, medicamentum ita concinnatum
 ecilibus stomachis accommodatum esse inquit Galen.
 ratio etiam id ipsum persuadet; si enim medicamentum
 umus, ut eius partes aut veneficas, aut purgatrices, aut
 es, mordaces, dolorificasque detrahamus, cum illæ in a-
 deponantur, frustra lauandi laborem suscipiemus, nisi
 res illas, quas vitare est animus, vnà cum aqua effunda-
 mus, & abijciamus. Præterea cum duo sunt parandorum
 licamentorum modi, & quidem inter se specie distin-
 ablutio & infusio; ab ijs, qui ita putant aloem esse la-
 dam, ut aqua seruetur, libenter, quærerem, in quo diffe-
 ablutio hæc ab infusione : ut differant, dicendum est, in
 liquorem seruari, non item in altera. Neque Gal. aut
 suem, si benè intelligantur, aliter sensisse cognoscemus.
 affundendam, aut superinfundendam quidem esse a-
 m, dein medicamentum sole esse exsicccandum, docent;
 aquam infundi quidem, ut illa medicamento emollito
 ciatur, & medicamentum iam molle & humidum ex-
 ertur. sed nec adeo nos vigeret auctoritas illa Galen. 8.
 local. 2. quod non Gal. sunt verba, quin ne quidem

An-

Andromachi, à quo exscripsit, sed ex Lampone quodam Pelusiotâ, à quo Andromachus exscripserat, id quod Galeni impressores, & Aldus, & Isingrinus animaduertenterunt, positus in margine paruis asteriscis vniuersæ illi orationi quod fieri solitum est, quum verba ex alijs auctoribus reperiuntur: id quod dum latinus interpres prætermittit, tamen hic, tum alibi, in rebus quidem etiam quibusdam magis momenti, errandi multis dedit occasionem. Quid verò Mesue dicendū sit, qui in pilulis Alephanginis aloem succotrinam, quam in simplicibus dixerat, quod purissimam non indigere ablutione, aqua pluuia abluuit, mox siccatur, tumque eadem atrita abluuit decocto aromatico, quod est per insolationem vult imbibere, suo loco, cum eas pilulas examinabimus, dicemus. Illud solum quod ad propositum nostrum facit annotabo, ex verbis Mesuæ ibi colligi non posse, cum non proieciſſe aquam, postquam aloem in stibilla vitreata sepius abluuit; post lotionem enim illam extenuat, & verosimilius est id proiecta aqua feciſſe, quam eam mixtâ cum exsiccatio illo modo facilius fieri possit, & si Mesuei erat purgatricem partem imminuere, & acres, igne asque obtundere abstergendo.

Aloes lauandi
di Quereetano
lani noua
ratio.

35. Placet tamen hic aloes lauandi nouam rationem Quereetano apponere, quod ea meo iudicio omnium videtur præstantissima, & si in parando aloem lotam, vel ad pilulas alephanginas parandas, vel ad hieram Galeni ex aloem lotam 7. Meth. & 8. med. loc. cap. 2. conficiendam vteremur perfectissimam haberemus compositionem. sic autem eo describitur. Recipe aloes succotrinæ optimæ, & electissimæ quantum libet: quam redactam in puluerem immittas in matrarium, seu cucurbitam vitream affunde aquam riualem, vel acetosam (adde tu vel pluuia) vt quatuor, cumque digitos supereminet: pone in Balneo Mariæ Mariæ ac fere bulliente, vase optimè clauso cum tubere, vel da Hispanica. stertita per duos vel tres dies integros, & coacta flabis aquam ab aloes essentia tinctam, & rubicundissimam.

bini instar ; quam lentè per inclinationem à fœcibus separatam, ne quod crassum est simul exeat; liquorem effusum seorsim asserua in alembico probè clauso; materię restat aliam affunde aquā; sed non tantum, quantum prius; inde digere vt ante, colaturam separa, priorique adijce, ac rursus aliam affunde, donec aqua nullum ampliùs albiat colorem, & videbis residuum, quod est in fundo, arenę instar, aut cineris, in magna satis copia : & ex media libra hęc vel tres vncię restabunt : est autem aloes pars inutilis, nec in aqua dissoluitur. Aquam omnem distilla, per alembicum ; aut in argentea patina fac exhalare carbonibus ac alidis cineribus imposita, donec materia restet crassitudinem mellis. quę erit lucidissima rubini instar. Hęc aloes præparata & depurata basis erit ad plures effingendas pilulas; quęque iam per se ad vnius scrupuli dosim exhibita excellens medicina est. In quo lotionis modo illud nimis aduerto, optimum reddi per illum euacuans medicamentum, quod subtiles igneę & purgatrices aloes partes à terrestribus & adstringentibus separatę in aqua conferuntur, vt exhalata aquę vnitę remaneant valentiores : sed erè dicere non poterimus magis conuenire in imbecillitate ventriculi, quod terrestribus, & adstringentibus partibus sit distituta : neque reponi, neque in vsum venire pro aloë lota Galeni, quę minùs purgat, & plus roborat; neque pro hiera ex aloë lota paranda, de qua Galen. 7. meth. & 8. med. local. vsurpari, quin nec ex ea parari poterunt catapota ex aromatibus. Præstantissima tamen erit ad aluum soluendam, & bilem educendam.

36. Cum igitur per lotionem semper substantia aliqua, vel qualitas auferatur, non nisi improprie aloë lota illa dicitur, in qua nihil notatu dignum illi detrahimus ; sed citius superinfundimus liquore aliquem, per quem vim illius purgatricem augemus; vt cum succum rosarum soluturum, aut infusionem earundem, vel infusionem, & decoctionem

Lotione vera semper à re lota attrahitur.

affundimus, puta rhabarbari, senæ, turpeti: aut alteratricem; ut cum decocto aromatum infundimus aloem ad roborandum facultatem acquirendam, & cum aqua rosarum, endiuivæ, vel aliarum, inducere refrigerantem vim tentamus.

In assatione sola humiditas superflua absumitur.

Assa quoque elixis humidiora.

Torrefactionis variorum modi.

Vstione omnis absumitur humiditas.

Vstionum variorum modi pro rerum varietate.

37. In assatione & torrefactione illud animadvertendum, ne in vstionem vertatur; docuit enim Aristoteli. 4. Meteoror. in assatione superfluum absumi humiditatem, & naturam, & internam conservari; per quam assa elixis effluat humidiora idem dicebat. Hæc quomodo fiat, optimè docet Mesue in can. modum scyllæ assandi tradidit Andromachus versibus, & Gal. soluta oratione primo de Antidot. cap. 9. & Dioscori. lib. 7. cap. 140. Myrabolanorum diversum assandi modum docuit Albucasis, quomodo etiam radices, & semina, ut cuminum, docuit Galenus. 7. medicor. local.

38. Vstio verò omnem humiditatem consumendam supponit, & ideo Gal. 5. local. cap. ultimo terminum ad vstionis præfixit esse, cum neque fumosum, neque vaporosum, ab ipsis effertur: quæ sunt certa indicia penitus illorum humiditatem consumptam fuisse. ubi etiam comburendum tradidit. comburebat viperas, lib. de Theriaca a Pisonem, Herbas, Lanam 5. local. de lentisco, & Perdicæ herba cum lana. Abrorum, & Anethum alibi, ut magis exsiccent. Alibi pilos, sepię testam, Erinaceos marinos, cochleas cum testis, Hirundines, cicadas, Ranas, Alcyonem, & Gygias 2. simpl. sic 4. per gen. Metalla adurebat, ut ablui possent morsum amittant. de modo Cadmiæ adurendæ agitur Dioscori. & scoriæ ferri docet adurere prius tritam, aut frustum incisam, vel carbonibus injectam foliis accessam. sic Pyritem lapidem, Chalcium, Auripigmentum Aeruginem, & Stibium adurebat. Quomodo sulphur comburi debeat, docuit Dioscori. lib. 4. cap. 87. sed quia in Chalcite adurenda singularem adhibuit diligentiam Gal. 1. c. Antido. cap. 15. optimè consultum Pharmacopœis censuimus, si diligenti illa adustione perpenſa, illam, & cetera adu-

irere inde discerent. Mirabilis est præparandi Chalybis, leuigandi ratio, sapius à me experta, vt cum aceto præpararem. Sumatur Chalybis virga, altera sulphuris; ferrea dentissimo igne candescat, vt ignescat, cuius vni extremo ponatur extremum virgæ sulphuris, confestim liquefcerit, & in paruas guttulas decidet, quæ in mortario facile in puluerem rediguntur, & postea acri aceto macerari præparatur.

Iam tandem in particularibus medicamentis composi- exercendum est ingenium, atq; aliquæ in ijs Cautiones o instituto nostro, & Animaduersiones erunt interseren- e: illud obseruantes (ne in ijs, quæ non sunt in vsu, vel rò admodum, tempus conteramus) vt quæ maiorem so- m afferunt in componendo difficultatem, hic recensea- us, in simplicibus, quæ compositiones ingrediuntur, non ultum iusistentes, cum rem hanc à multis etiam con- rranibus opinionibus videam esse transactam; nisi vbi dero multum interesse medicæ Reipub., rem hanc an il- m indamus; & in defectu rerum obsoletarum, quid sub- tuendum sit, cum parum videam hac in re grauissimos mittere errores.

39. Primum veniet considerandum Electuarium de Gemmis Meliæ, quod, vt non nisi tanquam præstantissi- um & ad multas, cordis potissimum, egritudines utilissi- mum possum laudare, & ob ingredientia, & ob illorum mmetriam & proportionem, & propter auctoris hoc in- enere excellentiā; quoniam tamen in eligendis lapillis sæpè, aut avaritia, aut incitia, aut negligentia aberrat; quoniam etiam, cum gemmas non tam manifestis qua- tatibus refrigerando, & exsiccano agere censuerunt, & Arabes, & Græci scriptores, quàm occultis & peculiari vir- ute specifica: quæ quomodo in contractis & subtilissimū ollinæ deductis conseruari possit, vix animo concipi po- est; si quis ab eo componendo desistere voluerit, non mul- um reprehendendum censere; cum alia nobilia etiam sup-

Calybis
colliquādi
mirus mo-
dus.

Electuarij
de Gem-
mis nobili-
tas, & disti-
cultas.

petant medicamenta ijsdem facultatibus ornata.
 Hyacinthi 40. Si propositę difficultates medicos in vsu cōfectionis de
 nę confe- gēmis suspēsos tenēt; cur in vsu Hyacinthinę cōfectionis de
 ctionis de- nō magis hāsītābunt, cū in ea reperiātur multo plura, quę
 scriptioni animis nostris scrupulū inijciunt. nā pręter easdē difficulta-
 varietas ā- tes, est primo auctoris incertitudo; Hispanis medicis Neapo-
 litanis inuentionē tribuentib. : Gallis veropotius Mospelię
 confusio. sib. sed quod maioris est momēti, variatib. ita, & in essētia,
 & in qualitate, & in quāritate mēsurali, & in numero ingre-
 diētiū rerū oīū; vt sanē affirmare possi, ex vndecī a me
 vñs in impressis libris descriptionib. ne vñā quidē cū alia aut
 in numero, aut in mēsurā, aut in symmetria inueniri potu-
 sse cōcordē: vt reuera pharmacopolę incerti esse possint, quā
 ex illis paratā in pharmacolijs seruare debeāt; potissimū cū
 apud Renodē in principio sumatur Hyacinthorū, coralli
 rubri, terrę lemniz, boli Armenę aū. vnc. med. cū in plerisq;
 alijs vnc. i. & med. Hyacinthorū oriētiālū sumatur. in alijs
 ēt plerisq; differētia ēt, vt dixi, adlit in ingredientibus, & in
 numero, & in mēsurā, & in proportione: in aliquib. posita
 sunt, ben albū, & nigrū antiquis cognitū, & propterea ex
 rōne suis cōpositionib. impositū; cur verō nos res oīnō no-
 bis incognitas cōpositionib. indamus, causā non video. Cū
 igitur in ingredientibus tāta apud oēs exscriptores varietas
 sit; cum in corū numero, & mēsurā siue pondere diuersitas
 tāta sit; nō est, quod illā tāti faciamus. cū potissimū propor-
 tionē illā & symmetriā tū rerū, tū graduū earū, tū pōderū
 & mēsurarū, vnde harmonia illa excitatur, vnde specifica
 forma aliquādo producitur, vt in Theriaca viri doctissimi
 obseruauerunt, nusquā obseruemus. Vt mirari aliquādo mihi
 subierit, quid recētiōrib. quibuscūq; venerit in mentē, dū de
 scripta quadā Hyacinthinę cōfectionis formula in multis
 exteris diuersa, adeo illā celebrarūt, vt celeberrimā illā An-
 dromachi Theriacā prę illa penē nihili fecerūt. Possē illi
 & vtiliter in vsū duci, vt & de electuario de gēmis diximu
 facile cōcedemus; at pot tātaq; pręstare posse, vt recētiore
 isti,

ri, & Principū adulatores profitetur, nō facile cōcesserit; cū multa alia sint medicamēta ab antiquis tradita, & lōga seculorū experiētia probata, quę passionib. illis cordis possūt auxilio esse, vt hac sine detrimēto medicinę carere possumus.

41. In laticāte Rhafis, quę cōfectio aromatica iter multas huius nominis magis est ī vſu, illud solū aduertamus, nō esse limitādā mēsurā ingrediētū ad mēsurā moschi, vt cōsuevit Calestanus, hāc cōsēns à Rhafi 9. ad Almāforē e. de melācolia reduci ad decimā partē drac. vnus; cū auctor decimā partē decreuerit partis vnus ex reb. ingredientib. nō aut limitarit ad singulorū drach. quintimo si ex arte parari lebet, cū triplū mellis indi debeat, cū librā mellis limitet auctor, nō vna, sed singulorū fere duæ drach. essent accipiēdæ. Sicq; duodecī moschi grana essēt indēda, nō sex. Neq; placeat, quod à Melichio scriptū est; a Sepalsarijs, vt vitet myxobalanorū vī adstringentē, nō fieri decoctionē eorum ad huarū tertiariū consumptionē, vt Rhafis iubet; sed facta infusione in aqua borraginis per horas viginti quatuor, & leui ebullitione & expressione melle, addito electuarium parari. neq; .n. mutādus est modus cōponēdi ab auctorib. institutus; neq; hic solus paramus medicamētum, in quo obstruentia cauenda sunt, & valenter adstringentia; sed roborans, in quo adstrictio mediocris non parum confert. Apud nostamen magis est familiare laticans Conciliatoris.

42. In cōfectione Alchermes cardiacarum oīum præstantissima paranda, tot video ēt inter præstantissimos Medicos dissentientes sententias, & in serici tignendi electione, & preparatione; & in quāuitate cocci tinctorij, & in modo tingendi, & in quantitate lapidis lazuli, & in ratione illum lauandi, vt necessarium esse duxerim in ijs aliquantisper excercere ingenium, atque circa singula horum aliquas apponere aduersiones. & primò obseruandum in seta tincta in cheremes, vt loquitur Mesuei interpret, aberrare eos, qui sericum sumūt tinctum in cheremes, siue per granum tinctorū: dupliciter enim peccatur, primo quod sericeos filis iā excoctos

Lenticās
Rhafis, &
difficulta-
tes in eo
præparādo

alchermes
cōfectio,
& difficulta-
tates.

Sericū co-
ctum, non
tinctū à ri-
ctorib. sit,

Hyacinthi
næ confe-
ctionis de-
scriptioni
varietas a-
biguitas, &
confusio.

petant medicamenta ijsdem facultatibus ornata.
40. Si propositæ difficultates medicos in vsu cōfectionis de
gēmis suspēdos tenēt; cur in vsu Hyacinthinæ cōfectionis
nō magis hāsītābunt, cū in ea reperiātur multo plura, quæ
animis nostris scrupulū injiciunt. nā prætēr easdē difficul-
tēs, est primo auctoris incertitudo; Hispanis medicis Neapo-
litānis inuentionē tribuentib; : Gallis veropotius Mospeliē
sib; sed quod maioris est momēti, variatib; ita, & in essētia,
& in qualitate, & in quāritate mēsurāli, & in numero ingre-
diētū rerū oīū; vt sanētē affirmare possī, ex vndecī a me
visis in īpressis libris descriptionib;, ne vnā quidē cū alia aut
in numēro, aut in mēsurā, aut in symmetriā inuēniri possit
sē cōcordē; vt reuera pharmacopolē incerti esse possint, quā
ex illis paratū in pharmacolijs seruare debeāt; potissimū cū
apud Renodēū in principio sumatur Hyacinthorū; coralli
rubri, terrē lemniz, boli Armenæ aut vnc. med. cū in plerisq;
alijs vnc. i. & med. Hyacinthorū oriētaliū sumatur, in alijs
et plerisq; differētia ēt, vt dixi, ad sit in ingredientibus, & in
numero, & in mēsurā, & in proportione: in aliquib; posita
sunt, ben albū, & nigrū antiquis cognitū, & propterea ex
rōne suis cōpositionib; imposuit; cur verō nos res oīnō no-
bis incognitas cōpositionib; indamus, causā non video. Cū
igitur in ingredientibus tāta apud oēs exscriptores varietas
sit; cum in corū numero, & mēsurā siue pondere diuersitas
tāta sit; nō est, quod illā tāti faciamus. cū potissimū propor-
tionē illā & symmetriā tū rerū, tū graduū earū, tū pōderū
& mēsurarū, vnde harmonia illa excitatur, vnde specifica
forma aliquādo producitur, vt in Theriaca viri doctissimi
obsēruarunt, nusquā obsēruemus. Vt mirari aliquādo mihi
subierit, quid recētiorib; quibusdā venerit in mentē, dū de-
scripta quadā Hyacinthinę cōfectionis formula in multis
exteris diuersa, adeo illā celebrārit, vt celebratissimā illā An-
dromachi Theriacā prē illa penē nihili fecerūt. Possē illā
& vtiliter in vsū duci, vt & de electuario de gēmis diximus
facilē cōcedemus; at tot tātaq; pręstare possē, vt recētiores
isti

ti, & Principū adulatores profitetur, nō facile cōcesserī; cū multa alia sint medicamēta ab antiquis tradita, & lōga seculorū experiētia probata, quę passionib. illis cordis possūt auxilio esse, vt hac sine detrimēto medicinę carere possimus.

41. In laticāte Rhafis, quę cōfectio aromatica iter multas huius nominis magis est ī vsu, illud solū aīadnertamus, nō esse limitādā mēsurā ingrediētū ad mēsurā moschi, vt cōsuevit Calestanus, hāc cōsens a Rhafi 9. ad Almāforē e. de melācolia reduci ad decimā partē drac. vnius; cū auctor decimā partē decreuerit partis vnius ex reb. ingrediētib. nō autē limitari ad singulorū drach. quintimo si ex arte parari debet, cū triplū mellis indi debeat, cū librā mellis limitet auctor, nō vna, sed singulorū fere duę drach. essent accipiēde. Acq; duodecī moschi grana essēt indēda, nō sex. Neq; placeat, quod a Melichio scriptū est; a Sepalsarijs, vt vitēt myrobalanorū vī adstringētē, nō fieri decoctionē eorum ad duarū tertiarū consumptionē, vt Rhafis iubet; sed facta infusione in aqua borraginis per horas viginti quatuor, & leui ebullitione & expresseione melle, addito electuarium parari. neq; .n. mutādus est modus cōponēdi ab auctorib. institutus; neq; hic solus paramus medicamētum, in quo obstruentia cauenda sunt, & valenter adstringentia; sed roborans, in quo adstrictio mediocris non parum confert. Apud nostamen magis est familiare laticans Conciliatoris.

42. In cōfectione Alchermes cardiacarum oīum prætissima paranda, tot video ēt inter prætantissimos Medicos dissentientes sententias, & in serici tīgendi electione, & preparatione; & in quātitate cocci tinctōrij, & in modo tingendi, & in quantitate lapidis lazuli, & in ratione illum lauandi, vt necessarium esse duxerim in ijs aliquantisper excerpere ingenium, atque circa singula eorum aliquas apponere aīaduersiones. & primō obseruandum in seta tincta in chermes, vt loquitur Mesuei interpretes, aberrare eos, qui sericum sumūt tinctum in chermes, siue per granum tinctōrū: dupliciter enim peccatur, primo quod sericeos filis iā excoctos

Laticātes
Rhafis, &
difficulta-
tes in eo
præparādo

Alchermes
confectio,
& difficul-
tates.

Sericū co-
ctum, non
tinctū a ti-
ctorib. sit,

sed in globulis purgatis receptibus.

assumunt, cum crudi sumendi sint in syncrea natura sua, quam ex parte amittunt per cocturam: secundo, quod tinctores, ut facilius, & melius colorem illum filis sericeis imprimant, non leuem admiscunt aluminis portionem: at ne fili quidem per elixationem ex glomeratis globulis sumendi erunt; quod per cocturam, naturalem exuant conditionem: & cum in diamoscho crudum sericum accipiendum præcipiat Mesue; & crudum Auicenna eligat, & cocto anteponat: globulos igitur recenter glomeratos accipiemus; & illis apertis eximendus est bombyx, & interna leuis, & tenuis superficies pelliculæ erit abstergenda; & si sordide aliqua esset infecta erit eximenda. Aliqui tunc minutim fornice in particulas incidunt, ut ita orbiculos illos ouales incisos colore inficiant. At nec sic quidem facile à cocco tinctorio colore inficiuntur, ob compactam substantiam. Propterea præstabit mediocriter, & molliter illis baculo contusis, si fieri possit, pexere, & quasi dilacerare, ut chermes tincturam facilius excipiant: sin minus, saltem prius contundere.

Chermes
quantitas
pro libra
serici.

44. In quantitate etiam grani tinctorij aduertendum non leuem subesse difficultatem: cum Mesue absolute dixerit setam tinctam in chermes; si quidem aliqui, ut Brasauolus, & alij, pro vna serici libra tingenda, libræ vnâ illius ponunt, alij pro libra vna vnicam vnciam. Costeus exemplo ex tinctoribus sumpto quatuor ad summum vncias granorum ponit. sed si quis libræ sumperit, experietur, quam ingratum gustui medicamentum reddatur; quod ob maximum ventriculi cum corde consensum omnino est fugiendum, qui vero vnicam apponit vnciam, facile cognoscet, vix vllum in serico rubrum colorem induci; vixque vllam illius facultatem serico communicari. Propius accedit ad id quod rationabile est Costæus, cum quatuor vncias pro serici libra addit; sed non aduertit tinctorios, ut melius colorem contrahat, & diutius sericum excoquere cum granis, quàm in hac parâda cōfectione expediat, & ad id adiunadū, & alu

men

est addere, & aliquādo succū limonū. Prestabit igitur Her-
 ādi Sepuluedā, & diligētissimi Aluisij Ouedi, opinionē se-
 ui, qui septem vncias chermes in aqua decoquunt & dissol-
 unt pro tingenda vnica libra serici: qui etiam addunt, si
 difficulter, cū in sola aqua decoquuntur grana illa, color
 eo concipiatur ob aquę tenuitatem; vt facilius id obti-
 eat, posse nos vnā aut alteram sacchari candidi vnciā
 quā immiscere; vnde concepta in aqua aliqua visciditate
 acilius serico color communicabitur.

45. In aquā quantitate, in qua excoquenda sunt grana
 illa, dissident auctores; alijs libras quatuor, alijs quinque,
 alijs sex sumentibus. Ego tantum aquā sumendum cense-
 m, quantum in vase mediocris profunditatis, & latitudi-
 nis infusa libra illa serici commodē collocari possit, & illi
 er duos digitos supranatare, vbi infusio granorum per no-
 tem, & decoctio facta fuerit.

46. Hoc modo communicato colore aquā calenti per
 infusionem, & decoctionem; in ea benē calida sericum in-
 fundendum erit; malaxandum, & leui etiam ebullitione
 excoquendum, & tandiu relinquendum per tres vel qua-
 tuor horas, donec colorem acquirat. Mox super setaceum
 sericum iam tinctum ad excolandum reponetur, donec ni-
 hil amplius excolet. Atque tum in succo pomorum & a-
 qua rosata per horas viginti quatuor infundetur; postque
 liquantisper lento igne excoquetur, donec & succum, &
 equam ruborem aliquem inde contraxisse cognoscamus;
 neque forti facta serici expressione, succus ille, & aqua,
 dissolutis in illis drachmis centum quinquaginta sacchari
 perfectissimi, lento igne excoquantur ad melliselecti cras-
 sitiem, ijsque ab igne exemptis, sed adhuc calenibus, inden-
 tæ erunt drachmæ quatuor ambaris grisei, interim seorsim
 distillo igneo & leui portione liquoris illius dissoluti, si-
 mul cum alijs pulueribus, & moscho eodem modo disso-
 luto.

Quantitas
 aquæ pro
 coquendo
 chermes.

Serici tin-
 gendi ratio

47. In chermes eligendo omninō obseruandum est,

Chermes coccum baphicum, quem verum esse chermes quilibet colat
sit coccus gnosceret, qui descriptionem chermes Serapionis, & aliorum
Baphicus, Mauritanorum comparauerit cum ijs, quæ de cocco tibi
non cocini etorio scripsit Dioscorides libro 4. esse sumendum; non
glia. autem eum qui ex Indijs orientalibus aduehi ad nos solet,
quemque appendicem pimpinellæ esse asserunt: neque enim
enim scimus an is antiquis cognitus fuerit, nec qualis sit
cultatis.

Succus pomorum igne
non sit defæcatus.

48. Succus pomorum, in quo tinctum sericum est immergendum, igne aut calidis cineribus non erit defæcandus
sed solum aliquali subsidencia purificandus; ut aliqua visciditate infectus facilius ruborem ex infuso serico possit concipere.

Lapidis lazuli electio
& lotio.

49. In lapide lazuli deligendo artifex sit diligens in ijs notis obseruandis, quæ de electo proponit Mesue capitulo proprio, sed multo diligentior in eo eluendo: illud obseruans, quod in lapide Armeno lauando admonuit Mesue. Illud hac in re animaduertens, si pro singula ex triginta lotionibus aquæ simplicis, & decem ex aqua rosacea, singulis diebus prius fiat infusio per horas viginti quatuor, & mox facta ablutione aqua abijciatur, melius, & perfectior lotionem euasuram: cum Trallianus quinquagies etiam eum abluat. animaduertendum verò etiam, non esse sistendum ab vltiori lotionem, etiam si in media, aut & vltiori lotionem aqua clara appareat; semper enim ad quadragesimam usque lotionem procedendum est; neque enim solum lotionem hac vtimur ad depurandum ab excrementijs partibus lapidem, purumque reddendum, sed maxime, ut purgatrix eius vis imminuatur ac franeatur, & vis illius malefica, & ventris subuersoria tollatur.

lapidis lazuli quantitas in Alchermes.

50. In eiusdem pondere video etiam maximam, & magni quidem momenti inter doctos viros controuersiam, alij duas illius drachmas imponentibus, alij vero duodecim mouentur posteriores hi primum, quia viderunt Mesuem in libro simplicium capite de lapide lazuli aliam tradidisse.

quam compositionem de lapide lazuli appellant, ad
idem affectus curandos, atque hæc, quam confectionem
hermes denominat, in qua non drac. ij. vt hic posuit, sed
drac. 12. illis autem sit verisimile, cum in ingredientium
mero conueniant, etiam debere conuenire in mensura.
ger apud illos suspicionem, quod ibidem Mesue dicat
nullos lapidis illius loti drachmas octo miscuisse vni li-
bre confectionum cum succo buglossi depurato, & vino te-
antiquo, contra cordis affectus melancholicos, animum
ita recreasse, & animæ mirum induxisse gaudium; post-
ea statim confectionem illam suam descripsisse, in qua dra-
chmas 12. imposuit. Addunt non solere Mesuë in suis tra-
didis compositionibus, cum duas res eiusdem ponderis im-
ponat, vnam post alteram ponit, singulis pondus propriū
ponere; sed vtraque posita, per dictionem (ana.) similitudi-
nem ponderis significare. hic autem in compositione Al-
hermes scribit lapidis lazuli loti drach. 2. margaritarita-
rum drac. 2. cum dicere potuisset an. drac. 2. vnde iniqui-
tas, verisimile esse scripsisse lapidis lazuli loti drac. 12. sed
magis antiquorum culpa omisum esse numero (x). Addunt po-
tius alij in antiquo quodam codice reperisse se scriptum
lapidis lazuli loti drac. 12. Sed hæc mea fuit sententia, nū-
m variandas esse antiquas scriptorum lectiones, aut vi-
das censendas, nisi falsi aliquid continere manifestè co-
nuerimus. At hic nihil tale reperitur: quinimo si legamus
drac. 2.) vt communiter habetur, & vt in communi vsu
cum vtilitate omnia ritè disposita cognoscentur. Neque
in contrarium afferuntur vilo modo conuincunt. primo
falsum est, eandem esse descriptionem hanc cum ea,
in simpl. descripsit Mesue. cum pondere rerū, numero,
nomine distideant. lib. .n. simpl. ligni aloes, & Darfeni,
cinamomi fini, vtriusque sumit drachmas quatuor, in
vero sex; ibi lapidis lazuli drac. 12 hic drac. 2. in illa au-
tem drac. 4. in hac tres. Hic moschi. scr. 1. in illa moschi nō me-
uit. In nomine præterea differunt, illa dicta est confectio

de lapide lazuli, & iure merito à prævalente & quantitate, & facultatibus lapide lazuli. hic quod pauca illius insit quantitas, præualeat autem longo intervallo chermes, & quantitate, & viribus Alchermes, dicitur. Neque verum est, quod tanquam perpetuum sumebatur, vbi duo medicamenta æqualis ponderis aut mensuræ iungantur, eorum similem mesuram semper coniungi per dictione (añā.) obseruare poterant in Diamoscho dulci, in Emplastro Diaphænici Alexandri, in Emplastro filij Zachariæ. Neque quod in vñ codice legatur drach. 1 2. mutanda est lectio tam multorum: multo enim verisimilius est, vñum, qui forte non differtensebat confectionem alchermes in Antidotario posita ab ea, quæ posita est in lib. simpl. aberrasse, quam tot alio. Concludendum igitur est in hac compositione Alchermisolum ij. drach. esse indendas lapidis lazuli.

In Diamoscho sericū
crudum. 1. illud
nōelixatū,
sed crematum.

51. In Diamoscho Mesuæ, quamuis non suæ inuentio nis, cum antiquiores, vt Serapio, illius mentionem fecerint, illud primo animaduertendum, indidisse setam crudam vñam, quod primo difficultatem facit, quomodo cruda si si vñta; deinde cū serico Arabes vim roborandi cor, & exhilarandi animum tradunt, addunt etiam, si aduratur, vñillam, aut tolli, aut saltem multum imminui. asseruit hñ Auicenna lib. 2. Tract. 2. cap. 5. & Serapio lib. simpl. ca. 28. poni inquit, sericum in medicinis cordialibus, vt in Diamoscho dulci; & aliquos vrere, vt in puluerem deduci possit: sed multos vereri, si vratur, ne cardiacam facultate amittat: & propterea recipit modum puluerizandi sericum si cū margaritis, carabe, & corallis nubeis tritretur. sic nim per terrestria hæc admixta, sperat villosam illam substantiam posse ad triturationem deduci. Sed quomodo obtinebimus in compositionibus, vbi duriora hæc, & testria, aut non adeo dura recipiuntur, vt in dialfena: sed quis etiam experiatur huiusmodi triturationem per rerum harum mixturam, cognosceret contrundi quidem, & dilacerari, non tamen in puluerem subtilem, quemadmodum op

et deduci. Præstabit igitur non quidem adurere; sic enim
 que facultas illa cordis roboratrix corrumperetur; sed
 mata Mesue sententia cremare. recentes igitur follicu-
 sericeos, a vermiculis internis, & excrementis expurga-
 & minutim incisos, in ollam nouam benè vitreatam, &
 ne opertam collocaimus. & in furno non nimium calido
 eam ponemus; tandiuque ibi illam relinquimus donec fa-
 citur coloris mutatio, exsiccationem sufficientem osten-
 dis: & nisi in prima visitatione sufficientem siccitatem ac-
 quisiuissè cognouerimus, ibidem iterum reponetur, vt ad
 urationem reddatur apta. Animaduertendum tamen
 huc calentem, & siccam statim esse triturandam. si enim
 mata diutius relinquantur emollescit, ac triturationi ine-
 redditur: nisi fortè adusta sit, tunc enim quasi combu-
 ritur in cinerem sine viribus dissolueretur. Modum hunc se-
 bi comburendi, vel potius cremandi, colligere possumus
 is, quæ à Gal. scripta sunt 11. simpl. cap. 25. de lanæ
 mandæ modo, tum, & ex eodem. 5. med. local. cap.
 e modo exsiccandi, & puluerizandi Syderitis, & Per-

Serici cre-
 mandi ra-
 tio.

3. In vsu, & eius quantitate administranda obseruan-
 da est; cum ad formandam confectionem mellis electif-
 i crudi sumamus ad quadruplum specierum; cum ex
 drachmæ triginta quinque, quæ uncias constituunt qua-
 tre, & drachmas tres, quarum quadruplum mellis sunt vn-
 decem & septem cum semisse, & huius dosim cum con-
 uat Mesue ab vna drachma ad duas: nos si species, vt in
 tre positum est, cum saccharo in tabellas formabimus, &
 more vnciam specierum libræ sacchari commiscueri-
 mus, si drachmas duas dederimus, vt plerique medici fa-
 ciunt, non eam dabimus quantitatem specierum, quæ ab
 tore instituta est; quintam, aut tertiam solum partem,
 solum duarum drachmarum, ad vnam, aut duas dra-
 chmas electuarij cum melle comparauerimus: vt mirum
 sit, si eæ non reportentur utilitates, quæ à Mesue sunt

diamoschi
 in morbo
 lis dosis.

proposita; potissimum cum mel crudum confectioni im-
positum non parum adiuvet actionem specierum. At si,
plerique Pharmacopæi hoc tempore consueverunt, sex
librum drachmæ in sacchari libra indantur, vel & solum quatuor,
insecutia ne, an potius avaritia, quam ex tabella duarum
drachmarum expectare in ægris nostris poterimus vili-
tatem? Danda igitur omnino erit opera, ut & seplasiarum
bitam imponant in saccharo specierum quantitatē, & Mu-
ci dosim morsellorum augeant.

Doronicū
in Diābra
recipiendū
cōtra Mat-
thiolum.

54. In Diambra, Doronicum aliquam mihi dabit
causationem, animaduertendi ob Matthiolum, cuius ap-
pharmacopæos tanta est auctoritas, ut absurdum videatur
in botanicis ab eo dissentire. Is igitur lib. 4. in Dioscoridis
ab hac confectione, & ab omni usu humano obrogatum
dum censuit longa oratione; & deplorat oscitantiam su-
riorum omnium, qui in cardiacis multis pulvisculis, &
confectionibus, radicibus ijs usi sunt: quarum radices sunt
guæ, rotundæ, orbiculatæ, in extremo sensim in angustum
deductæ, quæ scorpionis corpus & caudam non male
ferunt, coloris albidæ, saporis dulcis amari, cum aliqua
striktione. Planta pusilla est, flos lutei, & radiati
phthali ritu; caules sunt teneri, folia mollia, oblonga
ex viridi utrunque floscentia, hirsuta pilosellæ ritu
ambitu rotundo, nonnihil laciniolo, & parum acumi-
to. Hunc igitur, cum Aconitum Pardalianches censu-
set, ineptè admodum, (ut longa oratione demonstra-
runt doctissimi Petrus Pena, & Matthias de Lobel in
pium acuatissimis adversariis, & post eos Renodæus
uiedus, & plerique alij) ab omnibus ijs Cardiacis con-
fectionibus excludendum censuit: quod, ut malignitatis
venosæ eius naturæ periculum faceret, radicibus ijs
uerizatis cani cum carnibus exhibitis, miserè perijisse ob-
tulerit. At plerique alij contrariam asserunt experi-
entiam, quod canes plures, & in multa quantitate exhi-
tas innoxie eas escasse cognouerunt. Tantum abest, ut a-

um sit venenum, vt quotidie, & ab antiquis datas ra-
 s has, & ab omnibus medicis passim dari videamus in
 tuario de gemmis, diambra, & cardiacis alijs confe-
 nibus, non periculose, sed felicissimè. Quin claris-
 viri editis scriptis retulerunt, se doronici radices mel-
 onditas sæpè esitasse, atque harum contritarum drach-
 duas ex aqua hausisse, & ægrotis sæpè radicem illam,
 er se; & alijs mixtam medicamentis vtilissimè dedisse.

Quam multis Doronici ignoratione exitio fuissimus?
 tantam stragem plus quingentis ab hinc annis dedissent
 antiqui Medici, & neoterici, freti electuarij de Gem-
 aromatico, diambra, & alijs cordi amicis, quibus fre-
 ntissimè vsi sunt? Te monere possunt, datum quater-
 am drachmarum pondere quantitate nocere potuisse;
 ue tamen venenum esse, nisi Crocum, moschum, & con-
 lia cardiaca venena esse dicere velimus, quæ quantita-
 ces suffocare possunt.

Sed demus Metthiolo, Doronicum canes, & lupos
 dere; an inde colligendum erit homini lethale vene-
 esse? differt natura à natura, alimentum ab alimen-
 ticebat Hip. lib. de flatibus. Aloe enecat vulpem, non
 inem. Nux vomica feles, mures, & aues, nobis est salu-
 medicina; sturnis cicuta est cibus, nobis venenum. Non
 ur reiiciemus nos Doronicum, sed vtemur moderatè,
 non vt aromate, saltem liceat nobis, vt Alexiterio, vt An-
 to & Theriaca, cum in eo etiam Auicenna Theriaca-
 agnoscat facultatem: qualem cognoscens Mesue vi-
 us cum Electuario de Gemmis, Aromatico, Diambra,
 alijs indidisse; sicq; non adeò facilè celebres medicos in-
 ijs, & sceleris reos facere oportebit. Quod verò subdit
 athiolus, fortasse nec antiquos cognouisse nocumenta
 ronici in Cardiacis medicamentis, quod in modica ad-
 dum quantitate illis inderetur, & compluribus admixtus,
 e malitiam illius infringere possent, non tollit vsu illius;
 mittimus in mixtione Antidotorum, & medicamento-

rum

Doronicū
 non esse ve-
 nenum.

rum non pauca, quæ manifeste scimus noxias habere factitates; lapidem Armenum, lazuli, scāmouium, colocintide veratrum; sed mensuram adhibemus convenientem, corrigimus multa, addimus malitiam infringentia, ut cæteroque utilitatibus illorum frui possimus. Intrepidè igitur communibus nostris radicibus Doronici nostratis utamur, illas cæteris misceamus, ut securius in usum veniant: cum Serapio lib. simpl. cap. 335. Doronico moribus veneris forum animalium maximè conferre fateatur. & etiam Mattiolo, & Marantæ concederemus Doronicum esse Aconitum Pardalianches, quod nunquam concedendum esse, comparatione eorum, quæ de Doronico scripserunt Arabes, & quæ de aconito Pardalianche scripserunt Græci, doctissimi viri collegerunt; nunquam colligent hominibus venenum esse, sed Pantheris, porcis, lupis, aliisque feris animalibus; quinimo Theophrastus bibitum dicit conferre cor morbis.

Si quis tamen in dubijs nolit villo modo periclitari, neco uti; cum Auic. l. 2. c. 209. illius loco indere poterit du tertias partes cariophyllorum, aut secundum alios dimid sui ponderis galange.

santalo citrino deficiente albu instituen- dum.

56. In Aromatico rosato Gabrielis nihil esset mihi notandum: cum, & compositionem Metuei omnes re nota mutata recipiant, & ut præstantissimam laudent; nisi deficiente Santalo citrino (qui omnino, si fieri potest, eligendus) viderem albo reiecto, potius rubrum substituendum aliquos censuisse. quod quamvis grauißimos habeat asperiores, & pro sua tutanda sententia, Serapionis auctoritati lib. simpl. cap. 346. Si tamen quæ sensu deprehendimus sequi voluerimus, potius album substituere deberemus odore, & colore magis congenicum. santalum album etsi odore citrino cedat, negari tamen nullo modo potest, si perficere si incaleseat, si lima minutim concidatur, odorem gratum spirare, quod in rubro nunquam experientur, quocumque modo tractetur: & propterea, & Lacuna, & Matthio

posi

citrinum, & illius loco album substituendum iure censent optimo illo deficiente.

7. Addendum præterea aberrare pharmacopæos illos, species has præparantes in subtilissimum puluerem indigentia ducunt : cum enim ad ventriculi frigidos affectus præcipue institutum sit hoc medicamentum, si aliquando in ventriculo resideat, quod facilius eueniet, si crassius fuerint species, facilius quoque suas vires parti illi poterit communicare.

8. In Diarrhodonis Abbatis speciebus Nicolaus Mylius, Salernitanus, & Præpositus, quamuis in aliquibus differant, corallo, seminibus lactuæ, & Mandragoræ, à priorum descriptione subtractis, semina tamen frigida vno consensu indunt, & cum species componant in unam confectionis, cum syrupo, aut iulepo rosato, non esse quod dubitent, nè si cum alijs in puluerem cum saccharo cando ducerentur, & miscerentur, rancidam conciperent qualitatem. At nobis, qui in pulueris formam seruamus, vt in necessitatibus ex ijs tabellis formatis illis vtissimus, id ipsum difficultatem facit, & ob hanc causam Fernellius lib. 4. Meth. & Syluius lib. 3. pharmacopææ, Deffenius lib. 1. suadent semina hæc mundata non nisi tempore reliquis immiscenda esse, & factis calculis argomenses duabus specierum drach. addendum singulorum granum vnum, & paulo plus tertia parte alterius, sicut speciebus trium santalorum, in quibus censent idem serendum, singulis drachmis singulorum dictorum seminum maiorum frigidorum grana tria, & paulo plus semina indenda. Quæ opinio quamuis non rejicienda, quod illi incommodum ea ratione effugiamus. Nihilominus, si sæpenuerò euenit, vt statim in vsum ducenda sit, & ob breuitatem temporis, aut seplasiarj negligentiam, quod nesciant quantitatem illorum addendorum, omittatur, & imperfecta remaneat compositio; & quia si simul initio misceantur, mistio quædam inducitur, & qualitas pro-

In aromatico rosato species nõ sunt subtilissimæ.

In Diarrhodonis semina frigida quòd & quæ mensura indenda.

propria, non dixerim fermentationem fieri, vel veram m-
 stionem, aut formam specificam, qualem ex mixtionem
 rum in Theriaca nasci scimus; si via aliqua, & modus ai-
 quis inueniri posset, quo à rancida hac qualitate puluerem
 hunc præseruare possemus, melius ægrotis nostris confu-
 tum esse iudicaremus. Diligentissimus Oniedus ob id hi-
 modo procedendum esse censuit: seminum horum frig-
 dorum maiorum drachmam accipito, quæ sint ex corticat-
 in mortario positis superposita papyro, blandè pistillo sup-
 diducto misceantur, donec in papyro viderimus contrac-
 oleoginositatē; mox spatula eleuatis seminibus, & dimo-
 à mortario, linteo humiditatem, siqua contracta sit ibi,
 stergemus, ijsque ibidem iterum repositis, iterumque a
 superposita papyro, blandè adhuc pistillum ducemus; huius
 mortario eximemus, alia denuo imposita seminum por-
 tione, si magna specierum copia sit paranda; eodemque me-
 cum ea agendum, mox omnibus simul in mortario pos-
 simul cum portione correspondente zucchari candi in p-
 uerem subtilem pistillo vehementius ducto deducuntur,
 alijs pulueribus admiscebuntur. hoc enim modo seminum
 demolitis, ac oleaginosas portiones eorum in papyro ex-
 pta, unde tota rancescendi occasio pendeat, in corrupta,
 viribus integræ species illæ conseruantur.

In tria san-
 ralo nō za-
 chare i. pi-
 lium indē-
 dum sed
 saccharum

59. In compositione trium santalorum ne quis Nice-
 Præpositi errorem sequatur, qui ubi auctor Myrepsus z-
 abreuiando scripsit, intellexit zacchare, quod exponit, pl-
 lijs, quod intentioni auctoris refrigerandi repugnat, & o-
 nibus fere doctis; cum potius zucchari intelligendum
 quod & ad gratificandum palatum, & ad faciliorem sei-
 num triturationem inditum censemus: neque absurd-
 est bis zuccharum indere, quoniam non in tabellis præ-
 rat, ut nos solemus, sed cum iulepo rosato in formam c-
 fectionis: neque tamen nos errabimus, si in formam tal-
 larum parantes bis saccharum indiderimus, ut in Diarr-
 do factum est, quod duplici dicto vsui inserviet.

60. Neque etiam recipiendus erit error Fuchſij in Fuchſijer-
aducendo myreſſo, vbi enim quadruplum ſyrupi roſati tor.

ſpecies Nicolaus ad Formandam confectionem poſuit,
quadruplum roſarum rubearum ad reliquas ſpecies repo-
nendum indicauit. In Myreſſo tamen præter commu-
nem deſcriptionem video inditam ſemiunciam florum
olarum; quam ſi quis addiderit, addita ad proportionem
debita quantitate zucchari, non fortè aberrabit.

61. Nollè in diacimino illius quantitatem nos metiri, In Diaci-
antequam aceto infundantur cumini ſemina; vt in diaphē- mino ſemi-
co, de daſtylis faciendum docebimus; diuerſa enim corū na prius
ratio: nam aceto infuſis daſtylis non leui illius imbibita metienda
quantitate, daſtylorum quantitas imminueretur: quod ſe- antequam
mini cumini non accidit: poſt infuſionem enim co exſicca aceto lauē
ident remanet pondus. tur.

62. Sæpius in pharmacopolijs reuiſcendis cum tabellas Diatraga-
diatragacanti adeo odore, ſapore, & colore differentes canti va-
inſpicerem, ac diuerſitatis cauſas inueſtigarem, non alium rietas cum
quam aut ex quantitate ſacchari, quo pulueres ex- ponendi,
ponuntur, aut ex modo illas componendi, aut ex aliquo & cur a-
m audacia prouenire credidi quamuis enim communi deo variè
nuium conſenſu conſtitutum ſit, pro ſingulis ſpecierum compo-
ticijs addendam eſſe ſacchari libram; regulam tamen hæc tur.
ceptionem pati plerique fatentur, ſi in pulueribus aliqua
miſceantur, quæ ſint ſubſtantie humidioris, aut ſemina
umentiora, & boni ſaporis: tunc enim puluerum angen-
t erit quantitas, vt optimè Arnaldus Villanouanus in
incipio ſui Antidotari annotauit. Cum vero hanc pulue-
s ad ſaccharum proportionem, qualis eſſe debeat non
preſſerit, non facilè ſcriptores hæc in re conueniunt, & in
ac poſitiſſimum compoſitione. Video enim Anutium For-
um inuere tres puluerum vncias ad libram ſacchari eſſe
medas; quem etiam ſequitur Braſanolus. alij verò ſolum
as. Pro qua re determinanda obſeruandum erit, in hac
ompoſitione an yllū ſolum, cuius ſemiuncia, & puluerem

liquiritiæ, cuius duæ drachmæ ingrediuntur, verorum pul-
nerum vices subire posse; tragacantha enim, & Arabicum
Gummi, tum & semina maiora frigida improprie inter
pulvres collocantur: quamvis enim Tragacantha &
Gummi Arabicum ita actu sicca sunt, vt in pulverem du-
ci possint, cum tamen potentia mollia sint, & humori im-
posita calido colliquecant, mediam quandam naturam
obtinere dicemus; cum verò penidiorum tres viciæ sac-
chari vices subeant; si pulverum veram quantitatem me-
tiatur, cum non excedant sex drachmas cum dimidia, &
sic nouem viciæ sacchari exposcerent; si tres penidiorum
viciæ trium sacchari vicijs substituamus, in aequali pon-
dere erunt, nempe sex sacchari, & sex pulverum, cæteris
cum penidijs collectis, & sic perpena natura media traga-
canthæ, & Gummi, satis mihi esse videbuntur duæ viciæ
horum pulverum ad libram sacchari; si enim tres indantur,
viscidiores euadent, & ratione tragacanthæ, & Gummi,
tum & ob portionem penidiorum. Sed in modo etiam, &
ordine miscendarum rerum videbam, & scriptores dissen-
tire, & in actu pratico pharmacopæos.

Modus enim parandi à Nicolao traditus nec sibi constans
est, nec aptus: cum enim omnia prius syrupo violato exci-
pienda docuisset, vt opiata formam tradere videretur, post
modum componendi tradens, semina cum aqua saccharo
superponi iubet; aquam autem tantam esse vult, vt semi-
nibus supereminet; tamdiu autem ita permaneant, donec
saccharum dissolutum viderimus; mox facta per rarum
linteum colatura, vult ad syrupi consistentiam cocta excipi
pulvres: qui parandi modus quot habeat incommoda qui-
libet obseruare potest: neque enim docet, an semina illa in-
tegra esse velit, an minutim trita; neque constat cur fiat il-
la percolatio; & si tamdiu omnia excoquenda sunt, donec
aqua cum saccharo syrupi consistentiam habuerint; non
video quomodo semina illa tantam admittere possint eli-
xationem; nec quomodo cætera syrupo illo excepta in ta-
bellas

Diamar-
gariti fri-
gidi varia
descriptio-
nes & que
eligenda.

Diaireos
simplex in
morfulis
quomodo
parandus.

augent quantitatem præter omnem rationem : sed impos-
stura deprehenditur ex farinæ sapore.

63. Cum tot, tam inter se varias, & differentes dia-
margariti frigidi descriptiones videam, & earum aliquas
adeo sine ordine, & methodo institutas; alias congestis
nimium, multis ita confusas; vt & pharmacopœorum mul-
ti desperent illas posse componere, ac ignorent quam ex
tam multis ad componendum eligere debeant : & medici
nesciat maiori ex parte quo vtantur instrumento : decerni
hoc loco ex multis hanc eligere, quam seplasiarj ditioni
nostræ subiecti teneantur paratam habere. Recipit hæc
margaritarum non perforatarum drach. vij. rosarum rubea-
rum drach. iij. sem. coriandrorum præparatorum, traga-
canti, gummi arabici, glycyrrhizæ, doronici, santalorum
eitunorum, alborum, & rubeorum ana drach. vna &
med. rasuræ eboris, cornu cerui, & ossium de corde ceruo-
rum ana drach. j. corali rubri drach. iij. foliorum auri nu-
mero xij. ducantur in mortario, & fiat pulvis subtilissimus
qui exceptus saccharo quantum ex arte constitutum est,
dissoluto in aqua florum citri, aut aurantiorum fiant tabel-
læ. In qua illud annotabo cornu cerui, ne vires cordiam
amicas amittat, non esse cremandum, vt fit passim, sed re-
tenuissima lima in puluerem redigendum, moxq; cum alijs
in mortario conterendum, & in pollinem, reducendum

64. In Morfulis Diaireos simplicis, qui soli sunt in
vfu, qui ex iridis semiuncia, sacchari candi, & tragacanthæ
ana drachmis duabus, & saccharo finissimo quantum
ex arte satis est, seruata semper symmetria vnius viciæ pul-
uerum ad libram sacchari, primo illud seruandum; radi-
ces Iridis virides non esse excoquendas ad amatoris deper-
ditionem, mox per setaceum traducendas, & tragacanthos
puluerizato, additoque saccharo formandas tabellas, vt
quibusdam placuit, vires enim radices per longam adeo
cocturam exsoluerentur, nec commodè in tabellarum for-
mam conformari possent; sed radicem siccam Iridis floren-
tinæ, aut Ilyricæ sumemus, & in puluerem subtilissimum
tine,

ducemus, vt & Tragacautham cum saccharo cando; mox superaddito saccharo rabellas formabimus, de hoc detrahentes drachmas duas pro duabus illis sacchari caudi puluerizati cū tragacātha, quę simul cum pulueribus inditę sunt.

65. In Dialacca Maiori Mesue ne nunc consideremus, quod apud multos controuersum est, an Arabū Lacca sit cauehamnum Gręcorum, quod nihil ad propositū negotium faciat, cū in medicamēto versetur ab Arabescripto, in quo Lacca Arabum recipere debemus à Serapione descriptam: quā esse proculdubio illam credere debemus, quam passim in officinis habemus, gūmi modo paruis lignis adhaerentem, rubro colore, splēdescēte, qua antiqui patres nostri ante vsū Cociniglię ad inducendū rubeum colorē panis utebantur: Illud potiū perpendendum cum laccam lotam in hac compositione indat Mesuę, qualis lotio hęc laccę esse debeat, & quę partes ex lorione, & elicita, & relictę in hunc vsum sint ducendę. Video. n. Serapionis verba lib. simpl. 181. vbi de laccę lorione agit, adēo in varios sensus distorqueri, vt in duas sententias inter se omnino contrarias sint distracti auctores: asserentibus aliquibus aquam, in qua cocta sit aristolochia rotunda, & iuncus odoratus, qua laccam lauandam esse pręcipit, donec ruborem contraxerit, esse seruandam, & excoquendam ad mellis consistentiam; mox in fictili vase seruandam, & in vmbra siccandam, vt in formam trochiscorum redigi possint: quoniam autem videbant aquam etiam si ruborem contraxerit, perclixationem ad mellis consistentiam reduci non posse, si vera sunt, quę de coctura aquę ab Arist. 4. Meteor. scripta sunt; vt pręter colorem, etiam crassitiem ex lacca concipere posset, quindecim laccę vncias, tribus libris superstitis decoctionis aristolochię, & iunci odorati incoquere, vt per vltiorē elixationē crassescēte aqua, formari possint trochisci, secuti sunt hanc opinionem Valerius Cordus, qui contraria derisā opinionione modum hunc laccę lauandę tradidit, quem secutus est Anutius Fęsius: vt & Bergomates, & Romani in

In Dialacca, quę laccha imponenda.

Lacca ablucendę ratio.

luis Antidotarijs. At Iacobus Syluius lib. 2. suæ Pharmacopœæ, quem securi sunt, & Bernardus Deslensis, Reuerendi Patres in Medicinam scribentes, Costæus, Quiedus, Augustani (quin ne Bergomenses quidam illam sententiam reiecerunt) ij omnes melius esse putant, si Laccæ trita, aqua fontana, cui Aristolochia, & schænanthos, ad æquas partes incocta fuerint, lauetur, pistillo semper agitando, quoad clarescat, quod resedit coletur, & sicceatur; sic namque magis aperit, huncque loturæ modum vel ex Pandectario desumptum facile quilibet intelliget, qui loturæ laccæ illius modum diligenter perpenderit: lotura enim & ad abstergendas ligneas partes, alas muscarum, & similia excrementa fit; tum etiam ut soluens in ea facultas, quæ in igneis illis, & rubescentibus partibus reposita est, quæ omnia in aqua relinquuntur, dissoluatur; at abstergens, & attenuans illi congenæ, adiuta tamen etiam à iunci odorati ac aristolochiæ qualitatibus magis ac magis vigescat, & confectionem reddat ad edomandos illos affectus magis idoneam.

In Dialacca, & flos schænu & palea indenda, cū bis schænu ponatur.

67. In hac Dialaccæ magnæ compositione cum bis schænu ingrediatur; dubitandum non est, & paleas, earumque sumitates primo loco; tum & flores; cum postea schænanthi meminit, esse imponendos: non negandum tamen sæpe per vocem schænanthi, quæ verè florem iunci odorati significat, totam plantam & paleam significari, ut videre est apud Gal. 8. simpl. cap. 128. vbi sub illo nomine primo plantæ; mox & florum vires posuit, ut & fecit Auic. lib. 2. Tract. 2. cap. 598. & quamuis, vbi in compositis ponitur schænanthos, si flos benè constitutus reperitur, is sit imponendus, tanquam verè flos schænu, & tanquam pars valentior, ut videmus fecisse Andromachum seniore, qui in Theriaca cum sex drachmas schænu potuisset, iunior filius tandem florum schænu posuit, ut videre est apud Gal. cap. 18. primi lib. de Antidotis: & lib. de Theriaca ad Pis. cap. 17. per schænu flores intel-
ligen-

legendos docet, vt & lib. ad Panphilianum cap. 10. Quin & Damocrates apud Gal. 1. de Anid. c. 37. flores Iunci ex Arabia sumens, non paleam. Et quamuis Gal. fateatur suo tempore paucissimam horum florum quantitatem reperiiri, & paleas eorum loco sumi posse: cum tamen temporibus nostris non leuis illorum copia deferatur, cum Schænanthos scribitur, flos erit indendus, si modo odoratus sit; ob tenuem enim eorum substantiam facillimè illorum facultas exoluitur; inquem casum præstabit paleas imponere. Verum cum in hac compositione, & sumitates iunci odorati, & flores requirantur; omninò præstabit non solum culmos iunci imponere, sed etiam flores.

68. Diasatyrium secundum Me sine, quod in usu est, adèd diligenter ab auctore est descriptum, & accuratè ab expositoribus explicatum, vt superfluum sim, & in meis his animaduersionibus longiori vterer oratione; illud solum animaduertam per capam humidam intelligere multi succi: & cum caparum aliquæ sint acriores, vt rubentes, aliæ miores, & bulborum naturam referentes, illas, quamuis moracitate magis stimulare aptæ videantur, has tamen potius esse eligendas, & ranquam magis succi plenas, & flatulentas, minusque, & odore, & sapore ingratas. Has tamen crudas cum sciamus quam minimum succi ob visciditatem substantiæ dare posse, ex ijs sub cineribus mediocriter modo coctis, quem Gal. docuit cap. 3. lib. 1. de comp. med. sec. loc. illum facilius extrahemus, & sic faciliè quantitatem illam succi habere poterimus.

69. Philonij Romani compositio omninò ea recipienda est, quæ communiter est recepta parum ab ea diuersa, quæ à Gal. 9. de comp. med. per loca tanquam Philonis Tharsensis descripta est; quanquam aliqui, & in ingredientibus & in mensuris retento nomine, Græci, Arabes, & Latini eam immutarent: nos communem sequendam censemus, in qua nihil mutatur, nisi Euphorbio in Castoreū mut.

In Diasaty
rione, per
cepas hu-
midas suc-
ci plenas
intelligen-
dum est,
sed non ni-
mis aeres-
A Capis
succu ex-
trahendi
modus
Gal. 1.

Philonij
Romani
composi-
tio sit cōi-
ter recepta
cū pipere.

70. Maiori longè animaduersione indiget Philonij

In Philo-
nio Perfi-
co pro pi-
pere inden
da semi pa-
paueris al-
bi.

perfic. compositio, quam Masuæ capite de sputo sanguinis
tradit ex sua inuentione, omnino diuersam à Philonic
Romano, & Philonio perfico Anicennæ: cum seminum
papaueris albi drachmas viginti posuisset; multi autem
obseruassent in Romano piperis albi tantundem esse im-
positum, errorem subesse existimarunt, & loco papaueris al-
bi substituendum censuerunt piperis albi, inter quos fere
primi fuere Patres commentatores Mesuei, quos secuti
sunt Sylius, Calestani, & alij complures, quæ opinio-
nem diuersitas cum magna secum inuehat incommoda
& in medendo damna; optimum esse censui rem hanc di-
ligentiùs ad examen deducere. Mouentur igitur, qui lo-
co papaueris albi legendum putant piperis albi, tum quod
Philonis Tarsesis narcotica compositio à Gal. tradita, &
lib. de Antidotis, & 9. de comp. med. loc. & quæ sub eo-
dem nomine à Græcis scriptoribus, tum & à Mauritanis
piperis albi drach. xx. recipit: tum verbis Mesuei sexto
canone capitis tertij intentionis tertiæ ubi inquit: "Timen-
tur autem ex narcoticis nocumenta plura, sunt enim om-
nino contraria rei vitæ, congelantia, & stupefacientia, &
mortificantia, nuda quidem magis; adhuc magis recen-
tia. Ars verò, & societas regunt eorum nocumenta, &
remouent: verum trium intentionum res admixtæ eis, ipsa
suarum operationem rectificant: sicuti verbi gratia, recte
miscentur ijs castoreum, piper, & crocus, sunt enim hæc
Theriaca narcoticorum. Sed piper, & castoreum faciunt
ad resoluendum, & carminandum; crocus vero maturat
& sedat vim narcotici. cum igitur compositio hæc opium
contineat, quod inter narcotica primum locum obtinet,
non aliud narcoticum, qualia semina papaueris albi debent
superaddi, sed potius quod vim habet corrigendi damna
opij, quale est piper. Deinde cum opium iam iudicatum sit
nulla videtur ratio superaddendi semina papaueris albi,
quæ eandem habent facultatem. Si tamen verba Mesuei,
ubi tradit hanc Philonij perfici compositionem; si mor-
bi,

cius curationem ibidem tradit, indicationes curatiuas,
 grauiſſimorum virorum ſententias obſeruauerimus: ſi
 que vim rationum contra ſentientium perpendamus
 ile in eam veniemus ſententiam papaueris albi ſemina
 enda eſſe, non piper album. Curabat ibi Meſue ſpu-
 in ſanguinis ex pectore, & inter remedia ponit hoc
 an ſem. papaueris albi. & iure quidem merito:
 n enim ad huiusmodi morbum curandum calorifi-
 egemus, quale hoc eſſet ſi drach. xx. piperis albi
 tineret præter res tam multas alias, ſed refrige-
 ribus, & adſtringentibus, vt lib. 5. Meth. cap. 3.
 nouit Galenus. vt etiam colligere licet ex Hip. lib. 7.
 horis. 37. & reuera, ſi ſanguinis per tuſſim ex
 mone reiectiones maiori ex parte, aut ex ſan-
 nis abundantia, aut caliditatis exceſſu eueniunt;
 le, & rupturæ, & corroſiones venarum producun-
 , quæ refrigerant, increaſant, & adſtringunt, con-
 iunt; non quæ calorificavi ſanguinem acuerere poſ-
 t. Et ſi quis experimento ex tactu linguæ id co-
 ſcere tentauerit, facilè ex vehementi linguæ mor-
 tatione cognoscet id potiſſimum vi piperis inditi e-
 ire; quod quomodo in ſputo ſanguinis conuenire
 ſit expertorum Medicorum ſit iudicium. Neque
 atur, piper requiri ad inſtingendam vim opij. Id
 n à caſtoreo, croco, euforbio, pyretro optimè
 tati poſſe omnibus eſt manifeſtum. quibus ſiquis
 chmas viginti piperis addiderit, compoſitio excaleſa-
 ns redderetur, quod in ſanguinis per tuſſim excretionem
 minò fugiendum eſſe præcipit Hip. 5. Aphor. 19. Auget
 tram coniecturam Meſuei compoſitionis modus, qui
 n drach. xx. hyoſquiami albi, non debeat piperis albi tan-
 dem coniungere, frigido calidum: Aſſentiendum igitur
 ius erit Petro And. Matth. qui 5: ſuarū Epist. defendit
 hac Philonij Perſic. cōpoſitione nō ponēdas eſſe piperis
 drac. xx. ſed ſem. papaueris albi; quā opinionem etiam
 ſequuti

sequeuti sunt non pauci ; & si multis per quinquaginta
 annorum spatium meis experimentis aliqua fides habenda
 est ; testari ingenuè possum , non paucis sanguinem e
 puentibus , potissimum ex causis externis , tum & ex car
 rho salso , & in fracturis venarum , salutem parasse medi
 mento hoc cum seminibus papaueris albi parato . alijs au
 dato philonio cum pipere albo querimoniam subsecuta
 esse ob ardorem in faucibus , gula , & ventriculo . Cum i
 tur Philonium Tarsense aut Romanum in pharmaco
 lijs paratum ex pipere albo habeamus ; præstabit in nos
 hac Mediolanensi prouincia curæ nostræ commissa , P
 lonium Persicum habere ex viginti drachmis seminis p
 paueris albi ; illo quidem vt colicis doloribus , & ventricu
 & aliarum partium , hoc vero hæmoptoicis , & alijs crue
 tis fluxionibus referuemus , ad incrassandos , & refrigera
 dos humores , sistendas fluxiones , adstringenda ora venar
 & conciliandum somnum . Neque est , quod quispiam r
 tionibus à Patribus illis & Fuchio moueatur ad asserend
 primam illam sententiam : vt enim concedimus ad opij ,
 narcoticorum corrigendam vim optimum esse piper , cast
 reum , & crocum : ita negamus semper tria illa inunctim a
 munus illud præstandum requiri : alioqui reprehendendi
 esset Mesue in Athanasia Magna , & in compositione e
 styrace , in quibus opium inditur , corrigente solum Cast
 reo , & croco , sine pipere : & in compositione Diasulphuri
 in qua cum opio piper solum , & crocus iungitur , vt & N
 colaus in compositionibus Adriana , Acharista , & in Aure
 Alexandrina , in quibus cum opio ex tribus illis corrigen
 bus duo solum indidit . Quinimo in Trochiscis de Alche
 chenzi Mesue , opium inponitur sine vlllo ex tribus i
 lis vim opij corrigen
 breuiatè degat PP. , cur magis piperis , quam papaueris , in
 telligi debeat : quinimo diligentissimus Ouiedus contra e
 uincit , quod in syrupo de papauere , vbi in suo antiquo li
 bro est similis abbreviatio , non potest aliud intelligi quam

papaveris. Neque conuincit, quod dicunt, absurdum esse, bi est opium, semina papaueris albi addere: Mesue enim ose in Athanasia magna, in Trochiscis de Alchechengi, & arabe vtrunque indidisse facile, si volent, cognoscere possunt.

71 In eadem compositione cum ponatur scendenegi, Scedene-
gi in Phi-
lonio per-
sico est la-
pis hæma-
titis.
giæ vox est Arabica, dubitatum est, quid nobis repræsen-
tetur, alijs alia intelligentibus. Ego cum porioribus intelligo
epidem hæmatitem. moueor autem quia apud Mesuem
capite de curatione cruenti sputi ante traditam hanc Phi-
lonij Persici descriptionem scendenegi, ait, præstantissimum
hoc esse remedium, purissimum si lotum exhibeamus;
uæ lotura magis lapidibus conuenit, quam semini canabis
ut similibus. si præterea consideremus facultates lapidis
amatis traditas à Diosc. lib. 5. cap. 101. & Gal. 9. simpl. c.
easque ijs comparemus, quas Mesue suo philonio persico
tribuit, proculdubio hæmatitem indendam indicabimus, cū
facultatibus ijsdem propemodum ornatam vtramque esse
seruemus.

Est tamen, quod hac in re non leuem faciat difficultatē,
quod idem Mesue in trochiscis de terra sigillata post lapidē
hæmatitem, imponendum addidit & scendenegi, tanquam
differentes res inter se. Sed non multum vrget hæc obie-
ctio, quia non semel contingit rem eandem variata mensu-
ra vni medicamento imponi, vt apud Mesue in Diacinna-
nomo, vbi & cinnamomum, & Darfeni, quod idem est, im-
ponit: & in Diasena Nicolai, vbi bis Cariophyllos imponit.
Quæ si alicui non satisfecerint, loco scendenegi indere po-
terit semina granati syluestris, quæ facultate refrigerante
tam adstrictione facile satisfacient.

72 In hyoschyami albi seminibus in puluerem deducē Sem. hyo-
scyami in
philonio
quō tritu-
rantur.
tus non leuis subest difficultas, si simul cum alijs trituratione
in mortario subiciantur: oleaginosa enim sua qualitate
alijs pulueribus communicata impediēt transitum per se
aceum. Vt igitur huic incommodo occurratur, per se in-
mor-

mortario tritulari poterunt, & post leui aquæ addita quæritate in massam reducentur, qua cochleari extracta, exsiccata, iterum cum alijs puluerizandis admixta, compositioni huic inservire poterunt: aut iam exsiccata, & pulverizata per se cæteris adiungetur.

Philonium
Persicum
non ante
sexm
mensm, in
vsum du-
cendum.
In Diaphe-
nico dacty-
li cheyron
quid sint.

Cheyron
non signi-
ficare im-
maturum.

73. Neque in vsum duci debet compositio hæc ante primum mensẽ, sic docente Gal. 12. Meth. & 2. Glauc. & secundo, tertio & quarto anno perfectas omnes & integras vires possidet, licet ad annum usque decimum non omninò remaneat inutilis.

IN MEDICAMENTA SOLVENTI

Animadversiones.

74. **M**ulta sunt, quæ in Diaphœnico componenda animadversione sunt digna.

Et primo nisi quid per Dactylos cheyron sibi velit Medicus, intelligamus compositionem hanc inutilem habemus, & ea videntes Medici suo frustabuntur sine. Iacobus enim Syluius, quem secuti sunt Bernardus Desseñius, Rodæus, & alij multi, immaturos intelligunt; tum quod nomine illo flavos intelligant, quales non nisi sunt immaturi; tum, ait Desseñius, quia immaturi potentiores ad stringendi, & roborandi vires retinent: nam illiusmodi exigua qualitas alijs purgatorijs mixta efficacius mouet. Gal. testificante 3. Simpl. cap. 14. sed malè Syluius ex voce Græca *χιρρός*, quæ solum nobis significat, cheyron Arabicam coligit, quam si immaturum interpretemur absurditatem ducimus. Mesuem in Looch de pino, in quo cum ponat carnem dactylorum cheyron, si carnem immaturorum dactylorum imponeremus, nescio quomodo atque rursi, sputo glutinoso, asthmati, & spirandi difficultati per tale medicamentum succurreremus; cum ob immaturitatem petiùshos affectus augetet. neque Desseñius ratio id persuadere potest. Galenus enim, leuem adstitutionem, medicamentorum purgantium actione adi-

re, dicit; quod facile etiam persuadet tantam quantita-
tem valenter adstringentium non esse huic medicamento
dendam, qua vis aliorum medicamentorum soluentium
fringeretur; ac cohiberetur; quinimo in Emplastro dia-
cnenico Alexandri adstringenti cum immaturos dactylos
mere vellet; non cheyros dicit, sed maturationi vicinos.
ligendos igitur censemus dactylos maturos, bonos, pul-
los; & per vocem cheyron prastantissimos, & selectos
intelligere esse Mesuem crediderim.

75. In aceti quantitate, in qua infundi debent dactyli,
uarii debet, quod à Mesueo cap. de infusionibus traditū
est, ut tanta solum sit, quanta à dactylis infusis absorberi
possit. Docebat enim duplicem esse finem infusionum;
unum, ut facultates, & vires medicamentorum infusorum
uix aut liquori communicentur; & tunc liquoris tanta
est copia debet, ut materiae infusae superemineat per
os, inquit, digitos; ut melius, & perfectius contrahere
possit vires possit; alterum cum infusio sit, ut res infusa
maiores, & eius vires concipere queat, in quo casu tan-
tum liquoris adhibendum est, quantum maiori ex parte
absorberi possit ne si quantitate excedat, quod superest pro-
ciendum, simul partem virtutis rei infusae disperdat; cum
huius actioni reactio coniuncta sit: cum igitur hic da-
ctylorum fiat infusio in aceto, ut id absorbeatur, tantum
necedendum erit, quantum absorberi à dactylis possit,
et minima illius parte superstite.

76. Neque ex hoc loco, ubi infusionem hanc dacty-
lium in aceto voluit fieri per tres dies & noctes, quis col-
lat, ubi Mesue aut alius auctor per diem infusionem
faciendam, per duodecim horas solum intelligi debe-
re, ut ex hoc loco collegit Brasauolus in examine syrupi
mentha. Id enim advertatur docet. Gal. 7. de cōp. med.
hoc. cap. de compositione ex capitibus papaveris aduersus
erem, ubi per diem semper intelligendum censet diem
in nocte: ut & 8. Meth. med.

In Diaphe-
nico aceti
que mensu-
ra pro da-
ctylorum
infusione.

Diem 24.
horarum
intelligen-
dum esse.

Per partes
in comp.
medica-
mentorū
quid intel-
legendum.

Dactilos
ponderan-
dos ante
infusionē
in aceto.

77 Per partes etiam, quibus in hoc medicamento ingredientia metitur, intelligendæ sunt mensuræ, & pondera-
branda, iuxta quantitatem medicamenti componendi, partes, diachmas, uncias, vel libras, intelligentes, ut optime annotauit Gal. 3. de comp. med. per gen. cap. 5.

78 Neque hic Mesuei verba, cum dicit, dactylorū che-
ron aceto per triduum maceratorum, interpretanda sunt, si veller ad libram pendendos esse dactylos postquam ad-
macerati fuerint, ut Ioanni Costæo, & ante eum alijs videtur, quod & verba Mesue id persuadere videantur; quod
quia dactylorum videtur quantitas respectu aliorum ingre-
dientium; quodque deinde in Diacymino, cum semi-
cymini per diem in aceto infusa sumit, fateantur omni-
libranda esse post infusionem siccata. Nam & auctori
magnorum virorum, & ratio omnino contra persuade-
centum partes dactylorum antequam infundantur, &
pendendas. Sequitur hanc opinionem Brasauolus, Pat-
commentatores Mesue, Desseius, & peraque medicorum
Collegia: sed & Auicenna, & Serapio in suis compositioni-
bus ex dactylis, quamuis ab hac diuersis in reliquis dacty-
los ante macerationem pendunt. & rationi id etiam con-
ueniunt, tum quoniam non dactylorum substantia pen-
datur, sed aceti sæpe maior quantitas: sed nec certa vis
in hac compositione haberi posset dactylorum quantitas
pulposa enim vel arida eorum substantia, multam, aut pe-
cam aceti quantitatem absorbens quantitatem dactylorum
sæpe variabit; nec semper eadem aderit quantitas dacty-
lorum, nec eadem proportio mensuræ eorum ad alia ingre-
dientia. Neque familiarem Mesue illum loquendi mo-
dum aliud significare is intelliget qui librum simplicium per-
gerit; quantitatem rhabbari, asari, & senæ per infusionem
traditam. Neque Costei argumentum, viget à proportione
quantitatis dactylorum ad alia: desumptum, si enim me-
dicina securitatis esse debebat, sique ad eam quantitate ad-
mendi medicamenti perueniendum erat, imponenda erant

quan-

quantitas; potissimum nobis qui scammonij drachmas
 igitur duas indendas esse iudicamus, neque dicant præter
 actylos acetum imbibitum medicamentum ingredi; per
 olandi enim erunt post infusionem dactyli, per feraceum
 aducendi, & igni lento apponendi, ut ex parte acetum
 vaporet. Nec cumini aut coriandrorum infusionis simi-
 tudo aliquid concludit: eorum, enim sicca substantia effi-
 e, ut post infusionem siccata eadem sint.

79. In scammonij quantitate quanquam plerosque vi-
 ram drach. xij. solum imposuisse, quoniam tamen scio
 collegium nostrum celeberrimum, iam fere ducentis ab
 ie annis drach. xxij. indendas decreuisse, ab eius senten-
 a recedere quasi impium esse censui. & quamvis videam
 difficultatem augeri, quod si cum drach. xij. non plegma-
 ogum, ut Mesue censuit, sed cholagogum aliquibus vi-
 um sit, si drach. xij. addiderimus multo magis bilem euac-
 uare credendum erit: nihilominus, si quæ à Diosc. de viti-
 as scammonij debentur, considerauerit quis, qui non solum
 lem, sed etiam pituitam euacuare scribit, & quæ ab Alex.
 ralliano, qui scammonium ex cotonio, quod Diacridium
 icimus (cuiusmodi omnino indendum censemus) magis
 ituitam quam bilem educere scribit; si præterea Turbith
 aturam, & vires considerauerimus; nullam res hæc faciet
 ifficultatem, quod his positæ etiam inter plegmagoga po-
 aimus enumerare. Et re vera affirmare possum inter sol-
 entia medicamenta nostrum hoc cum drach. xij. scam-
 monij, spatio hoc quinquaginta quinque annorum elemen-
 tissimum me esse expertum.

80. Pro amygdalis malè aliqui amaras intelligunt, quod
 is magis in usum duci pro medicamentis dixerit Diosc.
 b. 1. 139. cum alicui ibi nil aliud sibi voluerit, quàm ama-
 is solum pro medicamentis, dulces vero præter id pro cilo-
 opitis vsurpari, & si per amygdalas absolutè amaras intel-
 gere deberemus, in vnguento rosato Mesue vtrique amaræ
 rater omnem rationem essent indendæ. Nobiliores igitur
 quales

Scammo-
 nij quan-
 titas in
 Diapheni-
 co sit drac.
 xxij.

Amygda-
 læ in Dia-
 phenico
 intelligen-
 de dulces.

quales sunt dulces, erunt eligendæ, vt in suo Diaphœni fecisse videmus Auicennam, & Serapionem.

Trituratio
nem bonã
intelligen-
dam esse
mediocrẽ.

81. Non placet Bernardi Dessenij sententia, qui cum Mesue hæc omnia trituratione bona esse conterenda scribit in subtilissimum pollinem, & per subtilissimum setaceum esse tritundas res has intelligendum esse censuit; cum simplicibus ijs aliqua si per se trituranda fuerint, crassiore alia mediore, alia subtilem requirant triturationem. Propterea per bonam triturationem horum omnium simul mediocrem intelligit, omnibus aliquo modo conuenientem, a quasi dixerit ex arte.

Mellis des-
pumatio
quomodo
facienda.

82. Melle despumato excipiendos pulueres præcipit Mesue: vbi non placet, si sicco igne mel solum despumetur; sic enim sæpè adustionem quandam, ac redinem, amarorem contrahit: conueniet magis, quod à pierisque fit, si aquæ admixtum despumetur per elixationem spumæ elicitæ, & sublata, vt docuit Gal. 3. de alim. fac. cap. 3. Quoniam tamen fieri non potest, quin aliquid aquæ admixtum relinquatur, quod conseruationi confectionis aduersabitur, præstabit igitur alio modo mel despumari veluti eo, quem tradit Galen. 7. lib. de comp. med. local. ca. in septima arteriaca; in duplici vase facta mellis ebullitione, & despumatione: sic enim nullum subest periculum adustionis, aut ingrati saporis acquirendi, suamque seruatur naturalem constitutionem: securiusque ea, quibus admisceatur, aptum est conseruare.

Mellis quã-
titas quæ in
electuarij
cum dici-
tur quantũ
sufficit.

83. In mellis quantitate determinanda, quod Mesue dixerit, tantum mellis indendum, quantum sufficit, & in alijs compositionibus sæpè, quantum sit ex arte; efficitur in hoc composito, vt & in alijs, scriptores adeo inter se diffideant, alijs duas libras imponentibus, alijs tres, alijs quatuor, alijs quinque, & alijs sex. Ioannes Costeus noua mensura & dosi exhibendi huius medicamenti, & enumeratione purgantium ingredientium, & reliquis, supputatione suo modo facta, concludit supputatis partibus per drach-

rachinis, cum totum electuarium ascendat ad drachmas
 cingentas, & decem, & nouem, idest, vncias nouaginta
 vnam, cum ingredientia omnia pendeant drachmas du-
 centas & duas supra quinquaginta scilicet vnc. octo supra
 viginti; propterea quod deest, ad vnius supra nonaginta
 numerum, idest vncias tres & sexaginta, supplendum esse
 melle: sicque addendæ erunt libræ mellis quinque & tres
 vncias: euaderque ait, medicamentum tale, cuius summa
 osis drachmarum erit decem cum dimidia ex auctoris
 scripto, à quo non est discedendum. Ne igitur in po-
 terum in tanta varietate versetur; vbi Mesue igitur, &
 illi scribunt mellis aut sacchari quantum sufficit, aut quan-
 tum sit ex arte, operæ precium facturos nos esse arbitra-
 mur, si hanc rem hoc loco examinemus. Arnaldus Villa- Mellis ad
 nouanus in principio sui Antidotarij, Syluius in proæmij species cōis
 Antidotarij Mesuæ præfatione, Patres commentatores proportio
 Mesuæ in Dialanga, Fernelius 4. Meth. cap. 15. quos re-
 centiorum omnis turba sequitur, communi consensu vo-
 cauerunt in electuarijs formandis ad tres specierum vncias
 addendam esse libram mellis, quam secutum videmus Me-
 suetum in Diamosco dulci, & in Philonio suæ inuentionis.
 Quam tamen proportionem non semper seruasse videmus
 in Diacironite solutiuo, & alijs, & Auic. lib. 5. Tract. 2. in
 Hiera Galeni, specierum, & mellis æquales ponit portio-
 nes, & in Triphera magna quatuor specierum vncias libra
 mellis excipit: & Gal. 2. de Antidotis cap. 14. in electua-
 rio de sanguinibus duplum ponit mellis ad pulueres. scimus
 tamen Andromachum in compositione dicta Chermen
 priorem illam regulam seruasse; libram mellis addendo ad
 tres vncias specierum. communiter tamen recepta hæc re-
 gula libræ mellis ad tres vncias specierum suas habet cau-
 sas ex quibus etiam cur quandoque ab ea sit recedendum
 facile colligere poterimus, si quæ à Damocr. tradita sunt
 apud Gal. 2. de Antid. cap. 9. & Nicolao in principio sui
 Antidotarij considerauerimus, & quæ ab eodem Gal. 4. de

Mellis &
zuch. in cō
positis ad-
miscendi
causæ.

Mellis quā
titas quan-
do minuen-
da.

Costæi de
mellis ad
species pro
portione
sententia
reprobata.

Mellis in
compositis
vices quæ
suppleant.

Tuenda val. vbi de mellis agit quantitate necessaria pro
compositione Diacalamintes: ex quibus duæ causæ eliciun-
tur, cur mel compositionibus indatur; nempe vt sicca pul-
uerulenta vniantur, & vt seruatis viribus, etiā palato bla-
diantur. Tertiam si addiderimus, vt medicamentum diu-
tius incorruptum conseruari possit, causas omnes huius
modi proportionis habebimus. sapius igitur facto pericul-
maioris quantitas mellis, & minoris ad tres specierum
vncias, cum experientia esset comprobatum, aut non vnius
pulueres, aut ingratum nimis reddi medicamentum; au-
si gratum fuerit, viribus expectationi non correspondere
aut non conseruari; communem illam regulam constitu-
runt: à qua tamen aliquando recedendum erit, si au-
species ipsæ per se corruptioni resistunt, & tunc melli-
mensura est diminuenda, vt in Hiera Galeni; aut augen-
da, vbi vim specierum aliquantulum imminuere volumus.
Quæ à Costæo proponitur proportio ad soluentia ingre-
dientia, & ad dosim assumendi medicamenti extremam;
si non aliam inueheret difficultatem, saltem illam non ef-
fugeret, quod ob difficultatem supputationis plerique illa
relicta adhuc animo hærerent in quâtitate eligenda: Illud
tamen habet incommodi, quod si in composito aliquo pa-
rando, quæ soluunt, si pauca fuerint, species autem ad-
iunctæ multæ, quam minimum mellis indi deberet; hueq;
non possent species vñiri: vt obseruari potest in Electuario
Indo maiori, & in Hiera inuentionis Mesuræ. Sed cum ab
initio docuerimus in mellis assumenda quantitate adeo sæ-
pe variasse scriptores, conandum erit rationes inuenire tan-
tæ diuersitatis præter eas, quæ proxime sunt enarratæ.
Quas vt inueniamus primo sciendum est, in his compo-
sitionibus tria ferè semper inueniri: species siue pulueres,
mel, siue saccharum; & res alias, quæ neque verè species
dici possunt, neque mel, quæ extraneæ dicuntur;
quod aliquando cum speciebus coniungi possint; nunc
mellis aut sacchari vices obtinere ex parte possint, nunc

in medio consistentes neutri annumerari. Pulueres & species cum Andromacho in compositione Charmen apud Gal. 2. de Antid. cap. 15. res siccas, quæ trituri & per incerniculum transigi possunt, in quibus tamen ea non connumerantur, quæ quamuis actu sicca sint, si tamen triturentur, cum potentia humida sint, duritiem, & siccitatem amittunt, ut saccharum, penidia, & similia. At intermediorum, quæ nec species, pulueresue sunt, nec mel, cum multa sint, quæ vices mellis subire possint, efficitur, ut mellis illa quantitas & proportio quandoque non seruetur, quæ communi consensu recepta est. Sed quoniam horum multiplex est substantiæ conditio; constituendum in vniuersum erit, res eas omnes simplices, quæ medicamento ea dare possunt, quæ mel aut saccharum præstare potest, mellis aut sacchari quantitatem imminuere. Quæ tria illa officia mellis aut sacchari in medicamentis vniendi, conseruandi, & dulcorandi præstare possunt, mellis vices subibunt, & pro melle mensurari poterunt. non secus ac in vnguentis, & ceratis, locum ceræ, aut terebinthinæ ea supplere dicit Gal. 3. med. comp. per gen. cap. 5. in vnguento ex metallis ad vlcera, & cap. 6. in quibus axungiam, sebum, picem, oleum, & similia, ceræ, & resinæ vices supplere dicit, & à pondere horum esse minuenda: de qua re suo loco. Sic fecisse videmus Mesuem in Confectione de Gemmis, xyloaloes, lactificantis, in quibus cum tantam miuæ aromaticæ, & mellis emblicorum posuerit, nullam mellis indendi facit mentionem, ut in multis alijs. quinimo in Confectione de Aromatibus cum duodecim solum imposuisset vncias miuæ aromaticæ, quæ quantitas ad tria illa mellis officia præstanda non satis erat, addit mellis quantum satis est: sed in confectione electuarij ex inuentione nostra cum miuæ aromaticæ tantâ indidisset quantitatem, quanta necessaria erat ad species vniendas, & compositionem conseruandam, & dulcorandam; mellis nullam indidit portionem. Rerum denique quæ nec species

Dactyli
emolliti &
penidia vi-
ces mellis
in Diaphœ-
nico obti-
nent.

In Diaphœ-
nico quæ
mellis quã-
titas inden-
da.

In Confe-
ctio. Ha-
mech. à da-
ctylis ossa
eximanda.

pulueresue sunt, quæ extrauagantes dicuntur, quamuis ali-
quæ aliquando mellis aut sacchari vices subeant, maiori
tamen ex parte cum mediam naturam inter dura, & mol-
lia sortiantur, non alterant aut mutant proportionem spe-
cierum ad mellis quantitatem; sed confectionis corpus
constituentes aliqualem in consistentia constituunt diffe-
rentiam; sub hoc genere continentur amygdalæ, pinci,
auellana, semina carthami, quatuor semina maiora, &
similia. Vt igitur tandem ad id, vnde nostra digres-
sa est oratio redeamus; Dactyli, & penidia, quæ in multa
quantitate in Diaphœnico ponuntur, mellis locum ex par-
te occupabunt, & tanquam, fundamentum medicamenti
ponuntur; amygdalæ tanquam medix, & vt extrauagantes
dictæ. His sic stantibus optimè concludit. Oui edus pro
partibus drachmas accipiendo, & vncias sumentes drach-
marum nouem, quindecim vncias & mediam mellis esse
in hoc electuario indendas. recipit enim octo solum vn-
cias puluerum, pro quibus mellis indendæ essent vncia tri-
ginta dua, à quibus detrahentes centum drachmas dacty-
lorum, & quinquaginta penidiorum, quæ mellis locum
subeunt, quæ sunt vnciæ sexdecim cum dimidia, super-
sunt mellis vnciæ quindecim cum dimidia superaddendæ,
vt numerum triginta duarum expleamus, quæ correspon-
dent proportionem. Verum, cum nos scammonij non duo-
decim drachmas, sed viginti duas, ut iam docuimus, in-
damus, sicque puluerum plus quam nouem drachmas su-
mamus, mellis vncias saltem viginti imponemus.

84. In confectione Hamech non pauciores nec facilio-
res sunt difficultates nec minoris momenti animaduersiones,
& primum Myrobalanos: sublatis ossibus esse in de-
coctione hac omnino ponendos, & pensandos, secus quam
censuerit Platearius lib. simpl. cap. 18. qui vbi in compo-
sitis poni debebunt cum sui substantia abiicienda ossa esse
censuit, in decoctionibus autem ossa esse retinenda, potis-
simum citrinorum, præter omnem rationem censuit.

85. In rhabarbaro etiam excoquendo apud aliquos est difficultas, quod Mesue in Dist. simplicium cap. proprio leuem admittere scribat coctionem, ne igneae partes, in quibus purgatrix facultas reposita est, euanescant: quomodo igitur eandem patietur decoctionem cum ijs, quæ & solidioris sunt substantiæ, & longiorem admittunt coctionem, si vera sunt, quæ & à Mesue in canonicis, & à nobis de graduatione decoctionum dicta sunt: ut propterea aliquibus visum sit, separatim infundendum esse rhabarbarum, & excoquendum. Sed, & hoc ijs repugnat, quæ ab initio de elixatione dicta sunt. non esse alterandas aut mutandas formas decoctionum ab auctoribus traditarum pro componendis aliquibus medicamentis; quod permixtionem multarum illarum rerum aliquando vnius naturæ per alteram immutetur. Addendum vero sic admonente Brasauolo in examine syruporum; tanto magis id esse obseruandum, cum elixationi præcedit infusio, per quam mixta quædam virtus extrahitur, & composita, quæ immutat naturam ingredientium, potissimum si per longum tempus facta fuerit. Quod in hac pluribus rationibus euenire dicere possumus, tum quod infusione per quinque dies facta, & calente conseruata in ocluso vase purgatricem facultatem rhabarbari aquæ communicatam esse verisimile est, tum quod mixtione rerum aliarum compescitur dissolubilitas illa subtilium partium rhabarbari. & quod hoc ita sit, inde etiam colligitur, quod rosas, & violas eadem decoctione, quæ minimam admittunt elixationem, decoquendas docuit: Sed quod hac in re omnem tollit difficultatem est, quod post infusionem hanc communem omnibus rebus, factam per quinque dies in vase angusti oris, & bene oclusi, leuissimam inbet adiungendam esse elixationem, qualem omnino rhabarbaro conuenire iam docuerat. desinant igitur nimis diligentes ij in rebus claris huiusmodi scrupulos iniicere.

Decoctio non est graduanda, cum sit præcedente infusione, & cur.

86. Et quamuis Mesue Colocynthidem & agaricum

Colocyn-
tis & Aga-
ricus quo
infus. cōf.
Hamech.
infundēdi
& decoquē-
di.

Seri quæ
quantitas
in confect.
Hamech,
decoctione

simpliciter cum alijs infundendum iubeat, placet tamen
Dessenijs sententia in linea pecia raræ texturæ alligata ea
esse infundenda, ne filamenta quadam, quæ ab ijs per co-
ctionem separati solent, liquori admixta ventriculo si ad-
hareant, tormina, & astuaciones in ventriculo inducant;
quod vt euitari posset, docuit Serapio lib. simpli. capitulo
182. vbi coctione illius vires in liquorem aliquem extra-
here velimus integram esse excoquendam; si tamen dili-
gentiam hanc adhibere noluerimus; sed crasso modo fia-
ctam in sero simpliciter infundere voluerimus, vt & aga-
ricum; post cocturam, colatura per pannum lineum, bene
contextum, & sine expressione erit facienda.

87. In seri etiam quantitate video scriptores maxime
desistentes; Dessenio viginti libras, Syluius quinque
tantum ponente; alij tantum seri sumendum contendunt,
quantum supra res infusas serum per duos digitos, alij
per quatuor eminere possit. Verum, ut à posterioribus ijs
exordiat; non video quomodo hoc signo mensuram me-
tiri possimus, cum illud certissimum sit, pleraq; res infun-
dendas, ob siccitatem & leuem spongiosanque substan-
tiam liquori supranatare. viginti libras si cum Dessenio su-
mamus, vereor, ne tantæ quantitati seri capilli, ingre-
dientium qualitates communiçatæ, imbecillio rem vim me-
dicamenti reddant, potissimum cum post infusionem illam
quinque dierum, leuissimam elixationem, & fortem ex-
pressionem, addita cassia, tamarindis, & manna, addito
saccharo albo, iterum elixatio sequatur ad mellis consisten-
tiam, in tam longa elixatione purgatrix facultas omnino
imminuetur. Quinque tamen libræ seri; quam men-
suram Syluius satis esse censuit: adeo parua quantitas
videtur; vt si sicco igne fiat, assationi potius quam eli-
xationi inferuire posse videatur, si in duplici vase calore
humido vasis ore bene clauso, vix mellis consistentiam ac-
quirit. Experti itaque artificis iudicio res hæc tota com-
mittenda est; qui rerum substantia, & siccitate perpen-
sa,

& mo-

& modo incrassandi liquoris considerato, tantam apponat liquoris quantitatem. quantam necessariam cognosceret, vt integris seruatis viribus infusorum ad illam consistentiam reduci infusio cum additis rebus possit, qualis est, quam in melle obseruamus.

88. Quomodo autem serum incorruptum per quinque dies seruare possimus, quod adeo breui tempore accessere videmus, multis fecit difficultatem: adeo vt Galli medici inter quos Doctissimus Fernelius illum immutarit; hanc Mesuei sine arte concinnatam censens: Aliqui, vt periculum hoc corruptionis, aut acetentiae effugiant saepius vas illud agitandum censent: quo remedio, id obtineri non posse quilibet experietur, qui in alijs infusionibus in sero factis vel alijs liquoribus periculum facere voluerit. Alij calidum seruandum serum ducunt coniectura ducta ex verbis Mesue qui in vase angusti oris & bene oclusi infusionem hanc rerum in sero faciendam praecepit, quod factum à Mesue arbitrantur, quod voluerit semper calentem infusionem seruare nos debere, vt seruetur sine putredine: si enim frigidam admitteret, non fuisset necessarium os vasis angustum esse & bene oclusum, cum à frigido nihil exhalaret; calentem, igitur seruetur, vt à putredine, mucore, & acetositate illam vindicet. Verum si experiamur aliquis sero in tali vase per quinque dies seruato calente, an à putredine, vel acetositate vindicari possit; facile conoseet hanc sufficientem non esse viam praeferuendi feri in naturali sua constitutione, cognoscent quidem & agitatione frequēti magis communicari qualitates infusarum rerum liquori, & item calore fouente eosdem melius extrahi. at his solis praeferuari serum à corruptione, hoc est, in quo animus meus non acquiescit. Non negauerim duo haec ad id non nihil conferre posse; at praeipuum praeferuationis feri à putredine, atq; immediatam causam crediderim esse amaritudinem summam colocynthidis, & absynthij, quam in Methodo vniuersali Mesue professus est vim ha-

Seri incorrupti per quinque dies seruandi ratio.

Cassia in
Hamech
sit succus
purus.

Cassia eli-
xata qua
ratione
conseruen-
tur.

bere maximam præseruâdi res à putredine. & l. simp. c. 12
ex professò hoc absynthio maxime cõuenire professus est
89. Per cassiam fistulam puram siue mundatam nos
possum non intelligere pulpam & succum cassiæ huius
nigræ, à fistulis extractum, à seminibus & laminulis pur-
gatam; nescio enim quomodo mundam aut puram medul-
lam illam dicere possumus, nisi à seminibus & excrementi-
tius laminulis sit spoliata.

90. Neque eorum opinio admitti debet, qui succum
siue medullam hanc cassiæ minimè censent esse elixan-
dam, sed sufficere, si pauca aliqua liquoris illius quantita-
te ad mellis consistentiam deducatur: quod Mesue in sua
vniuersali methodo cap. de decoctionibus asserat lenientia-
& lubricantia, qualem cassiam fistularem esse scimus
nullam aut pauca ex decoctionibus acquirere vtilitatem
quin si ex aere, extractam è fistulis, & aliquandiu in vas
aliquo seruata, docet Mesue vim lenientem amittere
quod in humiditate quadam blanda vis illa reposita, al-
aere absorpta dissoluantur: quanto magis hoc ab igne
maioris actiuitatis id præstandum esse censendum erit. Sed
hæc non faciunt, ut à modo componendi hoc medicamen-
tum, ut Mesue hic docet, recedamus, utque succum huius
cassiæ non elixemus. Argumentum ex Mesue capite de
decoctionibus desumptum si quis considerauerit, quæ ibi
idem proximè dixerat cognoscat nihil concludere: docet
enim, non eandem ex elixationibus omnium rerum obti-
neri vtilitates; per rerum enim acrium elixationem, dis-
solutis igneis partibus medicamenta illa mitiora reddun-
tur, minusque calida, & minus mordacia; quod in elixa-
tione lenientium, & lubricantium non contingit. Neque
etiam ex elixatione pulpæ cassiæ lubricans, leniensue fa-
cultas tollitur, perinde, ac si diutius in vase extracta con-
seruetur: nam sic aeræ partes, & siquæ sunt igneæ in ha-
licus dissipatæ aut exsiccatæ, in quibus leniendi vis inest,
dissipantur.

91. In Catholico medicamento non est cum folia senæ excipiantur aliquis folliculos indat, cum ij vel fructus sint, vel seminum receptacula, neque aquæ ac folia purgatricem habeant facultatem; neque etiam æquis portionibus cum foliis, quod aliquibus ob aliqualem, qua pollent, adstriktionem, indemus; sed folia senæ: quæ cum benè mundata postuler Nicolaus, nobis insinuat festucas, & pediculos omnino esse eximendos iuxta doctrinam Gal. 4. de san. tuenda, vbi de Diacalamento agit, & primo de Antid. cap. 24. vbi si folia vel absolute herbam aliquam elegerit quis in compositis imponendam, folia imponenda censuit à pediculis mundata; vt & vbi semina, & radices nominantur, folia non erunt indenda, vt propterea in hoc medicamento, & folliculi sint submouendi.

92. Cum octo vncias cassiæ fistularis mundatæ posuerit. Nicolaus, non censeat quispiam extractam pulpam ex fistulis esse ponderandam cum seminibus, & tabellis; sic enim mundata non esset mensurata, neque debita quantitas illius imponeretur, Sicut nec placet opinio eorum, qui sublatis ossiculis illam mensurant cum tabellis, à quibus postea dissoluta cum syrupo ex polypodio, per setaceum ea traducta conantur expurgare, sic enim non octo vncias medullæ cassiæ inderentur.

93. In rhabarbari trituratione & in hoc medicamento, & alijs video adeò dissentientes sententias, an crasso modo, an subtiliter, an potius mediocri trituratione vtendum sit, quibuslibet suam sententiam ex Galeni verbis, ex Mesuci, & ex recentioribus, confirmantibus; vt necessarium sit breuissimè hac in re meam proferre sententiam: ne tanquam in salo hæreant pharmacopolæ: sed si substantiæ modum varium, si illius facultates diuersas, si vtendi modum, si finem medici, in illius vsu considerauerimus, fortasse non ita difficili negotio veritatem eruemus. In varietate modi substantiæ variandum esse modum triturationis docuit Mesus in capite de trituratione: postquam de scammonijs va-

In Catholico per se nam folia sumenda non folieu li.

Cassia in Catholico mundata indenda.

Rhabarbari triturationis quo varianda.

ria trituratione pro varietate modi substantiæ differuisse
de rhabbarbo variè etiam triturando loquitur, in fine cap
tis; dicens rhabbarum optimum solidioris substantiæ, su
tiliter puluerizatum vegetius in purgatione esse; at si leu
& laxum ita trituremus, pene omnem purgatricem facu
tatem amittere. Si præterea facultates in eodem varias pr
varietate partium, quibus constat, considerauerimus, va
riandam quoque esse illius triturationem dicemus. si enim
igneas partes extrahere, & illis frui velimus, subtiliter eri
puluerizandum; at austeris, & terrestribus, & circa ven
triculum, & intestina crassiori modo triturabimus. Si præ
terea masticando in vsum ducetur, cum passulis, cum mas
ticatione illa, & calore oris igneæ partes purgatrices, &
per subtilitatem partium deobstruentes, à terrestribus, &
subadstringentibus segregentur; incidendum potius erit,
aut certe crasso modo triturandum; at si per infusionem
erit exhibendum, aut minutim incidemus, aut crasso mo
do triturabimus, ne, si subtiliter puluerizetur, ad vias vri
nae potius materias conducat, & igneis partibus ardorem in
renibus & vesica inducat. Quod si varios medicorum fines
in illius vsum perpendamus, vario etiam modo triturandum
esse cognoscemus: si solo utamur ad roborandum, exsiccand
um ventriculum, & attenuandas subducendasque adhar
rentes materias, vt aliquandiu ibi commoretur, non tritu
rabimus, sed minutim incidemus; si ad roborandum, &
excalesciendum hepar obstructionsque in eo consistentes
tollendas concedatur, mediocriter erit triturandum. at cum
in compositis ad euacuandos humores inditur, vt in hoc
Catholico, mediocri trituratione opus est, ne si subtilissimè
puluerizetur, ad alium & intestina materias nō ducat bilio
sas & calidas, sed ad vias vrinae. At si deniq; eo utamur ad
tollendas obstructions in venis consistentes, & per vias
vrinae deducendas, tanquam per commodiores & magis
conuenientes partes, vt fit in malo corporis habitu, & ali
quando in hydropo, vel anasarca, cum Trochiscis de rha
bar-

barbato, de eupatorio : in similibus ego in eam venio sententiam, in eo casu, & compositis illis, in tenuissimum pollinem esse deducendum rhabarbarum. Harum differentiarum causas ex ratione non solum quis deductas censeat, sed ex ipsomet Galeno tum 4. de sanitate tuenda, cum in Diapsolitico explicando de cumini trituratione agit, tum cap. 13. lib. 1. de simpl. med. fac. & Mesue in viuuerfalius cap. de trituratione.

94. Per quatuor semina frigida, quæ in hac compositione requirit Nicolaus, ne quispiam censeat minora indenda esse, cum mundata requirat à cortice, quorum tamen nullus est cortex: cumque ex scriptoribus nullus de seminibus minoribus frigidis agens dictionem illam addiderit, ut in maioribus additam plerunque videmus.

95. Hæc in mortario super papyrum sæpius mutatam trituratione, ut alias dictum est, & per setaceum traducta, vel per se, vel cum portiuncula decocti polypodij optimè ad huius compositi constitutionem concurrent. si enim cum rhabarbato & saccharo cando conterantur, & rhabarbari triturationem impediunt, & ob oleoginosam substantiam periculum inducunt, ne compositum situm contrahat.

96. Potissimum si singulorum vnciam, ut communis ferè omnium auctorum est sententia, indamus, quicquid scioli quidam contra sentiant, singulorum drachmas duas solum admittentes, & vnciam ex singulorum drachmis duabus constituentes.

97. In polypodij decocto pro syrupo parando cum saccharo, qui fundamentum est huius compositionis; quoniam video potissimum in quantitate, aquæ dissentire, neque ab auctore quantitatem esse determinatam, sed additum solum quantum sufficit, neque decretum quanta aquæ quantitas per elixationem sit absorbenda, cum aliquos viderim ad libram polypodij elixandam quinque libras aquæ solum addidisse; placuit etiam aliquid hac de re annotare.

Per Semina quatuor frigida, maiora intelligi debent.

Semina frigida quò triturada.

Seminum frigidorum in Catholico quantitas.

In Polypodij decocto parando quæ aquæ quantitas indenda.

Polypodium cum dura sit ac lignosa radix, adeo longam sustinet coctionem, vt, si longa elixatione virtutem in timioribus partibus constitutam in aquam educere tentemus; ad huc in fine, solidiorem illius substantiam experimur. Propterea pro decoctione hac paranda, contusa modiciter hac radice, libram illius in duodecim aqua excoquemus ad sex librarum consumptionem: mox octo libras sacchari addemus ad syrupum parandum ad spissitudinem mellis: indeque paulatim pulsam illam cassiae, ac tamaridarum superaddemus, semper spatula admiscentes igni leni simul apposita; & leui facta ebullitione, vbi refrigerint pulueres addendi erunt senae, violarum, & rhabarbari, atque ad electuarij consistentiam mediocrem reducemus.

Manna in
elect. rosa-
to an eli-
xanda.

98. Electuarium Rosatum descriptionis Melusae incho-
Cholagoga primum sibi locum meo iudicio vendicauit. i-
eius compositione video diligentiores hesitare, quod man-
nam cideant excoqui in succo rosarum ad lumen clarum
ignis, qualis est candelae, donec succus cum saccharo &
manna in syrupum euaserunt ad spissitudinem mellis; quo
mannam censeant non admittere elixationem, ob tenuita-
tam substantiae, ob quam per elixationem virtus soluen-
mannae hebetari videtur, dissolutis aereis illis partibus in
quibus euacuandi vis reposita est. ob hanc enim causam
scimus Galenum 6. de compos. medic. sec. loc. crocum &
myrrham non debere excoqui, scripsisse; ne resolutis te-
nibus & odoratis partibus vires amittant. sed non anima-
duertunt, res illas voluisse Galenum in fine coctionis in-
poni, vt facile cognoscatur, non omnino illas a coctione ex-
cludi, sed a longa elixatione. sic mannam admitti ac
coctionem Melusae in confectioe Hamech, in electuario de
psyllio, in confectioe de manna, quin lib. simpl. cap. 8.
coctam magis soluere scribit. Sed verissimum est, mannam
in principio decoctionis succi rosarum, dum addito saccharo
paratur forma syr. ad mellis consistentiam, non esse im-
pendendam; sed in fine decoctionis, quo tempore si addatur,
facil-

acilius syrupus mellis consistentiam acquireret, & manna
iam conseruabit integram euacuandi facultatem.

99. Eandem; sed non ob eandem causam, difficultatem
habent de scammonio. Experientia enim compertum est,
elixetur, conglobari, & in grumos coire: quod si euenerit
in componendis medicamentis, in illud incidemus incom-
modum, ut parte vna medicamentum vehementius soluat,
quam altera; non æqualiter per omnes partes distributo
scammonio. Ut propterea Iacobus Syluius 2. lib. suæ Phar-
nacopæ non in decoctione scammonium ponat, sed cum
ulij pulueribus post præparatum syrupum, secus atque in-
stituerit auctor. sed si obseruauerimus, quæ à Nicolao scri-
pta sunt in electuario frigido secundum Coplionem, ab
Arnaldo Villanouano in Antidotario, in electuario psylliti-
o, à Ioãne Costeo, tum & ab Ouiedo in hoc electuario ex-
plicando: facile cognoscemus incommoda illa posse euitari
& modum componendi Mesuei seruari, si in hoc electua-
rio parando, in quo manna excoquenda præcipitur, ut in
confectione Hamech, electuario de psyllio, & de manna;
scammonium ex arte benè contritum, in parte aquæ aut li-
quoris excoquendi, ut in hoc, in parte succi rosarum frigi-
li dissoluamus, & dissolutum diligenter manibus perficiæ-
mus. sic enim in liquorem euadet lacti similem qui si sac-
charo iam in succo rosarum dissoluto addatur, etiam si
inul cum syrupo illo elixetur, non amplius in grumos
nietur, & vniformem reddet compositionem. At si quis
obijciat scammonium hic à Mesueo requiri Antiochenum
dest perfectissimum, quod in Canonibus, capite de tritura-
tione docet non esse subtilissimè conterendum, ne ignee
artes, in quibus vis inest purgatrix, euanescent: quam-
b rem cum crasso modo contusum pro purgante in vsum
enire debeat, si eo modo excoquatur, non poterit ita in
lixatione dissolui, quin vniatur in grumos, nisi subtilissimè
uluerizatum, & succo rosarum admixtum elixetur. At ob
ancipfam causam dissolutum in succo diximus diligen-

Scammo-
nium an
elixari pos-
sit.

ter manibus esse perfricandum, ut quod crassioris est substantiæ dissolui queat. At, inquiunt alij, sic dissoluto in succo admixto, & elixato posse Pharmacopæos nobis imponere, quod nec tactu nec visu cognosci possit, positum esse in compositione: & propterea laudant potius Sylui consilium, qui scammonium in succo illo cum saccharo non coquit, sed alijs pulueribus additum in fine admiscet. Sed difficile est omnes malorum insidias euitare: bonis non artificibus & medicis hæc scribimus: & nobis satis est docere, quomodo compositio hæc præparari possit eo modo quo ab auctore nobis est tradita, & quomodo incommoda illa, quæ difficultatem faciebant possint superari.

Trochisci
de spodio
siue s. acetosæ
inden
di.

100. Per Trochiscos his de spodio intelligimus, non qui secunda descriptione dicuntur Trochisci de spodio cum feminibus acetosæ, ut quibusdam placuit; sed qui in prima descriptione traditi sunt, qui simpliciter Trochisci de spodio dicuntur.

Galia moschata
in elect. Rosato
inden
da.

101. Cum Galliarum quatuor species constituentur ut in sectione de Trochiscis videre est, diu multumque dubitatum est, cum in hoc electuario Galliam imponendam doceat, quamnam indenda sit, an Moscata, an Alefangina: alijs moscatam, alijs alefanginam asserentibus, qui tamen nullis rationibus suam firmannt opinionem: & propterea aliqui asseruerunt ubicunque absolute sine specificatione vnius aut alterius Gallia ponitur, ad libitum posse non alterutram imponere: cum enim alteram ex ijs eligendam auctores censent, se ipsos, addendo moscatam, aut alefanginam, explicant; at ubi nihil referre cognouerint, utram illarum indamus, absolute sine specificatione Galliam ponunt. Ego vero, ut uniformiter Pharmacopæi meae prouinciæ subditi in componendis medicamentis procedant, grauissimorum etiam virorum fietus auctoritate, Patrum Mesuæ commentatorum capite primo de Trochiscis Iacobi Syluij in explicatione obscurarum vocum Mesuæ Brasauoli in examine electuاريorum, & aliorum plerorumque

que Italorum, & Germanorum, tum & ratione, centio Moscatam eligendam esse, tum quod ut nobilior primo loco est. à Mesue descripta; quod vero absolute profertur, per antonomasiam semper de nobiliori intelligitur; tum quoniam, cum compositio hæc sit ex inuentione Mesuei, cum Galliam simpliciter profert, intelliget Galliam illam, quæ etiam suæ est inuentionis, qualis est Gallia moscata: alefanginam .n. ibidem docet antiquiorum esse inuentum.

102. Aberrant præterea non parum Pharmacopei illi, qui ut aptius habeant hoc medicamentum, ad formandas pilulas aggregatiuas, liquidius, illud minus excoquentes, syrupum cformant: non animaduertentes corrumpere eos formam, ut accidenti succurrant. Mesueus voluit syrupum illum ex succo rosarum, saccharo, & manna eo usque coquendum esse, ut mellis obtineat consistentiam, ipsi liquidum adeo formant, ut electuarij non habeat consistentiam, non animaduertentes scammonium, cum leuiorem habeat substantiam superiores partes petere; potissimum si, ut multi faciunt, cum alijs pulueribus in fine apponatur; sicque non æquè omnibus partibus facultatem tribuet purgatricem.

103. In electuario de succo rosarum Nicolai, cum auctor Diagridium imponendum scribat, nescio quid in mentem venerit diligentissimo Ouiedo, cum scammonium non in citonio præparatum, sed simplicem succum nempe plantæ illius lacteum sole condensatum potius indendum voluit. ut enim illi & Ruellio lib. 3. de natura plantarum cap. 148. concedamus aliquibus antiquis aliquando Diagridium dictum fuisse scammonium ut libro de Dinamidis Gal. tributo cap. 9. de simplicibus ad Paternianum cap. 249. & alijs aliquibus barbaram sectantibus medicinam; verum tamen est, antiquos nunquam pro scammonio Diagridium sumpsisse; quin si illi recentiores de scammonio agentes Diagridium appellarunt, id fecerunt, ut intelligeremus vix unquam scammonio utendum ob vehe-

Rosarum
Mesue nō
sit nimis li-
quidum.

In Elect.
de succo
rosarum
indendum
diacridiū,
non scam-
monium.

mentiam, nisi cotoneo coctum esset praparatura. Quo modo correctum huic medicamento imponendum censeo, si non alia ratione, saltem ob multam quantitatem illius in eo positam.

104. Spodij loco hic non Græcorum Spodium metallicum imponemus. Sed Arabum ab Auic. traditum; lib. 2. Tract. 2. c. 617. & Serap. lib. simpl. c. 242, ex radicibus cannæ crematis; vel Platearij. ex ossibus elephantum crematis, vel antispodium Dioscoridis.

105. In electuario Indo minori, quod apud nos solum est in vsu; illud solum est animaduertendum, cum sacchari fini drachmæ centum ingredientur, cum mellis quadruplum ad pulueres ad formandum corpus electuarij. ex arte sumi debeant, tantundem mellis, quantitate demendum esse, quantum sacchari mensura pendet, ne impotens nimium reddatur medicamentum.

106. In Benedicta laxatiua siue Nicolai, siue Villanouani, illud solum annotabo; nonnullos, quod supponat solum in vsum venire in clysteribus, censuisse non esse multum trituranda ingredientia, quod eorum vires non altius penetrare debeant, sed crasso modo. Imo eo vsque pharmacopæorum aliquorum progressa est auaritia, ut ob hanc vnam causam censeant non necessarium esse delectum eorum, quod per sedem solum iniiciatur. Quasi vero etiam per sedem iniicienda, perfecta, incorrupta, & selecta esse non debeant: cum ex malis aut vitiatis simplicibus ingredientibus damna producantur maxima, & dolores sæpe intolerabiles, Sed præterea reprehedendi sunt in eo, quod supponant per os non exhiberi, cum ad subducendos crassos humores, & ab obstructione liberandis renibus, & in nephriticis doloribus per os exhibita commendetur, & apud nos sapissime hoc modo vsurpetur.

107. In Dialena cum serici vsi drachmæ duæ indantur, vel cremandum erit sericum vt ex Galeno iam docuimus in lana 11. simpl. cap. 25. aut, cum Auic. doceat ea solum ratione

Sericum
in Dialena

LIBER IX.

145

ratione sericum aduri, vt trituratione in puluerem reduci possit, alioqui non crematum melius corroborare, siue hac adustione ita in puluerem reduceretur, si primo forcipe minutissimè globuli intima superficie, & vermiculo expurgati, in mortario diutius conterantur, & per setaceum traducantur, iterumq; crassior ille puluis ceteris trituralibus admisceatur, & iterum simul trituretur: sic enim sine adustione in puluerem reduceretur.

108. Pro lapide Armeno, quo hoc tempore omnino carēmus tantundem lapidis lazuli substituimus loti, cuius lotio quomodo sit facienda iam docuimus ex Mesueo lib. simpl. c. 28.

109. Non solum saepe mirari contigit tot tamq; varias Hierarum descriptiones à Mauritanis scriptoribus, & à recentioribus barbaram sectantibus medicinam inuectas fuisse; sed in Hiera, Picraue Galeni describenda cecutisse, & ab in uetore Andromacho, Archigene, Themisone, quin ab ipsomet Galeno, cui illam acceptam referunt, illiusque nomen adiungunt, adeo discrepasse. quorsum enim addere, vel demere quicquam attinet, quando Galeni nomine, & auctoritate celebratam iri volumus? Alias non Galeni, sed Rhafis, Serapionis, Auicennæ, Mesuci, Præpositi, Arnaldi, Placentini, aut aliorum esse dicatur. vbinam carpopalsamum, xyloaloe, cassiam aloë admiscuisse in sua picra Galenum inueniemus? vbi absinthium, violas, agaricum, Turbith, in suum medicamen adiecisse videmus? Deniq; vbi duplum ex aloë pondus tantum apposuisse inueniemus? turbidis igitur riuis omiſſis ex vero fonte quæso hauriamus.

110. Aliquam quidem video in pondere potissimum aloes decernendo diuersitatem. Siquidem aliquando illius solum drachmas nonaginta imposuisse visus est, vt lib. 2. de compos. med. sec. loc. cap. 9. vbi agens de cura doloris capitis per consensum ventriculi proposita compositione Hiera picræ ex centum aloes drachmis, & sex aliorum

cremandum, vt tritulari queat, vt lana apud Gal. 11. simpl. 25.

Pro Arme
no lapide,
lapis lazu
li.

Hiera
Gal. vera
quæ,

Hiera
Gal. ex
quot dra
chmis a
loes cōsta
re debeat.

K

sex

sex aromatum, videtur magis eam commendare, si sex nonaginta drachmis solum aloes componatur, quinque croci, aut etiam quatuor, & sex aliorum quinque, & ea ipsum scribit potius vii. At septimo Meth. cap. 11. eam maxime commendat Hieram, quæ ex centum drachmis aloes constat, & sex aliorum aromatum ad roborandum ventriculum laborantem, & materiam in eo contentam attenuandam & euacuandam. Hancque 6. de Tuenda val. dicit esse, quæ passim in pharmacopolijs Romæ parata suo tempore conseruabatur: quam etiam tanquam meliorem recipit 8. de compos. med. 5. loc. c. 2. vbi licet aliquando in usum traducendas iubeat aliquas Hieras cum octo aginta drachmis aloes, aliquando cum centum viginti, pro varijs medicis indicationibus; in fine tamen magis eam commendat, quæ ex centum aloes, & sex aliorum componitur. Hanc etiam magis recipit lib. de sang. missione per sectam venam, cap. 17. hanc tanquam Galenicam commendat Oribasius agens de promouendis mensibus. Paulus lib. 7. cap. 11. Alex. Tralli l. 7. cap. 10. Actuarius cap. de purgandis humoribus, & ante eum Aetius lib. 6. cap. 10. ex Themisone eam prædicat & cap. 45. tanquam Galenicam approbat, vt & lib. 9. c. 10. Et si consideremus locum Gal. 2. de compos. med. sec. loc. c. 9. vbi sibi magis placere videtur asserere hieram hanc picram cum nonaginta aloes drachmis, & quinque aut quatuor croci, & sex aliorum, eaque ipsum maxime vii solere; facile cognoscemus non ita nobis aduersari, si scopum Galeni eo loco considerabimus: curabat ibi capitis dolorem ex consensu ventriculi repleti multa cruda materia; verebatur ne crocus in ea quantitate caput iam affectum & laborans offenderet, minuit propterea croci quantitatem; & cum maxime crudi illi humores attenuatione indigerent, quinque alia aromata in sua quantitate sex drachmarum relinquit, proportionem vero quadam ad diminutam croci quantitatem aloes mensuram imminuit. Illud tamen pro certo ex eius sententia

omnino

Species in
hiera quò
mixturada.

cratium reserendum, ex centum drachmis aloes, & sex
alio rum fixarum, hanc compositionem esse para-
dam, et in passu illis in locis, ta sentiat.

111. Annus est, quando præterea aliquam subesse posse
difficultatem in præparanda præparazione, cum n. sapissimè
in vsum veniant: a. roborandum ventriculum, & attenuan-
dam, & lucidamq; materiam in ventriculo consistentem
in præparando, & in modum præparandam aut commu-
tandam, & 7. Metam. med. docuit, & 2. med. local. c. 9.
et si in præparazione opus esset, sed cum ad vinas promo-
uendum, & multis duobus in vsum ductis, subtilissimè
efficitur, ut de hiera Thompsonis docuit Gal. 3.
de comp. med. local. cap. 3. & lib. de cur. rat. per sang.
mil. cap. 17. ne ergo seplasiarij duplicem hanc formam
speciem hære præparatam tenere græpentur, censeo ad ma-
nus paratas habere debere crassissimè paratas; quas ubi
medicus in vsum traducere velit ad lotium vel menses pro-
mouendos, statim in pulvere tenuissimum traducere poterit.

112. In pilulis Alefanginis multa sunt, quæ omnibus, &
medicis, & seplasiarijs non parua fecerunt difficultatem: &
primo cum in aromatum prima illa decoctione quamplura
decoquantur odorifera, cortices, ligna, semina, fructus,
radices, folia, & flores, an omnia simul imponenda sint;
an potius gradatim vnum post aliud, à lignis, corticibus,
& radicibus exordiendū ad semina, folia, & flores sit descen-
dendum iuxta ea, quæ à Mesuico in Canonibus tradita sunt,
& à nobis in prima parte huius libri. Scio Bratauolum,
Calestium, & plures, graduatam hanc decoctionem aro-
matum requirere; & in ijs componendis pilulis cum vi-
deant Mesuicem nullam huiusmodi decoquendi mentionem
fecisse, sed simul omnia excoqui mandasse, ad suam tutan-
dam opinionem dicunt, satis esse, si semel in vniuersalibus
decoctionum modos tradiderit, nec videri necessarium in
particularibus ea repetere. Ego verò cum Mesuici verba
considero, nullo modo graduata hac decoctione vtendum.

Species in
hiera quo
trituradæ,

In alefan-
ginis pil.
decoctio
non gra-
duanda.

cenſeo; ſed omnia ſimul eſſe excoquenda. ſic. n. habet anti-
 quus interpres, qui ex Arabico traduxit. Terantur contritio-
 ne groſſa, & fundantur ſuper ea aquæ libræ xij. & coquan-
 tur, vſque ad conſumptionem duarum tertiarum. Si enim
 ijs craſſo modo contuſis ſuperinfundenda eſt aqua, nullus
 datur graduationis locus. Sed quod omnem tollit difficul-
 tatem eſt, quod Lampon Peluſiota, cilius nobilem mentionem
 fecit Galenus tum 2. de compoſ. med. local. 3. tum. 8.
 eiſdem cap. 2. à quo quibuſdam mutatis video Meſuem
 ſuas deprompſiſſe, dum aromata fere cadem in aqua exco-
 quit, vt decocto illo imbuatur aloe, ſimul omnia in aqua
 excoquit. & forte ſi intimius rem perſequentemur, non erit
 modus decoctionis omnino à ratione alienus. cum enim ea,
 quæ hic elixantur, etiamſi diuerſum habeant ſubſtantiæ
 modum, duplici conſtent facultate, ignea vna in ſuper-
 ficie poſita facile exhalabili; altera terreſtri, ſubadſtringen-
 te, & corroborante in centro conſtituta: Lampon & Meſue
 prioris illius non multum habita ratione, alteram conati
 ſunt longa ebullitione extrahere, & curare vt aquæ com-
 municari poſſet, vt in aloe excipi poſſet; vt hoc modo
 præparata minus ſoluere, & magis ventriculum robora-
 re poſſet. id vero melius obtinere poterant, ſi ſimul exco-
 querentur, vt eorum omnium viribus inæqualibus vnitis
 mixta quædam facultas progigneretur, quæ melius indi-
 cationi illi curatiue ſatisfacere poſſet.

Aquæ
 quantitas
 adhibenda
 in deco-
 ctione pil-
 aleſangi-
 narum.

113. In eadem pilularum præparatione illud etiam eſt
 perpendendum, quæ aquæ quantitas pro aromatum ea
 elixatione ſit ſumenda. quæ enim quantitas à Meſueo
 proponitur, librarum duodecim pro 136. drachmis aroma-
 tum excoquendis nimis multa videtur. quamuis enim
 roborans hæc facultas in ijs medicamentis conſiſtens non
 ſuperficialis ſit, cum in centro reſiſta ac inde longiori, vt
 aquæ cõmunicetur, indigeat coctione vt extrahi poſſit; tan-
 ta tamen non eſt, vt maiori indigeat aquæ quantitate, &
 longiori coctionis tempore, vt extrahatur virtus, & aquæ

com-

communicetur, quam res aliæ solidioris substantiæ, quales sũt maiori ex parte radices, & ligna, aliæque & firmioris sunt substantiæ, & in centro repositas habent facultates. In more autem positum est maiori ex parte pro libra puta radicum sex aquæ libras ponere, atque tandiu excoquere, quandiu medietas absumpta sit. Cum igitur hic res habeamus maiori ex parte minus solidas, minusque compactæ substantiæ, etiam si non superficiarias, sed intimiores, & in centro repositas virtutes extrahere curemus; non videtur maiori opus esse quantitate aquæ, neque longiori coctione. propterea pro drachmis centum triginta sex horum aromatum excoquendis, cæserem satis esse libras sex aquæ, atque dimidium illius coctione esse absumentum. hoc enim modo magis ad illam elixandi rationem accedimus, quam radicibus plerumque conuenire dicebamus; ac ferè imitabimur excoquendorum aromatum rationem, qua in suis efformandis pilulis vsus est Lampon ille Pelusiota apud Gal. 8. de comp. med. local. cap. 2. & 3. à quo suas has desumpsisse Mesuem crediderim, cum in aromatibus multum excoquendis, in eisdem seligendis, in aloë lauanda & nutrienda, in modo componendi, & in vtilitatibus videam in paucis vtrunque dissentire; cum sextarij illi tres aquæ, quos pro 140. drachmis aromatum elixandis sumit Lampon, si variæ sextariorum mensuræ rationem habere voluerimus, paulo minus sex librarum mensuram suppeterent. quam etiam aquæ quantitatem in hac decoctione à plerisque receptam esse obseruauimus. quæque ad dimidias etiam absumpta, si aloë superinfundatur in diebus canicularibus, non adeo difficili negotio ab aloë excipietur neque tam longo tempore indigebit, & ad imbibitionem, & absumptionem exsiccationemque.

114. Quamuis autem ex dictis tolli possit difficultas, quæ grauissimum virorum animos iamdiu torset, quomodo & Lampon & Mesue dici non debent regulis, & ab ipsis traditis, & à nobis explicatis aduersarij, quibus ex

Aromata
in decoct.
alefangi-
narũ quò
tamdiu co-
quantur.

communi omnium sententia confirmata, & faciens de-
 coctionibus illud esse obsequium, ut crassa & solidiora
 corpora multum infundantur, & multum coquantur; aro-
 matica vero, & flores parum: cum clavis varietate hic a-
 ctor in decoctione horum aromata sit, & illa pro huius me-
 dicamento præcepit esse faciendam. Quam in qua tem ex
 sex libris aqua ad consumptionem medietatis, & sic au-
 tem ex duodecim ad duarum tertiam consumptionem,
 ita ut manifestè videatur recte esse receptis, & præ-
 ceptis traditis. Brasavolus duplici datur resolutione conari
 huic difficultati satisfacere: prima methodus fuit Mesue,
 & optimis quibusque scriptis, ut ubi semel trahe-
 runt præceptum aliquod, non amplius reperiunt, sed illud
 supponant; & propterea in ista compositione Mesu-
 supposuisse decoctionem aromatum sed habere secundum
 autem semel ab ipso tractatam; ut scilicet primo crassiora
 infunderentur, secundum mediocria, & tertio tenuia, atque
 idem in decoctione succurrant. Quæ quidem etiam suas
 habet difficultates. Iam enim quantum est, & tam onem,
 & Mesueum omnia illa videri nec graduata decoctione
 excoxisse. præterea vero de ingrediensibus illis nullum esse
 durioris substantiæ, agaloch excepto: florum autem con-
 ditio, ut rosarum non multum distat à cæteris aromaticis.
 Placet igitur magis secunda resolutione. Idem, aromata si
 tenuiter contrita fuerint, ad igneam & æreas partes extra-
 hendas leni citatione esse convenientes; ac si crasso modo
 contrita fuerint, ut terrestres partes, & volantes extra-
 hantur longam admittere posse decoctionem. Accedit
 (quod non videtur à quoquam minui debere) in Mesuei
 descriptione his Mesuei semel, semel etiam in maiori
 quantitate, & eundem quidem finem robora i ventriculi;
 si sunt etiam cum gummatum quæ per se ex Gal. 5. med.
 loc. 1. & 2. per sem. 9. excoqui non debeant, hic illam
 cum alijs aromaticis excoqui dam apponit; ut sua glu-
 tinositate, & obsequio officate quam supernatans exhalationem
 subti-

subtilium partium aliquantisper reprimeret. addit postea etiam pulverizatam, vt roborandi vis, quæ elixatione erat imminuta, adaugeretur. Sed doctissimum Mercurialem video aduersus hanc responsionem disputantem lib. 3. de compos. med. cap. 10. ijs verbis: Si aromata crasso modo siue subtiliter contusa accipiantur, facultas ipsorum semper posita est in partibus tenuibus, quæ facile destruuntur ex multa coctione, ita vt non minus offendantur facultates aromatum, si crasso modo sint contusa, quam si subtiliter: attestatur quotidiana experientia, quia si coquamus piper, aut cinnamomum, vel garyophyllos, ad minimam quamque coctionem, videmus statim aquam infici odore & sapore horum aromatum. imo vero si rationem Auenzoar, & Auerrois insequi velimus, non essent vlllo modo aromata terenda: etenim Auenzoar lib. 1. Tract. 16. c. 6. & Auer. lib. 5. cap. 31. loquentes de modo conficiendi aquam hordei, præcipiunt, vt caueatur ne grana cunterantur; eo quia si faciendum est decoctum optimum & infusio, inquit, debere grana illa trahere in sese aquam, quod non possunt, nisi viuida sit eorum facultas attractrix, quam, inquit consistere in totalitate, & continuis partibus granorum: quare si contundantur, facultas attractrix labefactatur. qua offensa non potest attrahi aqua à granis, & propterea non fiet optima coctio. quod autem à coctione facultas attractrix diminuatur, atque etiam extinguatur probant, quia grana, quæ mandantur terræ contusa sunt inefficacia, vbi vero sunt solida nascuntur: vnde colligitur, in fractis abolitam esse facultatem, in integris conseruari. Hac igitur grauissimorum virorum auctoritate sustinere possemus etiam in decoctis faciendis potius aromata integra esse coquenda, quam vlllo modo fracta. Hactenus Mercurialis. Verum cum ipse passim profiteatur potissimum lib. 3. ca. 13. aromata vix admitttere decoctionem; quod aromaticæ, odoratæ, & igneæ partes ex longiori ebullitione euanescant, quomodo in de-

coctione hac, & Lamponis, & Mesuei, illud ipsum incommodum effugiat non satis video; porissimum cum aduersus Brasaiolum asserat quomocumque contrita fuerint aromata, si diutius decoquantur, vires suas amittere, ac in nihilum abire; postea verò in decoctione hac aromatum ad dimidiæ aquæ consumptionem excoquenda esse docet, neque rationem reddit cur id sit faciendum. Exemplum autem ex granis hordei decoctis desumptum, & impropotionatum est, nec sapit philosophum naturalem. quæ enim proportio esse potest inter grana hordei & cortices, ligna, & flores, & similia? inter rem, quam coquimus, vel ad alimentum, vel ad refrigerandum, & ea, quæ coquantur, vt igneis partibus absumptis terrestres cum aliquo calore ad corroboracionem extrahi possint. sed præterea video principia naturalis philosophiæ destruere, atq; attractricem facultatem, quæ altrici aut vegetanti facultati inferuit, granis hordei, quæ coquantur, tribuere; quin, & corticibus, lignis, & alijs iam mortuis tribuere. cum aromata integra potius excoquenda censeat, vt facultas eorum attractrix integra remaneat; quasi & cinamomum, quod cortex est iandiu exsiccat, ligni aloes fragmenta, cubebe, macis, cariophylli, vegetantem adhuc facultatem retinuerint, & subinde attractricem, & si Deo placet facultatem generandi sibi simile. Censeo igitur in his componendis pilulis discedendum à communi canone, & hanc esse exceptionem in particulari hoc casu, quia non igneas illas in decoctione ea exposcebant partes, sed terreas, roborantes cum mediocri calore, quod proculdubio ex decoctione hoc modo facta obtinere poterant.

Suco trina
aloe quò
lauetur in
alefangi-
nis cum id
ei neget
conuenire
Diosc.

115. In finis huius decoctionis confirmationem quod .s. facta sit ad roborandum ventriculum, asserere possumus aloem; quam siue Indica sit, vel succotrina, quod purissima sit, arena, saxis, & lignis carens, sine lotionem in vsum duccendam esse præcipit Diosc. & Mesuei, cum eam sepius aqua pluuia abluendam, & sole exsiccamam præcipiunt, quod

non

non alia ratione factum censendum est, quam ut subluendi vim imminuerent, & roborandi facultatem augerent atque exsiccandi: quod in lota aloë contingere docebat Gal. 7. Meth. med. & 8. de compos. med. loc. c. 2. aqua autem pluuia potius lauandam censuerunt, quod abstergenti facultate magis sit prædita, tum exsiccanti, & attenuanti. & quod hoc verum sit quilibet colligere poterit ex Galeni discursu. 8. local. c. 2. vbi comparans hieram Andromachi & medicamentum Lamponis dicebat, ad exsiccandum & purgandum præstare hieram Andromachi, ad siccandum sine purgatione melius esse medicamentum Lamponis.

Scio hic multos, ut quantitatem aquæ à Mese præscriptam obseruent, & duo incommoda inde proueniëntia effugiant, nempe longam illam aromatum elixationem, qua lento igne ex libris duodecim aquæ octo absumuntur, & ne, dum dimidium superstitis decoctionis aloë pro imbibitione superinfunditur, altera pars corrumpatur, quod in canicularibus diebus facile contingit; dimissis aromatibus, & bipartita aqua duplici decoctione rem hanc transfigere: sed præter auctoris mentem, tum etiam contra rationem; quia iam docuimus in decoctionibus, ut aquæ virtus rerum decoctarum communicetur, non solum quantitatis aquæ habendam esse rationem; sed maximè longitudinis, & breuitatis temporis, & durationis illius actionis; quod longiori tempore facta ebullitione melius communicentur facultates medicamentorum aquæ; sed verò etiã quantitas maior medicamentorum unita magis imprimit vires suas aquæ, quam minor, quantumcunque, & aquæ & temporis seruetur proportio. propterea, si quis quantitatem Mese sequi vellet, potius consulerem, ut duabus ex quatuor superstitibus libris aquæ prius affusis, duæ aliæ in vase strictoris conseruarentur superinfuso oleo, & in loco frigido conseruato vase, ut prima absumpta reliqua superinfundi denuo possit. quod etiam ab ijs fieri debebit, qui ex Lamponis

ponas & nostro præcepto sex solum aquæ maris assumptis
& dimidio absumpto decoctionem hanc parant. Nec
enim placet, quod ab aliquibus præcipitur, teras illa
tres libras vicea vice absumere, periculum enim immine
ret, ne ex longo in inbibenda temporis intervallo, aliqui
contraheret corruptionem: nec enim huic periculo o
curramus, si, ut alijs visum est, in vase multum expanso
& lato disperfas aloes sub arbori sole in diebus calidioribus
affundatur aqua, ut citius assumatur: id enim inbibitio
nis non erit actio, & effectus, sed absumptio à radijs sola
ribus facta; neque aloes vim illorum medicamentorum in
se trahet, aut concipiet, sed in insensibiles halitus tota illa
decoctio vi solis abibit, sine fructu conceptæ medicamen
torum facultatis. Neque ita facile id obtinere poterit, quod
ab eis expetitur cum insolario hæc aloes cum hac decoctio
ne fieri debeat superposito teraceo, quod adeo citam etiam
absumptionem retardabit, sicque corruptionis semper ali
qua supererit suspicio.

Alefangi
næ perga
menæ in
dita non in
uolucendæ.

Pil. ad ven
triculum
roborandū
minutissi
mæ sint.

In Aggre
gatis spe
cies multi
tudine re
rendæ con
tra Ouedu
dam.

116. Non placet, quod quamplurimis video esse fami
liare, pillularum harum vnitum corpus pergamenæ chartæ
oileo perunctæ inuolueri, ne nimium exsiccetur: contrahit
enim nescio quid oicoli & ranciidi magdalon, illud quod
effectibus proprijs harum pillularum immediate repugnat.

117. Pillulæ hæc, quod maiori ex parte ad roborandum
ventriculum instituantur, in minores globules erunt ef
formandæ, ut & quæ ex aloes lora, ex succo rosarum, &
quæ ex inuentione nostra rosatæ ad eundem usum institu
tæ sint, ut ab imbecillo illo calore actuari, & dissolui faci
lius possint.

118. In pilulis aggregatis, earumque materia tritu
rata video dissidentes uoculimorum hominum senten
tias. Brasauolus enim species subtilissimè triturandas cen
set, non minus quam in electuarijs, ut melius, & ad lon
gum quiora vires suas exerere possint. Quem eo titulo re
prehendit Ouedus, quod cum pilula maiori ex parte in
stitu.

truantur, vt craſſiores humores à longinquis partibus trahant, ideoque in ventriculo diutius retineri debeant; ſi ſubtiliter adeo earum materia trituretur, citius è ventriculo in inteſtina effluent, nec recte officio ſuo attrahendi craſſiora à longinquis fungentur. Sed non animaduertit iriſ, in multis fortaſſe nimis diligens, qualitatem triturationis, potius ex natura rerum triturandarum pendere, quam ex modo euacuationis, ſi canones Meſuei conſidere- mus, & quæ de trituratione colocyntidis, & rhabarbari, tum & quæ à Gal. ſcripta ſunt tum 4. de ſan. Tuenda, tum in lib. de comp. med. per gen. vt enim diutius in ventriculo moram trahant, & craſſa à longinquis euacuent, tum in craſſiores particulas materiæ contentæ in medicamentis referunt ſcriptores, ſed in formam potiffimum: ſimus enim liquidiora facilius effluere, & per aluum ſub- ſistere; mollia aliquanto tardius; ſolidiora verò diutius in ventriculo firmata, & à longinquis magis, & craſſiora trahere. Docet hoc Fuchſius 3. de comp. med. cap. 9. in incipio tractationis de pilulis; à medicis eas introductas ſerens, vt & facilius aſſumi poſſent, diutiusque in ven- culo contineri, vnde à longinquioribus humores attra- here poſſent. ob eorum enim duriciem tardius euacuatio- nem promouent. Vnde etiam ſi citius euacuatione promo- re velimus, & molliores reddimus, & minores mole- ramus, potiffimum ſi ventriculum debilem præ mani- ſ habuerimus; & è contra ſi & à capite, & à longinquis here craſſiora voluerimus, vt longiori tempore in ven- culo residentes melius id facere poſſint, craſſiores para-

Succi ab-
ſyntij, &
cupatorii
pro aggre-
gatiuis nō
liquidi, ſed
denſati ſūt
indendi.

ſolemus, & hanc ob cauſam catapota hæc iniunxit Me- ſueus in craſſiores globulos eſſe formanda; vt è contra aleſan- tia minutius efformari debere docuimus.

119. In iſdem tamen peccat idem Braſauolus, dum cum abſyntij, & cupatorii depuratum quidem ponit, liquidum, nec condenſatum, contra ea, quæ ipſemet do- agens de Trochiſciſt rhabarbari, quod vbi in compoſitis

succos

succos herbarum impositos in pauca quantitate viderimus, non liquidos indendos esse sed sole aut igne condensatos. quod etiam obseruandum monuit Fuchsius lib. 2. de compos. med. cap. 32. & Mesue in lib. simpl. de succo absinthij agens, & eupatorii, docet modum condensandi hoc succos sole vel igne, vt ijs in compositis suis vti possimus. Cum autem in his pilulis singulorum drachmas solum duas imponat, quis negauerit, condensatos potius esse imponendos.

Cocchiaz
picram Ras-
sis excipe-
re debere.

120. In Cocchijs parandis pilulis duo solum annotanda sunt; primum hiera picram, quam veluti earum basis ab initio imponenda præcipit, non Galeni picram excipendam esse, sed eam quam ipse Rasis descripsit non parum Galenica diuersam: & secundo, cum non doceat Rasis quo molli aut liquido exceptæ species in massam deduci debeant; cenfeo, aut syrupo de stachade, aut de absinthij species illas excipi debere.

In Agarici
pilulis qua-
le eligen-
dam.

121. Pilularum de agarico compositio hoc loco me inuitat ad signa tradenda, quibus bonum à malo; vel, vt melius dicam, recentem à veteri discernere possimus, cum multum id referat; quod recens humanis miserijs multis in rebus inferuiat, senescens autem venenosam contrahat qualitatem. vnde etiam crediderim euenire, vt nostris in temporibus illius operationes sæpenumero nostræ expectationi non respondeant, & eo assumpto non leues, ne parui momenti ventriculo succedant læsiones. Neque tamen nigredo in eo conspecta semper inueterati agarici signum est adeo certum, vt aliquibus visum est. si enim diutius truncis arborum adhæreat, sæpè talem colorem concepit; nullotamen modo in medicamentis, etiamsi recentis collectus sit, admitti debet, quod ex mora putredinis generat aliquod contraxerit. Neque etiam inueterati signum est si ad tactum puluere albo manus inficiat; cariem enim concepisse inde colligunt. at nostris ijs temporibus externæ cortice detracto, cum puluere agarici vndeunque aspersi perpositantur, quod curare pharmacopolæ appellant, non e-

quod

quod inde bonum aut malum esse colligamus. Senescen-
 is igitur, & venenosi est signum, si in substantia citrinum
 quendam colorem conceperit. Sed maxime si impressis
 digitis in agaricum ad aliquam illius portionem extrahē-
 lam, & contrectandam foueæ impressæ in agarico rema-
 neant. signum enim id erit absumptam omnem esse hu-
 miditatem, qua mixtione colligabantur heterogenea, &
 puluerem, ea absumpta & siccitate introducta, omnino esse
 penitum; cuius euidentius apparebit indicium, si pars aga-
 rici digitis expressa, atque compressa in puluerem abeat,
 non autem resistens compressa resideat; hoc enim humidi-
 tatem partes colligantem absumptam esse ostender. ma-
 lurum auersamur, longum, nigrum, grauem, succi plenu-
 rum, ac densum: bonum eligemus, fæminam, album,
 uem, friabilem, rarum, porosum, primo ad gustum dul-
 cem, mox subamarum.

Cum hieram picram in his, & in ijs quæ de rhabarbaro
 cunctur, ponat, uelim quempiam censere indendam esse
 hieram illam, quam ex inuentione nostra ab eo descriptā
 habemus; eoductus argumento, quod in cocchijs Rasis
 non hieram simplicem Galeni indendam censuerimus, sed
 eam quam idem ille Rasis descripserat. Solet enim Mesue
 assum cum hieram picram nominat, eam intelligere,
 eam duobus ijs nominibus Gal. insigniuit 2. med. loc. 9.
 eam autem hieram simpliciter appellat ex inuentione no-
 stra. sic per hieram picram Auic. Galenicam intellexit lib.
 Tract. 2. summa prima. & Serapio lib. de Anrid. Tract. 7.
 p. 9. Rasis autem seipsum explicat in cocchijs suam po-
 debere.

122. Parandas scribit pro viuione puluerum cum robub,
 quod rob dicitur: quæ duo nomina si adiungantur ali-
 i succo intelligi debet succus ille decoctus ad crassitudi-
 nem quandam: at si simpliciter rob aut robub reperiatur
 quod Arabes, intelligendus est succus uix maturæ; sicque
 hic intelligit hoc loco Mesue. Intelligendus autem suc-

Rob abso-
 lutè quid
 significat.

cus is coctus ad spissitudinem Sympliciorum ut leui illius portione species unire possimus; ne si coctione inspissetur magis, cum in eo casu maior illius portio necessaria esset, imminueretur pilularum harum facultas purgatrix.

Rhabar-
bary cle-
ctio.

123. In Pilulis de rhabarbaro aliquantulum mihi im-
morandum est, ut aliquod de eius basi rhabarbaro, quod in materia medica adeo frequenter in usum venire solet, annotare possimus. In colore, ait Mesue, subnigrum esse debere, rubescentem, quod de externa parte optime intelligit Mattheolus. quod vel ex sequentibus verbis colligitur, cum fractum ait ex rubro & glauco alternare. per glaucum autem intelligere debemus subalbidum cum viridi rubescente. vidi tamen aliquando rhabarbari radicem magnam omnibus boni rhabarbari notis insignitam, in qua aperta venula quaedam nigra per substantiam erant dispersa.

Rhabar-
barum quo
graue cum
raritate.

124. Sed quomodo graue esse poterit cum raritate; cum leuitas semper raritati iuncta esse soleat: ut & grauitas cum densitate, ut etiam Mesue in vniuersali Methodo cognoscendorum medicamentorum docuit. & ratio est, quia grauitas in medicamentis fit ex multa materia in parua extensione collecta, quod nihil aliud est, quam partes valde unitas esse; quare etiam causa est densitatis. Hinc etiam fit, ut medicamenta, quare ut bona eligantur, graua esse debeant densa semper esse obseruamus. quia leuitas producitur quod pauca materia multum extensa amplius spatium occupat, nec partes materiae multum inter se sunt unitae & condensatae, unde raritas producitur; fit, ut rationi consonum sit, leue omne rarum esse. Non tamen e contra inferitur omne rarum leue esse debere. quamuis enim hoc verum sit, vbi corpora sunt rara, laxa, & porosa, ut in spongia contingit. & colocyntide, & similibus; at vbi partes non porosae, sed quasi continentes sunt densae & bene compactae, optimeque commixtae grauitare possunt. quia harum partium grauitas leuitatem partium euincit, quare e raritate pendet: sicque aliquid rarum, & graue reperiri poterit.

terit. vt in scoria ferri euenire obseruamus. sic igitur cum partes in rhabarbaro reperiamur deuisa, & bene compactae promouentes raris, quae quodammodo continentes dici possunt, non absurdum dixisse Mesuem asseremus, qui cum raritate pondus in eo exposcit. Quod si nou, vt antiquus Mesueus interpretes vertit; sit graue cum raritate sua, interpretemur; neque vt Syluius, sit graue. tamen rarum; sed vt alij, sit graue pro raritate sua, facilius erit satisfacere, si dixerimus (pro) significare secundum. i. graue esse debere pro ratione raritatis. i. plus graue, quam exposceret, aut indicare videretur illius raritas.

125. Quoniam autem vbi inueterascit, illius fa cultates languescunt; optimum erit notas tradere, quibus senescunt à recenti discernere possimus: neque enim leuitas excedens sola, quod aliquibus placuisse video, sufficiens erit signum huius; cum in recenti eruto, si nimis maturum sit, leuitas illa reperiatur. At nec si viuudus ille color adsit, sed subalbidus color cum subflauo in eo conspiciatur, censei poterit antiqua. tum; in acerbo enim etiam recenti talis saepe color conspicitur. Verumtamen si duo hæc simul signa iungantur, verè signa esse dicemus iam senescentis rhabarbari: innata enim illius absumpta humiditate leuitas relinquitur, absumptis verò igneis partibus, & nativo calore, flauities remittitur, pallefcit, & vis eius quasi emortitur. Recens igitur tunc erit, cum grauis pro natura sua erit, cum apertus viuudus habuerit & intensum in coloribus proprijs colorem, & contractum solis radijs appositum in eo gummosi nescio quid splendescere viderimus, quod humidum illius pingue natuum conseruatum optime ostendit.

126. Cum succo fœniculi vniendas species has in massam præcipitur; At Desseñius, Fœsius, & alij quamplures, ne duritiem magnam contrahant, succum hunc in syrapi formam cum melle excoquendum censent, & eo sic utendum ad formandum magdaleonem. At non animaduertunt,

Rhabarbari antiquari signa & optimi.

Rhabarbari pueri succo fœniculi non syrapi excipandas.

tunt, quod præterquam quod id faciunt præter auctoris sententiam; in illud incurunt incommodum, quod vires medicamenti imminuunt, locum specierum occupante melle: succus fœniculi, quo excipiuntur species, medicamentosus est, & inter ingredientia connumerari debet; at melle addito ad vnionem, minuetur vis ingredientium saltem pro tertia parte, sicque dosis maior esset concedenda. Quod si dixerint, exsiccata massa si pilulæ pro vsu erunt formandæ, nonne necessarium erit melleum aliquid addere, sicque in maius incidemus incommodum? Respondendum erit; cum in vsum infra scriptæ pilulæ erunt deducendæ, quantitatem esse pendendam, mox vero ad formandas pilulas tantum liquoris esse addendum, quantum conueniet pro illis formandis. Quod omnino in alijs omnibus formandis in massam pilulis, in quibus auctores succis vtendum præcipiunt, erit obseruandum. Quod si quis non succum fœniculi, sed aquam sumere voluerit, vt multis placere video: non repugnarem, sed succum glycyrrhizæ & absinthij condensatum ex tali aqua placeret dissoluere, pro massa formanda, vt acquireret visciditatem quandâ, qua ex parte impediretur, ne adeo durescerent.

In pilulis de fumaria Auicennæ animaduertendum, non aquam fumariz esse affundendam, & pulueribus excipiendum, sed vt Brasauolo, Fuchio, Dessenio, Cordo, Coloniensibus, & plerisque visum est, succum. quamuis enim stillatiarum aquarum, aliquam habuisse eum cognitionem fatendum sit, vt ex capite de rosis, & de cura opthalmiz quilibet colligere potest; cum enim ad euacuandos salsos, & melancolicos humores institutz sint, succus potius assumendus erit, vt id obtinere possimus: familiare autem Mauritani, potissimum Auicennæ, esse scimus, succum aquam nominare, ac loco aquæ succum indere sapissimè.

117. In succi fumariz quantitate eligenda, cum eam non expresserit auctor, ne aberremus, eam colligemus ex eiusdem verbis, cum pulueribus tantam succi quantitatem

In Pil. de
fumaria
huius suc-
cus inden-
dus, non
aqua.

inden-

indendam præcipit, quantam iudicarem sufficere ad formandam sorbitionem; idest vt eam solum habeat consistentiam, qualis reperitur in potionibus sorbilibus. docuit autem Gal. exemplo melicrati, & prissanæ differentiam inter potionem, & sorbitionem.

128. Ex mirobolanis eximantur nuclei, & addita alce, & scammonio puluerizentur, mox in expanso vase speciebus repositis, affuso succo, & mixtis omnibus ad conditionem sorbitionis in dieb. canicularibus superposito aut setacea raro, aut canabina tela rara soli exponatur donec absumpta humiditate exsiccentur, iterumque iisdem lauigatis tantumdem succi affundatur, & soli exposita omnia exsiccentur; & tertio eodem præstito in massam redigantur.

129. Scio aliquos, ne ad saxeam illam duritiem reducantur, vtque à putredine, vt ipsi aiunt, vindicentur species, in vltima infusione ad imbibitionem, non succum fumarie sed syrupum ex melle vel saccharo apposuisse. sed præter Auenæ intentionem, & præter rationem. neque enim durities virtutem medicamenti retundit, & dum in vsum duci debent; aut puluerizari possunt, vel syrupo aliquo emolli seruatâ sua dosi, quam ex mixtione mellis aut syrupi imminui, certissimum est. Sed & siccitas illa, & durities tum & ea, quæ in has pilulas pro speciebus ingrediuntur, vim habent à putredine eas vindicandi, succique fumarie facilitatem ad putredinem, corrigendi.

130. Quoniam autem video aliquos laboris, & diligentia inimicos, ne tantum temporis in imbibitionibus ijs succi fumarie insumant, vnica facta per solem imbibitione, massam more aliarum pilularum efformare magno agrotantium damno: vt negligentiam hanc detegere possimus, observandum erit, errorem hunc inde comprehendendi; si massa aperta, & aloes & scammonij substantia, quasi segregata oculis subijciatur. quæ enim bene parata erunt, nullam talem substantiam aut separationem ostendunt, sed mirobolanorum, chebulorum potius colorem, & substan-

Sorbitionis
forma in
pil. fuma-
riæ quid.

pil. ex fu-
maria pa-
randi ratio

Imbibitio
succ. fu-
marie in
sole pilulis
reperenda
& neglecta
quò cognos-
catur.

tiam representabunt. cuius rei ea cēsenda est causa, quod docuerint, Mesue scammonium, si aqua aut salina attrin- gatur in lactis formam dissolui: & Dioscorides lib. 3. cap. 22. aloem in aqua facillimē dissolui, si igitur diutius v- trumque hoc in succo fumariz commoretur, non dubitar- dum erit ita dissolui, vt distinctē cognosci non possint. vt etiam in pilulis sine quibus quilibet obseruare potest, quod succo faniculi scammonium dissoluatur: quod in alijs pilulis non contingit.

In Fœtidis
pil. succus
capitato-
rum por-
rorum su-
mendus.

131. In pilulis fœtidis cum succo porri depurato exci- pienda esse simplicia, quæ compositionem ingrediuntur. non porri parui, non transplantati succus, vt aliquibus visum est, sumendus erit, sed capitati, tanquam præstan- tioris, vt optimē collegit Matthæolus & Lacuna ex Diosc. l. 2. c. 143. & Plin. l. 6. ca. 29. Hinc Lonicerus lib. de vi- rib. plant. & Marcellus Virgil. l. 2. in Diosc. c. 166. Por- rum capitatum, antiquitatem simpliciter nomine porri ap- pellasse scripserunt, quod medicamentosas magis in se contineat facultates.

Pro porro-
rum aqua
in Pil. fœti
dis succus
intelligen-
dus.

132. Per aquam porrorum non stillatitiam aquam intel- ligemus quæ nusquam ex porris extrahi solet, sed succum, quem nomine aquæ Arabes sæpē intellexisse iam docui- mus nā quod Mesue Tract. de ægrit. ocul. in Sieph viuidi ex Rasi aquam rutæ sumit, Rasis in Antid. Tract. 17. suc- cum ponit. & quod Serapio in ijs pilulis sumendam aquam porrorum dicit, Isaach eo antiquior succum iniicit. & sic in alijs.

Alfœbra
in fœtidis
pil. quid.

133. Per Alfœbram Esulam minorem intellexisse mani- festum est, cortice tenui, leui, fragili, subrubro, & ante sex menses collectam: quam Diosc. Tithymalum Cypariisiam esse crediderim; quam innoxiam magis esse censeo, quam maiorem, quam Pityusam esse Dioscoridis quilibet cognos- cet, qui quæ à Serapione scribuntur cap. 371. compara- uerit cum dictis Dioscoridis.

134. Et quamuis minor illa minus noxia sit, non debet tamen

tamen in vsum ducinisi preparata: quod fiet, aut vt docet Mesue in canon. & simpl. facta radicum illarum per horas vigintiquatuor in aceto, in quo infusa, & excocta fuerint. cotonea poma, infusione, mox ijs exsiccatis; aut vt Auic. cap. 673. & Serapio cap. 371. facta earumdem infusione triplicata in lacte vaccino recenter emulcto per horas vigintiquatuor; quæ mox resiccata in vsum duci poterunt. Ego ut postremum hunc recipio, ita priorem ex aceto magis amplector.

135. Per Harmel aut Alchaimel mirum quomodo Quiricus de Augustis in suo luminari cicutam passim intellexerit, deceptus errore Matthæi Syluatici, qui c. 322. per Harmel cum aspiratione scriptum apud Arabes censuit cicutam significari, sine aspiratione rutam syluestrem: cum quomodocumq; scribatur semper rutam syluestrem significare constet apud omnes qui legerint. Diosc. lib. 3. c. 44. & Auic. l. 2. c. 140. & Serapionem cap. 185. illis enim errandi occasionem dedit corruptus Auerrois textus. s. collect. cap. 42. vbi pro Harmel. cicuta intelligi videtur, quam etiam tertio gradu calidam & siccam constituere videtur: ex quo nullus est in medica materia vel medicoriter exercitatus, qui non cognoscat mendum hic subesse; cum omnes sciant cicutam frigidam & humidam non autem excedentem in calore & siccitate.

136. In ijs componendis is ordo seruandus erit. Primo loco gummæ succo porri bene calefacto macerabuntur, & si ob duritiem aut impuritatem grana dissolui non poterunt, omnia ita calentia in mortario ponantur, & ferreo pistillo calido aliquandiu ducantur, & ob impuritatem percolentur: deinde his etiamnum calidis euphorbium contritum admiscetur calidiori adhibito pistillo; mox Aloem, scammonium, colocyntim, seorsim trita addemus; postremo alia aromata vt ex arte in puluerem redacta, fiat massa.

137. Sed illud animaduertendum erit, præstare pastam

Esulæ præparatæ ratio.

Harmel non cicuta sed tuta Syluestris.

Fetidæ p il. quo componendæ.

Fetidæ pil. quo formanda.

in modum Trochiscorum separatim formare, ne si in massam viam formentur, ob gummata, partibus externis nimis cito exsiccatis, crusta obducta, internæ partes cum difflare non possint humiditate retenta situm & mucorem contrahant.

Pil. sine

quibus per
aloem bene
oleum
Nico. quid
intelligit.

138. Cum in pilulis sine quibus Nicolaus aloem requirat bene olentem; aliqui lotam cum decoctione aromatica pilularum alefanginarum intelligunt præter auctoris intentionem; cum rei huius nullam faciat mentionem; ex aqua enim intelligenda est lorio, si simpliciter ponatur; bene vero olentem puram & perfectam intelligit odorem perfectum aloes redolentem.

Pil. sine

quibus scammonium
quo miscendum.

139. In ijs conficiendis Nicolaus scammonium præcipit subtiliter esse puluerizandum, atque succo fœniculi diligenter commiscendum, & per lineum pânium tradendum cum succi tanta quantitate, quæ satis sit ad massam ex speciebus parandam, manibus oleo violato prius inunctis. Hic video Calestanum, Ouiedum, & alios dissoluendi scammonij modum hunc non probare, quod dicunt non leuem scammonij portionem in hac dissolutione, & percolatione disperdi, dosimque illius imminui: propterea censent præstare. scammonio in mortario subtiliter puluerizato affundere succum fœniculi depuratum, & ita manibus, & pistillo admiscere, ut lactis speciem acquirat, mox vero pulueres paulatim esse addendos sicque massam esse formandam. Verum præterquam id est præter institutum auctoris, à quo recede re nisi urgente necessitate absouum semper censui, si consilium illius considerauerimus; illi repugnare hos observabimus. succo illo scammenium esse dissoluendum censuit, ut æquali mensura omnibus partibus communicetur, quod non alia ratione melius fieri poterat, quam ea; neque minus deperditur scammonij substantia, si probe puluerizatum sit illo modo, quam præscipito à Nicolao.

Pil. aureæ
quam rosa
eæ quantitate; requirant.

140. Duo in aureis pilulis sunt animaduertenda, primum

in in tragacanthæ dissolutione tantam aquæ rosacæ quantitatē esse sumendam, quæ pro formando magdaleone satis ita sit, vt non nimis cito in externis partibus durefcēte materia crusta inducatur; sic enim internæ partes mucescerent; sicque alij sex, alij septem, alij octo vncias aquæ adhibent, & paulatim humorem absumentum censet, vt vbique humor absorbatur, massamque oleo inunctis manibus formant.

141. Si tamen, quod secundo obseruandum est, in cicerum formam efformentur, aut in Trochiscorum, compressa materia; minori quantitate aquæ pro tragachanta dissoluenda opuserit, vt docuit Nicolaus: quia nec sic externa incrustantur, nec interna humiditate mucescant.

142. In pilulis de cynoglossa Mæ sue, cuius omnino descriptionem præstat sequi, quam Nicolai, aut Bononiensium, radices cynoglossæ siccās indere debemus, vel ipsomet Mæ sue auctore in capite de catarrho, ab Alex. Traliano forte mutuatus lib. 5. cap. 4.

143. Vbi etiam errorem Alexandri Vercellensis notare debemus in suo Apolline, qui pro drachmis quatuor opij, & seminis hyoscyami albi, indendam censet solum semidrachmam vtriusque, præter omnium codicum lectionem, & communem omnium sententiam: & si croci, myrrhæ, & thuris quantitatē perpendamus, ac ad adeo leuem opij & sem. hyoschyami albi comparemus; facile cognoscemus vix vllam incrassandi catarrhi facultatem habere posse. sed in eo magis decipitur, cum pro drachmis quatuor radicum cynoglossi quatuor vncias imponit.

Nunc reliquum est Trochiscos omnes officinis necessarios, & pharmacopæis dispensandos examinemus; siue aliorum medicamentorum, quorum compositionem ingrediuntur causa parentur; siue ex seipsis dentur, nec alijs, famulentur; & siue sint purgantia, siue roborantia. omitemus autem Trochiscos de Vipera, Hedichroos, & scilicet tanquam ad Theriacam, & Miridaticam compe-

Pil. aureæ
quō for-
mandæ.

Pil. de cy-
noglossa
eligendæ-
quæ à Mæ
sue tradun-
tur, qui ra-
di. siccās in-
dit.

Apollinis
error ma-
ximis in
pil. de cy-
noglossa in
quantit.
opij. hyos-
quiam. &
earum cy-
noglossæ.
DE TRO-
CHISCIS

sitionem magnam ingredientes, quæ peculiarem requirunt considerationem, longiorem, quam tractatio hæc nostra requirat, potissimum cum viri doctissimi ex professo hac de re editis libris diligenter pertractarint.

Galliamo-
scata Tra-
gacanta
quam mi-
nimum re-
cipere de-
bet.

144. Inter hos igitur agmen ducat Gallia Moscata Mesue in qua componenda primo illud animaduertendum tragachantham, qua excipiuntur cum aqua rosata lignum aloë, ambra, & moscus, in minori, quam fieri potest quantitate, ponendam esse: ne dosi instituta medicamenti admixta, ea facultates ex medicamenti ingredientibus non resulent, prævalente tragachantha.

Ambra nõ
oleo dissol-
uenda sed
rosacea.

145. Non placet, quod aliquibus visum est, ambra oleo balanino dissolui, quod quamvis minus rancescat, humentiores tamen reddit Trochiscos, unde etiam mucidi redduntur; præstabit igitur aqua rosacea dissolvere, & cum eadem omnia viuere.

Pro Am-
bræ campho-
ram addenda.

146. Non est recipienda sententia patrum commentabracan, nõ torum Mesue, quam Calestani adeo mordicus defendit, ambra camphoram æquali pondere addentium; cum legaddenda sunt ambrecam: dictionem postremam, cam, camphoram explicantes, cum, cam epithetum optimæ ambra sit, vel communi omnium loquendi modo receptum; atque ideo plerique & quidem doctiores, quorum opinionem sequendam censemus, agallocho, ambaro, & mosco contenti tragachantha aqua rosacea dissoluta trochiscos formandos optimè censent.

Per Gallia-
am simpli-
ter non
alefangi-
nani sed
moscatam
intelligi.

147. Vt nec recipi Calestani opinio debet, qui etiam in compositionibus Mesue, ubi Gallia simpliciter requiritur, non moscatam, sed alephanginam indendam esse censuit ea ductus coniectura, quod in hac dicat Mesue. Et hæc est illa de qua antiqui considerant, & de qua plurimi loquuntur: & inferus, & ingreditur in medicinis magnis, & hoc est, quod intelleximus. Sed ex his verbis nihil amplius colligitur, quam alephāginam Galliam perfectam esse, & ipsa admiscendam ubi aromatica siue alephan-

phangina experitur: primo tamen loco Moscatam tanquam præstantiorem & per autonomasiam tali nomine simpliciter dignam. Huius sententiæ fuit Collegium Florentinum in secundo sytupo de calamento, in syrupo de mentha, in miua aromatica, in electuario rosato Mesue, & in diamosco. in hisdem: idem censet Borgarutius; & in syrupo de thymo, ut & Valerius Cordus; & Cronenburgius, & alij plerique.

148. Quamvis diligenter Mesue Gallix alephangina compositionem descripserit, aliqua tamen sunt, quæ animaduersione indigent. & primo aquane comitum an rosacea stillatitia vtendum sit; ego stillatitiam rosarum viridium præferendam cum Syluo & alijs censerem; ea ductus ratione, quod ex odore denominentur & comedentur; si cum rosacea fiat infusio rosarum siccarum, & corticis citri magis id obtinebimus. accedit quod si in Gallia sebellina pro infusione gummi Arabici vitur in aqua rosacea, cur etiam in hac eadem non vtemur.

149. Sed ad huc quæ proportio erit rosarum siccarum & corticum citri siccorum ad aquam rosaceam, & quæ huius quantitas; aliqui in decem & octo vncijs, duas rosarum vncias & duas drachmas corticum citri siccorum infundunt. at cum vtraque simul infundenda præ plant. causam non video cur rosarum siccarum duas vncias ponant, corticum vero citri siccorum solum duas drachmas; cum soleat Mesue cum duas res simul iunctas infundendas docet, æquali pondere eas imponere. sesquialtera igitur aquæ singulorum vnciam aut sex drachmas saltem iudendas esse censerem.

150. Sed in quantitate mirobalanorum emblicorum, quibus hæc infusio est affundenda, video etiam apud doctissimos viros non leuem subesse conuersionem: cum enim passim in impressis libris legatur mirobalanorum emblicorum bonorum abiectionibus vncias quatuor: aliqui inter quos boni Costæus nimiam censens esse eorum quantita-

In Galia
Alefangi
na infusio
fiat in ro-
sacca.

In Infusio
ne Alefan-
ginæ galie,
quæ rosarū
& corti-
citri ad
aquam pro
portio.

Emblico-
rum quæ
proportio
ad aquam
decodt. per
alefangina

rem ad mediam infusionis illius libram, quam emblicis superfundendam præcipit, quod statim absorberetur; loco vnciarum quatuor drachmas quatuor substituendas esse censet. sed præter veterum omnium codicum fidem id facit; & præter etiam rationem. quamvis enim in triduali illa prima infusione absumi possit & absorberi liquida illa sex vnciarum affusio, qua molliores emblici redduntur, in repetitis illis eiusdem infusionis affusionibus, cum octo vnciæ superaddantur, & facultas mirobalanorum melius elicitur, & tantum liquoris ex expressione obtinemus, quantum satis est ad excipiendas species, & formandum medicamentum in formam trochiscorum.

Costæi &
Veletij er-
ror in in-
fus. & de-
coct. Em-
blicorum.

151. Sed magis in errore versantur Costæus, vt & Franciscus Velecius Hispanus, credentes in prima illa trium dierum infusione totam & integram quantitatem infusionis esse ponendam, mox verò quarto die facta ebullitione cum expressione, reiectis quatuor illis drachmis Emblicorum, tantundem Emblicorum esse addendum, vt & quinto die his proiectis, quatuor itidem drachmas addendas, censent, factaque expressione, ea species excipi debere. hoc. n. modo credunt adimpleri quod à Mesue expetitur, vsque quo emblicorum virtus in aqua impressa sit. videtur. n. illis si ter noui Emblici apponantur, ter incalcescat, & excoletur cum expressione, melius vim Emblicorum aque imprimi posse. Sed non animaduertunt id esse omnino contrarium artificio Mesuei qui non repetendam mirobalanorum appositionem scripsit, sed affusionem nouæ infusionis iisdem myrobalanis primo per tres dies in vase angustioris, & bene occlusi infusis: nec minus sperandum est virtutem Emblicorum imprimi aque posse per infusionem illam quinq; dierum, quam per repetitam illam Emblicorum additionem, & repetitam coctionem, & expressionem.

Veletii er-
ror in men-
sura Embli-
corum.

152. Minus placet eiusdem Veletij opinio, qui myrobalanorum horum emblicorum accipit vncias quatuor, post glandibus extractis & abiectis crasso modo ijs contri-

tis illis affundendam infusionem illam censuit, cum antequam ponderentur ossa detrahenda, & abijcienda ipse censeat. ut cuilibet, qui æquo animo verba Mesuei legere voluerit, manifestum esse potest. si enim post glandes extrahantur, tantum de decreto pondere deficiet, quantum ossa illa pendebant.

153. In Trochiscis de rhabarbaro formandis cum succi eupatorii drachmas solum quatuor imponat, & ea quantitas ad excipiendos pulveres cum esse satis non possit, censem succum condensatum esse imponendum; species autem tum excipiendas crediderim succo absinthij, tum amygdalis amaris à cortice expurgatis, & cum illo in mortario commixtis.

154. In Trochiscis de eupatorio aberrant Nicolaus præpositus, & Brasauolus, in manna, & succi eupatorii pondere, pro vncijs drachmas substituentes.

155. Sed magis peccant, qui per succum herbarum, quo omnia excipienda censuit Mesue, succum eupatorii intelligunt: ut enim mannâ electam in mortario positam succo eupatorii pistillo excipiendam concesserim, ita ad Trochiscos formandos cum tanta copia puluerum cum manna, satis esse vnciam succi eupatorii omnino negauerim: cumque succos herbarum requirat, hic vero solius herbæ agrimonij mentionem faciat, de eo intelligi non potest. Optimè igitur à plerisque per succos herbarum constitutum est, eos succos herbarum intelligi, qui alibi tali nomine declarantur, ut in syrupo debyzantijs cum aceto, ubi borraginis, lupulorum, apij & cichorij succos, herbarum succos appellat: & in syrupo ab eo, distinctione sexta, acetoso cum succis herbarum appellato, & in distinctione septima, dum docet infusionem succi herbarum, crediderim tamen non esse semper ad hos formandos necessarios succos illos quatuor herbarum, sed aut vnum, aut plures, ut placet; quod succi herbarum ad illos formandos lenis requiratur quantitas: quod idem ipsum in Trochi-

Trochisci
Rhab. suc-
cum eupa-
torij con-
densatum,
non liqui-
dum reci-
pian.

In Trochi-
scis Eupa-
torij ī mā-
na & suc-
co Eupato-
rij Nicolai
& Brasau-
error.

Herbarum
succū quid
significet ī
Trochiscis
Eupatorii.

icis de absinthio intelligendum erit.

Terenebia
bin quid,
& eius lo-
co substi-
tuenda.

156. In Trochiscis de berberis illud solum obseruan-
dum erit, velle Mesuem excipi pulueres, & formari Tro-
chiscos cum mānæ speciei, quæ Terenebiabin dicitur quæ
quoniam Serapioni, & Avicennæ liquida in formam mel-
lis erat, optimè præstare poterat: nos cum ea careamus
illius loco manna nostra dissoluta in formam mellis ex de-
cocto berberorum vti poterimus.

Berberorū
Trochisci
succum li-
quiritiæ,
requirunt
ficcatum.

157. Per succum liquiritiæ, quem exposcit Mesue in
hac compositione non liquidum quis assumat, sed siccum
vt in puluerem duci possit. Neque huic repugnat Gal. 2.
de Antid. cap. 32. vbi succos siccos reprobare videtur. ibi
enim succos vetustate siccos, exoletos, & facultatibus ideo
carentes reprobat, non bene à sole exsiccatos, & recentes.

Cappero-
rum Tro-
chisci quō
cum adeo
paucis am-
moniaco
formari
possunt.

158. In Trochiscis de capparibus solum illud difficul-
tatem asserre potest, quod à Mesue in fine descriptionis
pro modo compositionis additum est. (Ammoniacum dis-
solvatur in aceto, & aliarum rerum pulvis conficiatur cum
eo.) cum enim drachmæ solum duæ ammoniaci impo-
nantur, vt illa quantitas dissolvatur ex arte, in aceti frigi-
di tanta quantitate emollii debet, vt dissolui possit, &
lintheo percolari, quod vt facilius obtineri possit, post ho-
ras illas viginti quatuor, in quibus facta fuit illa infusio
debet aliquantulum excalescere, & tunc acquisita liqui-
ditate aptum erit ad excipiendos pulueres: sed quomodo
tantillus ille liquor satis esse poterit ad drachmās viginti
sex puluerum excipiendas, maxime cum verè liquor dici
non possit, cum vnguenti aut linimenti formam acquisue-
rit. scio aliquos tantum aceti apponere, vt cum parua illa
ammoniaci quantitate satis esse possit ad viuendos pulue-
res. Sed non animaduertunt dissolutionem hanc ammo-
niaci non esse ex arte: neque pulueres excipi ammoniaco,
aut eo formari Trochiscos hos, sed potius aceto præter
intentionem auctoris. vt igitur incommodum hoc effugia-
mus, hoc modo in componendis ijs Trochiscis proceden-
dum

dum erit. Primo amygdalæ amaræ cultro erunt excorticandæ, pinſendæ, & per rarum ſetaceum traducendæ, & mox in mortario reponendæ leui aceti portione ſuperinfuſa, & tandiu in mortario ducantur, donec in lactis formam euadant, deinde ſuccus eupatorii condenſatus ſuperaddi, debet, & diſſolui; mox porrio puluerum adhibebitur, quæ in ſubtiliſſimum puluerem erit traducenda: poſtremo ammoniacum iam aceto emollitum, & in linimenti formam reductum cum ea puluerum parte, quæ ſuperreſt, addi debet, & cum eo Trochiſci formandi erunt.

159. Trochiſcorum de terra ſigillata Meſuei deſcriptio In Trochiſcis quoque habet difficultates, & primo non eſſe quid dubitemus de terra ſigillata, ſiue lemnia, quæ ex aula Turcici Imperatoris ſæpe ad nos deſertur, an vera ea ſit, aut ueribus ſimilis Galeuicæ. quod colore diſſerat; quodque non ex eodem loco effodiatur, ut tempore Galeni, quod video aliquibus feciſſe negotium; cum enim ex eadem inſula deſeratur; Si exhauriuntur venæ metallorum in auri & argenti fodinis, aliquando autem in uicinia, aut in aliis locis eiusdem prouinciæ aliæ nouæ inueniuntur, cur idem in uenis terræ medicatæ euenire non poterit? neque differentia coloris quicquam concludit; quia diuerſitas ſoli diuerſitatem coloris introducere poterit, eadem uirtute conſtente: quam longa experientia, & maguorum auctoritas confirmauit.

160. Et quoniam in Arabicis uerbis verſamur; non niſi ex Arabibus etiam colligere debemus quid, & ea ſignificent, & iis deſicieutibus quid loco illorum ſit ſubſtituendum: cum hic imponat Meſue heſtidos, ſeu euſtidos trachinas duas, conſtet autem rem eſſe diuerſam ab hypociftide, cum hoc loco tanquam res inter ſe diſtinctas utramque ponat, ut & Auiſen. lib. 2. cap. 332. pro euſtide ſuccum barbæ hircinæ arbuſti intelligit, ut & Serapion ſynonymis, cum de hypociftide Auiſen. agat lib. 2. c. 694. non igitur omittenda euſtilis tanquam eadem cum hypociftide,

chiftide, vt video Placoromo, Cordo, Apollini, Bononi-
ensibus, & Cistæ Mantuano placuisse, sed eo deficiente, aut
tantundem hypocistidis imponemus, aut acaciam, quam
eiusdem facultatis constituit Diosc. lib. 1. cap. 109. cum
hypocistide: immo alterutra deficiente succus balanstio-
rum substitui potest, cum eandem habeat facultatem ex
Dioscoride lib. 11. cap. 127.

Sedenagi
quid, &
quid eius
loco.

161. Sedenagi etiam, quod in hac compositione poni-
tur, non leuem facit difficultatem cum enim Philonio per-
fico dixerimus per hanc dictionem intelligere Mesuem la-
pidem hzmatium; cum hic & lapidem hamaritem ponat,
& sedenagi; videtur asserendum res esse diuersas, quæ
duobus ijs nominibus significantur: & quamuis iam docue-
rimus aliquando auctores bis easdem res in eadem com-
positione posuisse mutata quantitate, præstat tamen affere-
re sedenagi hic scribi, non sedenegi, quod significat semen
granati Syluestris, quod tali nomine insigniri, & synony-
mi Auicennæ antiqui ostendunt, & Colonienſe Dispensa-
torium, & Christophorus de Honestis, & postremo Fran-
ciscus Veleius receperunt; & rationi maximè consonum
est, si seminum illorum natura perpendatur, ac compare-
tur cum fine huius compositionis; nec repetitionis eiusdem
rei erit arguendus auctor.

In Alche
hengi Tro-
chiscis,
quid per
grana Al-
chehengi
intelliga-
tur.

162. Quid per grana alchehengi, quæ in Trochiscis ab
ijs denominatis primo loco ponuntur intelligendum sit nõ
vna est opinio: cum. n. alchacabus seu vesicaria, folliculos
in summitate siue vesiculas gerat, grana continentes, in
quibus etiam, vt in ventre, semina minora continentur,
dubitari posset, ex tribus ijs, quid esset imponendum; an
folliculus siue cortex, cum Gal. 3. de comp. med. per
gen. c. 7. in descriptione Trochiscorum de vesicaria Sil-
uij Hieratij Thebani vesicariæ corticem imponat: sed non
animaduertunt, qui hoc sentiunt paulo post cum eisdem
ab Andromacho descriptos referat, id ipsum explicari per
corticem, non vesiculas has intelligere, sed corticem radi-
cum,

cum. Sed cum hic Mesue grana exposcat, ea intelligere manifestum est, quæ vesiculis illis continentur. ex quo etiam eorum rosellitur opinio, qui semina illa solum parua & alba, quæ granis illis includuntur, imponenda censent, cum grana ipsa requirant.

163. An vero in iisdem, anguriæ semina, an melonum, cum albatecæ, siue Batecæ semina requirit, sint imponenda, non vna est sententia. Per Batecam enim Manardus quid sint. Siluius, Christophorus de Honestis & alij anguriam intelligunt. Fortasse præstabit peponem nostrum seu melopeponem & eius semina intelligere: cum enim dullaca Arabibus sit anguria. vt constat ex Serapione cap. 144. vbi dulacam melonem dicit esse viridem, cuius coloris esse anguriam scimus, & tres illi melonem viridem anguriam esse asserunt, cum capite præcedente de batecha loquens tanquam de re diuersa melonem describat. Huius sententiæ fuisse constat Andream Belunensem in interpretationibus dictionum Arabicarum, & Matthiolum lib. 2. in Diosc. cap. 128. & Patres censores Mesue.

164. Bis bolum Mesuem in hac compositione cum viderint aliqui posuisse, primo cum additione boli Armeniaci ponderis drachmarum sex; mox boli, sine vlla additione, ponderis drachmarum duarum; secundum hunc superfluum censentes abstulerunt præter rationem, cum per primum bolum armeniam orientalem intellexerit; per bolum autem, rubicam Sinopicam, vel Pannonicam cum Manardo, aut cum alijs terram lemniam.

165. In Trochiscis de myrrha ex Rhase. 9. ad Almanf. aliqui legunt pulegij ceruini, quod, quid sit, vix vllus est, qui sciat, quidquid dicat Amatus Lusitanus lib. 3. in Diosc. cap. 39. esse nempe pseudo dictamnium: propterea magis placeat, quod aliquibus visum, quodque firmatur aliquorū etiam impressorum Rhazæ librorū auctoritate in quib. legitur, pulegij, cumini, quam lectionē sequitur Desseuius, Clusius, & Fuchsius, maximeq; lectio hæc est rōni consentanea.

Batecæ

semina

quid sint.

Bolis sim

pliciter

quid.

In Myr-

rhe Tro-

chiscis,

quid per-

pulegium

ceruinum

intelligen-

dum.

tanea cum cumulo facultas non levis in fit urinas, & menstruas purgationes promouendi, quin fetus mortuos propellendi.

Cum institutum nostrum sit in hoc libro non Antidotarium integrum vobis dare, sed animaduersiones aliquas more nostro circa communem componendorum medicamentorum modum: quemadmodum in aliis non omnes recensimus compositiones, sed eas solum, in quibus aliqua suberat difficultas aut controuersia; illas omittentes, quæ nihil controuersum in se habent: ita in censuram Sympliciorum, quam hoc loco præ manibus habemus, eos solum examinabimus, in quibus aliquid subest controuersum, quod fere cuenit in iis, qui compositi passim appellantur, non omittentes etiam simplices, si quid iniis erit, quod censura mea indigeat.

Syr. de pomis simplici 166. In syrupo de pomis simplici sericum tinctum cum cocco baphico, chermes dicto, sit præparatum, ut in alchermes compositione, crudum enim sericum omnino indendum Auctor præcipit.

crudum 167. In miua simplici Mesue, licet mellis vel sacchari, tinctum in chermes. vel quantitas illorum nulla fiat mentio, alterutrum tamen indendum, & in miua ejusdem aromatica. Nam postrema verba, in simplici hac, ubi non male eos facere scribit, qui loco mellis saccharum imponunt, hoc facile ostendunt.

Miua simplex ex melle vel saccharo 168. Quantitas illorum sit librarum tredecim ad libras viginti quinque succi, ad dimidias ex libris quinquaginta cocti, & viginti vini.

Miua quæ requirat zuchari quantitatē 169. In syrupo de cichorio cum rhabarbaro. Nicolai examinando multum mihi esset laborandum in simplicibus examinandis, & recognoscendis, nisi recentiores Itali Hispani, & Germani, omnem ac in re remouissent difficultatem. Maior forte relinquitur difficultas in aqua quantitate pro decoctione paranda; si enim simplicia medicamenta, quæ ingrediuntur decoctionem pro parando

syrupo,

syrupo, vncijs commensurarentur, cum dicit Nicolus in randa quæ
sufficienti quantitate aquæ; non ita difficili negotio quan- aque quan-
titas aquæ cognosceretur, sed cum plerasque herbas per titas sume-
manipulos metiatur, confusionem parit: si tamen consi- da.

11. qui herbarum manipulum ad vnciam reducit, cap.
erit difficile quantitatem invenire aquæ; quamvis enim
nō idem semper pondus obtineat manipulus rerū omnium,
cum alia alijs sint, grauiora: cum tamen hic in herbis so-
lum versetur, quarum non ita multa in pondere esse po-
test differentia, pro manipulis vncias recensentes, & duo-
decim aut tredecim vncias enumerantes, reliquias per
vncias dimensis addentes, viginti quatuor vnciæ omnium,
idest, libræ duæ euadent; ad quas excoquendas sexdecim
aquæ libræ sumi poterunt, quarum decem in hordeo exco-
quendo insumentur & radicibus, ijs inditis, vbi septem li-
bræ aquæ in illo elixando erunt insumptæ, sex superstiti-
bus, sex alijs sacchari additis parari poterit syrupus, in
cuius libra qualibet dum excoquitur, infundi debent rha-
barbari electi bene maturi drach. 4. & spice scr. 4. in raro sin-
teolo, sepius, dum elixatio paratur syrupus, forti facta ex-
pressionem. si tamen in portiuicula eiusdem decocti separatim
fieret rhabarbari infusio per horas duodecim & fortis ex-
pressio, & dum fit syrupus adderetur, ut persuadet Calesta-
nus non repugnarem.

170. In syrupo de cichoria cum rhabbaro Guglielmi
cūm videam plerosque rhabarbari drach. ij. solum in fun-
dere, in more autem apud nostros esse vncias loco drach-
imarum addere, idque etiam Bergomeni Collegio magis
placere: ita in nostra etiam prouincia obseruari debere
præcipio, atque probatus fescera cyanum in frumentaceis
campis nascentem, flore cyaneo siue caelesti omnibus noto
indendum censemus.

171. In syrupo de Polypodio Sueffani illud solum qui-
madueram quod à Melichio optimè est obseruatum: quod

Syr. de ci-
cor. cum
rhab. Gug.
rhabarbari
non drach
mas duas
indendas
sed vncias.
Syr. de Poly-
podio Aug.
antequam
in vsum du-
catur sem-
per spatula
commi-
scendum.

soluentia maiori ex parte in syrupis fundum petant, dum in
vsum ducitur, spatula antequam è vase educatur, diligen-
ter vndequaue esse commiscendum.

In Sabor
regis syru-
po herba-
rum, quæ
viscidum
succumha-
bent, illius
extrahen-
di modus.

172. In syrupo de pomis Sabor regis cum succi borra-
ginis & buglossi requirantur, ex quibus vix succi elici pos-
sint, aut certe glutinosi adeo, vt aut dissolui, aut in syrup
saltem mediocris substantiæ formam deduci non possint
non erit præter rem nostram, si aliquid de modo succi eli-
ciendi ex herbis ijs viscidæ substantiæ, qualis & est portu-
laca, proposuero: potissimum cum videam hac in re gra-
uissimos viros non multum inter se consentire. Galenu-
enim primo de comp. med. sec. gen. c. 6. succum ex ij
connumodè extrahi non posse censuit, nisi tenuiori aliquo
dum pistantur, liquore superaddito; quod 6. de Tuenda
valet. de portulaca repetijt. Sed modus is illud habet in-
commodi, quod nec syncerum habebimus succum, nec il-
lum in vitreis ampullis cum oleo per annum conservari
poterimus ad syropos parandos, cum aliquando, vt hye-
me, herbæ non reperiuntur, aut exsuccæ sint. Ouedus l. 1.
Methodi cap. 10. & copiosum & syncerum, nec tamen
glucinosum ex his herbis sine alterius succi mixtionem
habere nos posse censuit; si in mortario contusis herbis, i-
lis à mortario extractis, in aliquo vase sine expressione in-
sinamus calido tempore per triduum, frigido per quatuor-
duum. liquorem enim sic aliquem subtilem effluere, mo-
que expressis herbis, quod reliquum est humidi, extrahi
qui mixti simul & visciditate carent, & si elixentur, à
consumptionem medietatis à putredine vindicantur,
in vasis angusti oris vitreis, superposito oleo per totum an-
num ad vsum conservari poterunt. At quomodo æstiuo
tempore contusæ herbæ per triduum aut quatrimum con-
servari possint sine putredine vix intelligi potest; & exp-
riëtia omnino repugnat & si attenuatur humiditas, & a-
getur, sobolem dicemus esse introductæ aliquo modo pu-
tredinis dissoluta compage mixtionis, & dissolutis parti-
hum-

humidis à siccis per corruptionem, vt ex Arist. colligere possumus 4. Meteo. Alij, vt Fernelius 4. Meth. cap. 11. melius, herbis pistatis in mortario, ijsque in vase aliquo positis & flamma leuicalexactis statim exprimunt, vnde & copiosum, nec adeo viscidum succum eo vi caloris attenuato exprimunt. Melius fortasse & felicius alij viscidis ijs herbis antequam pistentur in duplici vase igni blando expositis, succum extrahunt, illis in mortario post confusis, qui nec adeo crassius erit aut viscidus, & syrupum reddet non adeo obscurum, & conservari adhibita solita cum oleo diligentia per totum annum poterit, potissimum si post expressionem eum per sex horas sinamus residere, leuique post adhibita ebullitione despumetur.

173. In syrupis de pomis poma sint dulcia, matura, & redolentia, apia, aut nostratia ex agro Papiensi Popina dicta; aliquandiu prius reponantur in acervo, mox cortice detracto pistentur, & succus exprimatur, & in aere frigidiori si aliquantulum incalescant, & maiorem dabunt succi quantitatem, & suauiore gustui dabunt saporem.

174. Non placet modus indendi croci in hoc syrupo traditus à Brasauolo, qui eo subtilissime puluerizato, vt substantia simul cum virtute ceteris communicetur, & in fine decoctionis admixto saccharo dum forma syrupi concipitur illum admiscet. est enim contra intentionem auctoris, qui virtutem solam cum partibus igneis vult communicari; & propterea in linteo raro inuolutum solum voluit in fine decoctionis imponi, vt subtiliores illius partes eo modo conservatæ syrupo communicarentur.

175. In syrupo de pomis composito Mesue in decoctione paranda video aliquos aquæ solum libras tres, aut quatuor ponere; quæ quantitas parua nimis est, & ad res ingredientibus excoquendas, & ad ducendam elixationem ad consumptionem tertiæ partis, tumque postremo facta colatura, ad libras duas sacchari excipiendas, etiamsi succi pomorum in fine viciæ octo addantur, qui sane paulatim

Syr. de pomis quo ex ijs succus extrahendus.

Crocus in syrupo de pomis quo indendus.

Syr. de pomis compositus quæ aquæ quantitatē requirit.

spatula permiscendo addendus erit.

Menthæ
syrupus sic-
cam men-
tham re-
quirit.

176. Syrupus de mentha compositus Mesuei, vt utilis-
simus est, atque sæpe in vsum traductus, ita multas habet
difficultates: & primum quid per siccam mentham intel-
ligere debeamus. aliqui enim per siccam intelligunt non
actu siccam, sed in locis siccis natam, vt potentia sit siccior.
Sed si obseruauerint, quæ ab eodem scripta in principio sui
gradabin, in electuario de aromatibus ad eisdem affectus
sanandos instituto, vbi mentam siccam imponit, per sic-
cam intelligit significari actu siccam, cum inter triturabi-
lia eam reponat: non negauerim quidem eligendam esse,
quæ in locis siccioribus nascitur; attamen siccam etiam
actu dicimus esse imponendum, talemque requirere Me-
sueum.

Mentham
verè siccā
exposcere
syr. de mē-
thā contra
venenum.

177. Nec recipienda est Veleij Hispani sententia per
mentham siccam eandem, à qua solum superflua humidi-
tas sit in vmbra absumpta, intelligentis: sic enim, &
Serapionem & Virgiliū siccare res dicere consenuisse di-
cit; quo modo si siccam mentham intelligamus, non erit
nimia menthæ illa quantitas sesquialtera ad eam succorum
quantitatem septem librarum cum dimidia: quod sic par-
uam succorum quantitatem absumeret. quod si è contra
siccam sumamus, experientia docet nimis parvam esse
succorum quantitatem, quod sui siccitate multum illius
portionem ita absumeret, vt ad parandum syrupum cum
duabus libris mellis aut sacchari non satis esse posset. Sed
nemo est, qui mentham, ex qua solum aliqualis absum-
pta sit humiditas, siccam dixerit: siccare quidem dici po-
terit, quod in via sit ad siccitatem; at siccam sic esse nul-
lus dixerit: neque ob paucitatem succorum, atque quod
ob id parari non possit syrupus, mentam hoc modo para-
tam indere debebimus, sed alia via erit ineunda.

Calestani
in menthe
quantitate
in syr. de
mentha
metienda
restituta
sententia.

178. Non placet tamen Calestani opinio, qui vt hoc
inconmodum et iugeret, seruata quantitate succorum, loco
sesquialtera, sibi iam indendam censuit; præter auctoris, &
omnium

omnium scriptorum sententiam : media enim libra mentha sicca pauca nimis est quantitas ad roborandum ventriculum, & eos affectus euincendos, ad quos vel syrupum de mentha simplicem accommodatum esse dicit: & in simplici, libram menthae siccae in libris quatuor succorum ponit, cur in composito sesquilibram non ponemus in libris septem cum dimidia succorum? Deslenius & Foesius, vt hanc absorbitionem succorum effugiant, libram solum menthae siccae adhibent. Ego in syrupo hoc à mentha denominato numquam menthae quantitatem imminuerem, cum libram in simplici posuerit; sed potius singulis succis sex uncias adiungendas cum plerisque censerem. Quod si consideremus modum quo conficiendum syrupum hunc docet Mesue, vt decoquantur cum facilitate, vel lento igit post infusionem succi hi, fortasse optimè pararetur, si in duplici vase excoquerentur. sic enim per longam elixationem virtus menthae succis imprimeretur, nec tanta succi quantitas elixatione absumeretur, & syrupus cum facultate ingredientium conseruaretur, etiamsi ad dimidias non absumerentur.

Decoquen-
da men-
tha in suo
syr. vera ra-
tio.

179. Sed quam Galliam assumemus, vt aromatizetur sympus is, & qua quantitate; cum Mesue simpliciter dicat, aromatizetur cum Gallia? Ego nobiliorem inderem molcatam; non aberrabit tamen etiam, qui alefanginam imponet. Quantitatem colligemus ex eodem in syrupo de succis herbarum, in secundo de calamento, & in eo, qui est de thymo, vt pro libra sumantur scriptuli duo, & hic vtentur duabus drachmis.

Galliaque
imponen-
da, & quā
ta in syr.
de mētha.

180. Vix dici potest, quantum scriptores in syr. iuiubino variant, & in mensura iuiubarum, & aquarum & in modo decoctionis: an simul omnia ingredientia sint imponenda, an gradatim pro ratione coctibilitatis, & partium extrahendarum iuiubarum. alijs libras decem imponentibus: alijs numero sexaginta aquarum; alijs libras quatuor, vt in omnibus codicibus Mesue; alijs libras centum, vt Manar-

Iuiubarū
syr. paran-
di varij
modi va-
riata quan-
titate iui-
ubarum &
aquar.

dus, habita ratione librarum decem iuiubarum, & hordei;
 quem adeo longam cocturam postulare alibi docuerat; alij
 libras duodecim, vt Oniedo placuit; plerisque sex libras.
 In decoctione seruandos multi dicunt esse canones vniuer-
 sales, etiam si in singulis descriptionibus distinctè id non
 explicetur: alij vero id in decoctionibus quidem, quæ
 per se in vsum veniunt, esse seruandum fatentur: at in de-
 coctionibus pro componendis medicamentis non semper
 graduandum esse, sed sequendum illud, quod ab auctore
 est in eo composito describendo institutum; hæcque quili-
 bet eorum aliquibus coniecturis conantur persuadere. Ego
 ne in his immorer, non libras decem, sed numero LX im-
 ponendas censerem, vt communis est omnium sententia;
 facili lapsu interposito puncto iter L. & X quod ex sexa-
 ginta in L. X. mutatum est, aquæ quantitas librarum cen-
 tum nullam habet proportionem: neque. n. drachmarum
 octo hordei quantitas & iuiubarum, tantam requirunt
 aquæ quantitatem: librarum duodecim mensura ad hordei
 quantitatem, & iuiubarum nimia est; nimisq; recedit à
 tradita ab auctore, etiam si graduata vtendum esset deco-
 ctione: minus recedunt ab auctore, qui sex sumendas esse
 censent: sed qui præter hordeum considerabit nullas ex-
 coqui res, quæ longam requirant decoctionem, etiam si
 graduata adhiheatur decoctio, non recedet ab in-
 stituto auctoris, potissimum si lento igne administre-
 tur.

Tragacā-
 ra & sem.
 maluæ quò
 excoquen-
 da.

Hæc. ser.
 quantitas
 aquæ quæ
 adhibenda

181. Quomocunque tamen fiat, semper illud erit
 obseruandum, debere dragachamam, & semina maluæ in
 linea tela rara inclusa excoqui, sæpius exprimi, vt eorum
 virtus siue multa visciditate communicetur; simulque ob
 hanc vnam causam percolari debet, dum calida fuerit:
 quod si refrigerit antequam saccharo addito paretur syru-
 pus, iterum calefieri debet, & percolari.

182. Ne quis tamen censeat in syrupo de hyssopo adeo
 paruum aquæ quantitatem sufficere, cum quantitatis aquæ

nul-

nullam faciat mentionem Mesue: cum enim præter hor-
deum fructus continent crassæ substantiæ, vç & semina vi-
scidiora, cum radices, & dragacantum; cum præterea lo-
co sacchari penidia ad syrupum parandum assumat, nisi
sufficiens aquæ quantitas indatur, formam potius elegma-
tis parabimus, quam syrupi. proinde placet eorum opinio,
qui octo libras aquæ sumendas censent, ac graduatam pa-
rari debere decoctionem.

Absintij
syr. quan-

183. In Syrupo de absintio primum dubitant quodnam
absintij genus indendum sit; cum Romanum hic exposcat Romano
Mesue, & lib. simpl. cæteris præferat; cum Diosc. & Ga-
lenus & 6. simpl. c. 1. & in libris methodi, Pontico potius
etiã in ijs, ad quæ conferre hic Mesue asserit hunc syru-
pum, primas tribuat. Ego certe cum Romano componen-
dum cum Mesue censerem, si & materias in ventriculo
contentas attenuare, in tunicis ventriculi imbibitas at-
tenuatas detergere, & subducere per aluum voluerimus. at si
ventriculum roborare voluerimus, si epar infarctu liberare
decreuerimus, & materias attenuare, cumque aliqua ad-
strictione mediocriter exalefacere, Pontico utemur:
& quemadmodum primum illum cum melle parabi-
mus, ita alterum cum saccharo componendum iudica-
mus.

do cum
Romano
& quando
cum poti-
co paran-
dum; quã-
do cum
melle, &
quando
cum sac-
charo.

Absin-
tium sic-
cum i syr.
imponen-
dum.

184. Sed an cum sicco, an cum viridi parandus? Desse-
tius & aliqui alij viridi vtuntur, vt succorum minorem
absorbeat quantitatem. At in ijs, quæ adstringendo robo-
rant humiditas obest, & propterea in syrupo de citonijs, &
in miua aromatica, cum succi actu humidi sint, vt ali-
quam potentialem acquirant siccitatem, Mesue cum actu
id obtinere non possit, elixatione potentialem augeat, sic
mentha, sic absintium, cum humiditate adstrictionem im-
pediant, exsiccati debent, & decoctis sicca imponenda, vt
adstrictionem adaugeant.

Absyntij
& liquo-
rum quan-
titate ser-
uata in in-
fus. & de-
coct. quò

185. Sed quoniam experientia constat, si absintij, succi parati syr-
rosarum, & eam quantitatem specie in libris quinque possit.

Coctio ad
tertiam, &
ad tertias
quid signi-
ficet, &
quò di stin-
guant.

191. Coquenda statuit simplicia hæc in lib. octo aquæ
ad tertiam. hic digladiantur viri sane quam diligentissimi,
an per hæc verba (ad tertiam) intelligendum sit ad con-
sumptionem tertiæ partis, an potius ad duarum partium.
Ego consumptionem ad tertiam intelligo tertiæ partis;
vbi vero ex tribus partibus duæ absumi debent ad tertias
scribendum erit. Colligitur id ex Gal. lib. 3. de compos.
med. 5. gen. cap. 5. vbi loquens de decoctione vini noui
dulcis ad spissitudinem, quam Sirceon vocant, nos. sapor
d'vua, dicit si ex vino dulci primo ex vuīs expresso pare-
tur, quia tenuioris est substantiæ, vt inspissetur, excoquen-
dum esse ad tertias; si verò ex secundo crassioris substan-
tiæ ad dimidias: per tertias non aliud intelligere potest,
quam ad consumptionem duarum tertiarum; si vera sunt,
quæ à Theophrasto scripta sunt lib. 6. de causis plant. c. 17
vbi crassiora dicit, & viscidiora citius condensari. sic è
contra sapam, quam nos mustum coctum dicimus, ad ter-
tiam elixatione consumimus. sed excoquendarum etiam
radicum conditio id persuadere videtur: in quibus exco-
quendis communi vñ, libram, in sex aquæ, ad dimidias
excoquimus. si nunc tantam ingredientium quantitatem
in duodecim aquæ & succi elixaremus ad duarum partium
consumptionem, & succi non attenuarentur, sed crassescer-
ent, & vis radicum attenuans & aliorum tenuiorum eua-
nesceret, etiam si graduationem admittamus.

In fumariæ
syr. maiori
per cassiam
fistulam
pulpæ eam
quantitatē
indendā.

192. In syrupo de fumaria maiori cum cassiæ fistulæ
vncias duas indendas esse præcipiat, non placet Ouiedi sen-
tentia, qui non medullam metiendam ad eam quantita-
tem, esse censuit, sed integram cassiam cum fistula, è qua
detracto cortice, tabellis, & seminibus succum tantum, qui
superfit, indendum censuit, nixus solo modo dicendi; &
Platarii auctoritate; cum tamen id communi omnium
sententiæ repugnet, & parua succi quantitas, quæ inde
extrahitur dislueat; nec quæ contra proponit vilius sint
momenti: quamuis enim aliquando medullam cassiæ, &
quan-

quandoque eiusdem pulpam exposcat; & quandoque cassiam fistularem, quam à feminibus expurgandam præcipit; non negandum tamen per cassiam fistularem etiam eius medullam significasse.

193. Non placent etiam ij, qui succum hunc cassiæ & Tamarindos non in decoctione ponendos censent, sed post, cum syrupum paramus, quod elixatione censeant aereas, & lubricantes partes dissipari; & non animadvertunt in confectione Hamech in sero elixari: & in hoc syrupo scribi, coque in libris iij. aquæ, post simul recensitas res ingredientibus, quamvis, cum non præcesserit infusio, & res diversissimæ sint substantiæ, graduata ex arte sit faciendi decoctio.

Graduanda decoctio ubi sine infusione res diversæ substantiæ coquantur.

194. Cum in syrupo de epithymo post enumerata & demensa ingredientia; nulla facta mentione liquoris in quo faciendi sit decoctio, neque subinde eiusdem quantitatis; quamvis omnes conveniant in aqua faciendam esse decoctionem, in illius tamen quantitate dissentiunt, alijs octo libras assumentibus, alijs tredecim, alijs decem, quam Brasavolus sequendam censuit, ac quantitatem, quam omisissæ Mesuem censetur, colligere possimus ex syrupo de fumaria maiori. Nobis hæc opinio magis placet, tum ob illam causam, tum quod inter extremas illas media sit; maximè vero, quod cum illa quantitate commodè admodum graduata illa decoctio parari possit.

Epithymi fvr. decoctio quantum aquam requirar.

195. At & in sacchari quantitate etiam dissentiunt, alijs vt Brasavolo, Sylvio, Cronemburgio, Cordo, Florentinis, & Mantuanis, libras quatuor indeutibus; alijs, vt Suardo, Calestano, Borgarutio, & PP. coment. Mesue solum tribus; ego quatuor impositis melius syrupum parari posse censerem.

In Epithymi fvr. quæ sacchari quantitas indenda.

196. Non est etiam quod in dubium vertamus decoctionem pro parando syrupo de stæchade ex aqua tanquam communiori liquore pro decoctis parandis esse faciendam: at in dubium vertitur illius quantitas: quæ ex quantitate

In stæchadis fvr. parando quanta aqua sumenda.

titate ingredientium colligi potest: quæ cum sit tredecim vnciarum, requirit libras octo aut nouem aquæ; atque graduata facta decoctione, reduci debet ad libras tres & tres vncias, aut ad libras tres cum semisse. quod ingredientia cum sicca & calida sunt temperaturæ actû sicca imponi debeant, & ob id aquæ multum absorbendum; non satis erunt septem, vt aliquibus placuit.

Liquiritiæ
syr. deco-
ctio non
fit gradua-
ta.

197. Cum in syrupo de liquiritia Mesueus in libris quatuor aquæ per diem & noctem infundat liquiritiam, capillum Veneris, & Hysopum, moxque ad consumptionem medietatis excoquat, dubitarunt aliqui, an post infusionem in decoctione paranda graduanda sit decoctio, cum tria illa diuersa sint substantiæ, nec eandem admittant coctionem. Aliqui singulorum singulas faciunt infusiones, & decoctiones; alij vna facta infusione, graduatam faciunt decoctionem, postremo loco capillum Veneris imponentes. Sed non placet recedere à verbis & sententia Mesuei, & ab ijs, quæ alibi constituta sunt; præstare tamen semper auctoris componendi modum sectari, qui simul tria illa infundenda in aqua præcipit, & excoquenda in aqua ad dimidias, nulla facta mentione separataram harum infusionum & decoctionum aut graduationis: & iure merito, cum decoctio hæc infusionem habeat præcedentem, per quam res infusæ quandam acquirentes vniionem vniiformiter possunt excoqui, vt in confectioe Hamechi, & pilulis alefanginis, & post in alijs est demonstratum.

In liquiri-
tiæ syr.
parando ro-
sacea fit
stillaticia.
Liquiritiæ
syrup. fit
crassioris
substantiæ
ob aquam
rosaceam
in fine ad-
dendam.

198. Aqua rosacea, quæ in fine parato syrupo addenda est, stillaticia esse debet ad balneum Mariæ, non per infusionem facta vt PP. commentatoribus Mesue visum est; nam lib. simplicium cap. 22. dum de aqua absintii stillaticia loqueretur, talem esse debere scribit qualis est aqua rosacea.

199. Vbi etiam annotandum, syrupum hunc cum melle, saccharo, & penidiis ita paratum, crassioris substantiæ esse debere, vt additis vnciis sex aquæ rosarum non andi-
geat

geat vltiori coctione, ne virtus aquæ rosarum euanescat, sed ea addita, fortiore aliquo leui ignis ad perfectam serupotum consistentiam reduci possit.

200. In syrupo de papauere obseruandum, melius esse illum æstate parare, quo tempore capita recentè collecta indi debent; ita tamen, vt ab illorum collectione dies intercedat, vt superflua illa humiditas absumatur, nec tamen ad siccitatem deducantur: & hæc est Galeni doctrina 7. comp. med. sec. loc. c. 2. ex Andromacho, Hera; & Democrate: quod confirmauit Paul. lib. 7. cap. 11. & Aer. lib. 2. ser. 1. cap. 135. quem secutus est Mesue in compositione, de iacur: decem capita papaueris recentia sumit media inter humentia & sicca. & hoc est, quod sibi voluit Auic. lib. 5. summa 1. Tract. 6. capita papaueris pro hoc syrupo ponens, quæ matura cum semine in planta quasi sint siccata.

201. In proportionem capitum papauerum ad quantitatem aquæ si quis varias cupiat videre antiquorum Andromachi, Hera, Damocratis, Critonis, Sorani, & Galeni aquæ ad ea per numerum capitum & sextarios aquæ; legere poterit Gal. 7. sec. loc. cap. 2. Nos, qui in Mesuei syrupo de papauere expendendo versamur, qui non capita, sed drachmas sexaginta horum capitum in quatuor libris aquæ, illud solum animaduersione dignum ducimus, aquæ quantitatem illam quatuor librarum, quam multi non satis esse posse censent ad sexaginta drachmas capitum excoquendas, ita vt libra cum dimidia superfit; si capita non sicca sumpserimus, & eam quantitatem satis esse cognoscemus, & ea portione, quæ superest decoctionis posse optimè parari syrupo, quod non multam absumant humiditatem, citiusque excoquantur.

202. Quamuis autem æstatis tempore, dum capita papaueris viridia demetiri possunt, syrupus is parari debeat, quod si succis vti velimus, maior quantitas capitum ad drachmas sexaginta constituendas requireretur: quod

Papaueris
capita in
syr. sint
recentè
collecta &
media inter
sicca &
humencia.

In Papaue
ris syr. que
ad ea
capita pro
portio.

Papaueris
syr. ex sic
cis capitibus
quò
parandus.

capita

capita nigri papaueris sicca, semina non contineant, & denique quod sicca, & cum longiorem requirant, & infusionem, & decoctionem, maiori indigeant aque quantitate: virgente tamen necessitate ex siccis etsi non ita validus parari poterit: quod ut melius præstari possit, quantitatem illam capitum in ea aquæ quantitate infundemus, ut illis ante depressis in aqua calente hæc illis per digitum supereminere per quinque dies, ut emollescant. mox eo usque excoquantur, ut compressa digitis dissipentur, tunc excolabuntur cum expressione, cum qua syrupus parabitur, sed semina papaueris nigri, quæ in decoctione viridium in capitibus continebantur, ne deficiant in hac quæ ex siccis paratur, cum exidere ex siccis soleant, triginta drachmas feminum nigri papaueris adiungemus.

Radices in
syr. & decoctis
2
ligneis par
tibus inter
nis reput
gandæ.

203. In syrupo de duabus radicibus illud pro certo constitutendum est, e radicibus cuiuscumque speciei eximendas esse ligneas omnes substantias internas, tanquam minuviles, & quasi excrementitias; quod manifestis verbis docuit Gal. lib. 2. de Antid. ca. 105. ut non recipi debeat Braſau. & Dess. sententia, qui id solum in radicib. calefacientib. præstandum esse crediderunt; quod in illis cortex calidior sit substantiæ; non in frigidis, quod lignosa pars frigidior sit: quasi si ratio valeret, non sit concludendum, tunc in frigidis solum interna lignosa esse vitendum, cortice abiecto; præterea non negabunt lignosam partem in frigidis esse siccam, & præterea quasi excrementitiam.

Radices,
calide sic
cæ, frigi
de humide
in decoctis
eligendæ.

204. Sed radices; humidæ, & recentes, an siccas: id. n. multum refert tunc ob variationem qualitarum, tunc pro quantitate aquæ, in qua excoquendæ sunt. Ego in universum conferem radices calefacientes, aperientes, deobstruentes, abstergentes, potius esse eligendas: quod tales munia illa melius exercere possunt. refrigerantes autem humedantes, mollientes, & laxantes, recentes & humidæ esse sumendas, ob eandem rationem. Doctrina hæc est

Gal.

Gal. lib. de attenuanti; victus ratione confirmata à Ferne-
lio lib. 4. Meth. cap. 9. Ita vt in hoc syrupo radices apij,
& feniculi sicca sint indenda, cicorij vero virides. & cum
sicca humidioribus difficiliter coquantur, graduanda erit
ex arte hæc decoctio.

205. At quæ acetæ quantitas erit indenda cum quantita-
tem determinatam non decernat, sed dicat sufficientem
quantitatem? secundum doctrinam supradictam, commu-
niter omnes quantitatem colligendam censent ex ijs, quæ
de syrupo acetoso tradita sunt, vbi simpliciore ex acetæ
duabus partibus, fortior ex quatuor, medium ex tribus;
& cum vnum in apothecis paratum habere debeant, me-
dium elegerunt: ita cum triplicem quoque acetæ mensu-
ram proportionem seruata in hoc indere possemus, mediam
eligemus, adentes fere duas libras ad proportionem deco-
cti & sacchari.

206. Si medicus in schedula scripserit syrupum de dua-
bus radicibus simpliciter siue additione cum aceto, aut sine,
tum alicubi etiam sine aceto paretur, non eum intelliget
pharmacopola, qui sine aceto est paratus, sed eum, quem
absolutè syrupum de duabus radicibus appellauit Mesue,
in quo acetum ponitur: si. n. medicus in aliquo morbo præ-
scribere voluerit, vbi acetum non conuenit, addere de-
bebit (sine aceto)

207 Syrupum Bizantium componens Mesue tum sim-
plicem, cum aceto, tum compositum cum succis, dicit
bulliant ebullitione vna: quibus verbis licet alias intellexerit
simplici vno seruire, hoc tamen loco simul vna & conti-
nuata, nec diuisa aut separata ebullitione esse excoquenda
omnia, desumatione facta, intelligit.

208. Quod autem dicit (cum facilitate) blando igne
& lento vult succos esse excoquendos: docuerat enim in
Canonibus, quæ valido igne elixantur, liquida impetu
ignis violenti subito quasi multa spuma eleuata eua-
nescere, & vires in tenuioribus partibus consistere.

Acetæ quæ
quantitas
in syr. de
duabus ra-
dicibus.

Per syr. de
duabus rad.
simpliciter
cum aceto
intelligem.
dur.

In Bizanti
no qui sit
ebullitio
vna.

Doctio dicit
facilitate
quod

absumi ac dissipari.

In Miua
citioniorū
quæ mellis
aut saccha-
ri quanti-
tas.

209. In miua citioniorum simplici licet Mesueus nullam mellis indendi mentionem fecerit, cum tamen in fine aliquos non malè loco mellis saccharum posuisse dicat, ex ijs alterutrum indendum demonstrauit. Sed quæ illius apponenda erit quantitas? optimè PP. Commentatores Mesue ex proportionem mellis cum succo & vino in miua aromatica colligunt; mellis, vel sacchari libras indendas esse viginti septem, quam opinionem etiam plerique sunt secuti. Si quis tamen miuam simplicem eam censuerit ac composuerit, quæ in composita descripta est, remotis speciebus, non aberrabit.

Aromati-
zatio syr-
porum quō
fiat.

210. Duplici modo obseruatum est, decocta, syrupos, & similia dici aromatizari; aut aromaticis speciebus raro linteo impositis, & in globum ligatis, liquoribus, dum decoquuntur, impositis; quo modo sæpe Auicennam, Serapionem, & Mesueum vsos esse passim obseruamus, fortasse Soranum Græcum scriptorem imitari apud Gal. 7. de comp. med. 5. loc. c. 2. Aut speciebus ipsis, aut per se, aut liquore aliquo dissolutis, liquoribus efferuescentibus admixtis, vt factum videmus à Mesueo in syrupo, de mentha, de Thymo, de calamento, & alibi sæpius. In Miua citioniorum aromatica virunque genus hoc aromatizationis coniunxisse videmus. primo quidem dum species alefanginas siue aromaticas linteo raro inuoluras, vino, succo, granatorum & melli, dum feruent, imponit; altero cum in fine decoctionis ad communicandum suauem odorem miuæ imponit moscum, & Galliam. quo modo etiam duplici vsum scimus Serapionem lib. de Antid. T. 7. cap. 23. & Auicennam in Miuis.

Miua aro-
matica quō
aromatizā-
da.

211. Sed quo tempore species eæ aromaticæ linteolo inuolutæ, vt aromatizentur syrupi, erunt imponendæ? non vt Brasauolo placuit in principio coctionis, vt & caliditate, & odorem maiorem nanciscantur; potius enim minus longa coctione exolecent, & minus odorem com-

mun-

inunicabunt: sed cum mel aut saccharum clarificatur: tunc enim hoc loco Mesue Galliam & moschum in linteolo, succis & vino cum primis aromatibus ebullitis imponenda docuit. Hoc etiam docuit Auicenna lib. 5. Tract. 6. Summa prima in parando syrupo cum seminibus, in iuleb cum aqua rosata, & alibi, & est doctrina Arnaldi de Villanova in suo Antidotario in tractatu de syrups.

A quibus omnibus docemur, ut cum horum fir decoctio, saepe globulus is cochleari ad latera vasis comprimatur.

212. Neque tamen placet, quod aliquibus visum est, quodque video placuisse Brasauolo; ut cum post confectionem syrups, dum in vase proprio reponitur, globulus ille simul in eo vase reponatur: crassities enim mihi id nec admittit, & sine fructu esset, linteique conditio ei repugnat. Neque verba Mesuei (suspende in syrups) id persuadent: neque enim verba illa respiciunt tempus repositionis, sed coctionis.

213. Quæ verò ad aromatizationem imponuntur species, & aromata crasso modo esse terendas; & Mesue hoc loco præcipit, & communis est omnium componentium opinio. Neq; ijs repugnat Auic. lib. 5. Tr. 6. Summa prima in Rasaton, ubi species aromaticas subtilissime conterit. in proximis enim compositionibus aromata crasso modo conterit, in hoc vero subtiliter, ut cum odore, & qualitatibus, eorum quoque substantia liquori communicaretur.

214. Sed cum aromata alia crasso modo contrita ponat, crocum integrum imponendum duxit. quod & à Serapione, & ab Auicenna in suis miuis factum videmus: cum in alijs syrups & decoctionibus crasso modo contritum tepius positum obseruauerimus. Causam colligemus huius varietatis ex Gal. 6. med. local. cap. 1. ubi dicit crocum tenuium adeo esse partium, ut si diutius in aliquo liquore excoquatur, vires illius exsoluantur: cum hic autem adeo longo tempore perduranda sit hæc succi citoniorum & vi-

Aromatū
globuli in
vase non
seruandi.

Aromata
pro aroma
tizatione
parum tri
turanda.

Crocus quo
decoquen
dus.

ni decoctio, vt libræ illorum viginti quatuor absumi possint, cum ob hanc causam aromata crasso modo conterenda decreuissent, integrum crocum imponunt, quod illis adhuc subtiliores habeat partes. At vbi in fine decoctionum ponitur, aut leuiter effernere in liquoribus debet, satis duxerunt, si crasso modo contereretur.

DE EX-
TER-
NIS.

Animaduersiones hactenus cum simus profecti, quæ ad medicamenta composita pertinent, quæ per os sumuntur, quæque in compositione, aliquam, & medicis, & pharmacopolis inuehere solent difficultatem; nunc aliqua attingere auimus est circa ea, quæ extrinsecus apponuntur, & ex ijs solum olea, vnguenta, & cerata à nostris dicta persequemur, ea solum eligentes, quæ aut aliquam in eorum compositione habent difficultatem, aut declaratione aliqua indigent: ab oleis auspicantes, à quibus cerata, vnguenta, & emplastia magnam suæ compositionis partem mutuuntur: primumque attingam quæ per expressionem trahuntur: deinde ea examinabimus, quæ per impressionem seu infusionem parantur, pauca in simplicibus annotantes, fusiores aliquanto plus futuri in compositis: postremo aliqua etiam attingemus in ijs, quæ per ascensum & descensum eliciuntur.

Oleum oli-
uarum no-
uum quò
ad veteris
naturam re-
ducatur.

215. Oleum ex oliuis expressum tanquam commune primum veniat considerandum; quod cum multum differat nouum ne sit, an vetus; cum illud humidum magis, & moderate calidum; vetus vero magis calidum, humidum minus. 6. simpl. Gal. & Diosc. l. i. c. 28. Vtunque igitur pharmacopola paratum habere debet ad varias medicamentorum externorum parandas compositiones. At vbi vetus ad manus non fuerit, Galenus. 6. simplic. & i. locallium med. cap. 3. cicinum laudat; sed quia hoc etiam ferè caremus, ibidem Gal. oleum elixatum; non tamen vt Dioscoridi placuit cap. 27. primi libri, à quo accepit Serapio lib. simpl. cap. 5. hoc inspissari debet ad mellis consistentiam: præterquam enim quod impossibile esse docuit

Arif.

Arist. 4. Meteor. cap. 9. oleum elixatione incrassari, per eandem potius scimus partes crassiores attenuari, quod contrarium est naturæ olei veteris.

216. Oleum ex oliuis immaturis, quod omphacinum appellant, quodque cum adstrictione nonnihil habet refrigerationis, si in usum primo anno ducatur illas seruat facultates: at si diutius conservetur, illas amittit, & non secus ac dulce contrarias acquirit facultates. ne igitur sine nostro frustremur, colore viridi non contenti, sapore potius experimentum de eo faciemus. est hæc Gal. animaduersio. 6. simp. cap. proprio, & Atic. lib. 2. cap. 530.

217. Quoniam tamen olearii, quod ex immaturis oliuis parum olei exprimunt, ut nos decipiant & colore & sapore, dum maturas exprimunt, folia tenera admiscunt, ut & viridem acquirat oleum colorem, & adstrictionem: quod quamvis similem fere inducat qualitatem sic docente Gal. 6. simpl. cognoscitur tamen, quod cum colore viridi iunctam non habeat limpiditatem, nec saporem illum acerbissimum præ se ferentem.

218. Ferenda tamen magis est hæc industria, quam eorum, qui ut colorem illum viridem oleo communicent, æreo vasi, maturo oleo per longum tempus imposito, & operimento eiusdem metalli post supraposito, atque temperato igne oleo excalescens viridem colorem oleo conciliant: cuius usu quanta ægris damna induci possint, vel idiota quilibet intelligere potest. Sed fallacia detegitur ex crassiori substantia, viriditate sine luciditate, potissimum autem sapore non acerbato, sed acris, & linguam vellicando mordicante.

219. Oleum ex amygdalis cortice expoliatis, & in mortario confusis per torcular expressis licet fiat, cum vario modo cortice spoliatur, variatur etiam perfectione: nam quod per ignem exsiccatum cortice extrahitur, nonnihil empyreumatis acquirit, & si bibatur, aut lambatur acrimoniam vellicando ostendit: quod per aquam calidam de-

Oleum
omphaci-
num tem-
pore matu-
rescit.

Oleum om-
phacinum
quò adul-
teretur, &
adultera-
tum cogno-
scatur.

Olei om-
phacini fal-
sificandi
ratio, & il-
lius dete-
ctio.

Olei amig-
dalini ex-
trahendi va-
riæ rationes
& quæ re-
cipiendæ.

N tracto

tracto cortice fit, aliquanto crassius conspicitur; vt & quod per euaporationem ex aqua effervescente in linteo in orificio posito cortice priuantur amygdalæ, satis laudabile est, sed nec adeo clarum, nec tenue relinquitur. Quod igitur aquæ frigidæ immerfis per quinque saltem dies, cortice spoliatis amygdalis, & in mortario contusis & calefactis exprimitur, primas tenet, nisi illi præponatur, quod ex ipsdē cortice cultro deterſo fit. Sed quoniam sæpenumero vrget necessitas breui tempore ob vehementissimos dolores recens habere oleum amygdalinum, vt per os exhiberi statim possit, omiſſa prima specie, qua amygdalæ per ignem exſiccata, cortice amiſſo piſtata oleum cōpreſſione nobis dant, conueniet magis aqua calente expoliatis amygdalis, & in mortario contusis statim

Olei roſati oleum exprimere.

parandi 220. Inter olea, quæ per infusionem simplicem modus, & sunt agmen ducet oleum roſarum, cuius parandi roſarum ad modi cum varij à Meſue tradantur, primus ſolus à oleum quæ pharmacopolis debet & ſolet eligi; ſed cum nullam eſſe debeat roſarum & olei quantitatis mentionem faciat, neque proportio. proportionem roſarum ad oleum apponat, video adeo differentia perfectione olea inter ſe roſata: ſed neque ſolum ob hanc cauſam: ſed quod impatientes laboris non eam adhibeant diligentiam, quam Meſue requirit, neque in numero infusionum, neq; in infolatione, neque in coctura in duplici vaſe. Quinimo multi, vt diligencias has & labores effugiant, omiſſo hoc Meſuei componendi modo Galenicum ſectantur traditum cap. 1. lib. 2. de comp. med. ſec. gen. Ne igitur ob ignorantiam quantitatis roſarum, & olei, & eorundem proportionis, perfectiſſimus ille componendi modus omittatur, cenſeo eam quantitatem roſarum ad oleum in hac infuſione eſſe ſeruandam, quam in earundem infuſione in aqua pro ſyrupo parando

rando seruat, sex nempe librarum ad quindecim. Sed quoniam aquæ ob tenuitatem facilius imprimitur rosarum facultas, quam fieri possit in oleo; vt in illa octo horæ infusionis satis sunt, ita in hac in oleo septem dies requirit: postque exposcit vt in duplici vase etiam simul elixarentur, & ob hanc ipsâ causam ter id esse præstandum censuit, vt oleo melius rosarum virtus imprimeretur. Hanc autem rosarum ad olei proportionem esse, ex mente Mesuei colligitur ex compositione olei de alcanna; quam faciendam præcipit, vt sit oleum rosatum, in qua quatuor vncias florum ponit in decem olei, quibus in libras mutatis facile quilibet intelliget omnino in oleo rosato parando eam esse rosarum ad oleum seruandam proportionem.

221. Sed multi, vt Mesuei diligentiam effugiant, Olei Rosæ Galenicum parare profitentur traditum libro 2. de comp. med. sec. gen. cap. 1. Sed video eos in maiores incidere difficultates, cum ibi nec quantitatis rosarum, infundendarum, nec olei excipientis, nec temporis moræ rosarum in oleo, nec ebullitionis in duplici vase, nec expressionis, vlla fiat mentio: sed solum dicit soli per duos aut tres menses esse exponendum, vase vitreo sæpius agitato: qui modus parandi oleum rosatum cum obscurior sit, minori que diligentia peratus, minorem quoque afferet vtilitatem. Propterea Mesuei modum omnino insequendum censeo.

222. Sed quo oleo vtetur, an maturo & dulci; Oleum ro- an omphacino & acerbo? Placuit aliquibus omphacinum; moti hi sunt Gal. auctoritate cap. 1. lib. pliciter ex 2. de comp. med. loc. & lib. 3. cap. 1. ubi olivis manon animaduertunt curare ibi dolorem capitis ex turis. aestu, in quo ab initio dicit conuenire oleum ex oleis immaturis. vt & lib. 3. cap. 1. ubi curat inflammationem instrumenti auditus. in quibus ca-

sibus tali oleo vtendum docet. At cum absolute oleum rosatum expetitur, ex dulci & maturo factum intelligi debet. Gal. enim. 2. simpl. cap. 27. agens de oleo rosato in communi, nulla habita ratione alicuius morbi aut partis particularis, dicit oleum eligendum esse naturæ mediæ: quod omphacino conuenire non potest, quod frigida est naturæ, & adstringemis. Quod vero mediæ est naturæ, neque frigiditate, neque calore debet præualere, vt frigidis admixtis frigidum reddi possit, & calidis calidum: vt docet Gal. 2. simpl. cap. 22. qualis est cera in vnguentis & ceratis. Rectè autem præparatum esse & respectu quantitatis rosarum, & moræ, tum debita decoctionis, cognoscemus ex odore, tum etiam si telam aut papyrum eo intingamus, colore rosarum inficiet: malum etiam erit, si rancidum nescio quid, aut acidum oleat.

Olei rosati
Galenici
verbis pa-
randi mo-
dus.

Violaceum
oleum fit
ex ompha-
cino.

223. Hæc quanquam in præparando oleo rosato primo modo Mesuei proposita sunt tanquam præstantissimo, frustra tamen pharmacopæis proposita fere video, quod ob laborem & dispendium iam desierit esse in vsu, Galenicum potius sectantes per insolationem: sed vtinam etiam & infusione in repererent, & præcederet elixatio in duplici vase, mox sequeretur adeo longæ insolatio: sic enim saltem odorem haberemus oleum; quod sæpe non nisi rancidum quid olere sentimus.

224. Violaceum cum plerumque in vsum veniat in mitigandis inflammationibus, etsi non more Mesuei parare voluerint per infusiones, decoctiones, & insolationem; sed solum per longam insolationem, censéo tamen ex oleo omphacino esse parandum, & si alia in re Mesuem imitari in hoc volumus, saltem eum sequamur in eligendo oleo, qui viride eligit, quale potius esse scimus omphacinum, quam maturum, id enim (viride) cum plerisque significa-

re cenſeo; quicquid Ouiedus cenſeat, qui (viride)
d'eſt recenter factum interpretatur, quod recent-
er collecta folia aut flores viridia dici, ſolent; non
animaduertens folia viridia dici, ad differentiam
iccorum, quæ pallida & cineritia exſiccata red-
ſuntur, cum recentia eſſent viridis coloris: quod
in liquoribus dici res eſt à ratione aliena.

Multa eſſent, quæ, & ad ſimplicia olea tum
expreſſione, tum infuſione, tum extractione per
ſeſcenſum, & composita pertinent, à me hoc loco
apponenda; ſed, breuitati conſulens ea omittenda cenſui.

225. In vnguentis aliquantisper eſt verſandum,
non quidem ſic Græcis appellatis, ſed ijs, quæ
Mauritanis ſic ſunt appellata: quæ ſunt compositio-
nes molles ex herbis, partibus earum, metallis,
& mineralibus, terris, partibus animalium, ſubſtan-
tia mediocres inter dura cerata & mollia: quæ
& ratione rerum ingredientium, & modi compo-
nendi, & ratione proportionis ceræ, olei, & alio-
rum, puta, axungia, gummatum, & puluerum
varias obtinent componendi rationes, quas etiam ex
tempore anni aliquam habere debere differentiam
ex eo conſtat. nam æſtate ceræ quantitas ſemper
maior eſſe debet, quam hyeme: quæ ceræ men-
ſuræ varietas ex ceræ conditione pendeat, ſi re-
cens, an ætate ſiccata; ſi mollis & pinguis, an
macra; & ex ratione puluerum magis aut minus ſicca-
rum & abſorbentium; vt in ijs potiſſimum cognoscat
artificis peritia.

226. Vnguentum Apoſtolorum Auic. quamvis vide-
mus florem aris continere, quem ab æruginè differe do-
cuit Dioſc. lib. 5. cap. 42. communis tamen omnium
ſcribentium eſt ſententia, intelligere æruginem; ſic PP. cō.
Meſue, ſic Marthæolus lib. 5. cap. 48. ſic Deſſenius,
Syluius, Cordus, ſic alij omnes.

Vnguenta
Maurita-
nis quæ
ſunt. & ex
quibus.

Apoſtolo-
rum vn-
guento pro
flore aris
æugo in-
denda.

**Aerugo a-
ceto prius
seper mace-
randa.**

**Aerugopost
alia in vn-
guento Apo-
stolorum in-
denda.**

**Anic. error
in. Aposto-
lorum vn-
guento pa-
rando.**

**Anic. error
in vng. A-
postolorum
in ceræ qua-
titate.**

227. Debet autem, & in hoc vnguento, & in alijs antequam in vsum ducatur, prius subtilissimè ea puluerizata aceto acerrimo excepta, soli per multos dies exponi: hæc est doctrina Gal. 2. comp. med. 5. gen. c. 1. in Emplastro viridi Potamonis, & lib. 3. eiusdem, cap. 5.

228. Aeruginem hanc non ante, sed post aliarum rerum mixturam imponendam præcipit Galenus loco citato, & Paulus lib. 7. cap. 17.

229. Optimè animaduertit Ouietus in hoc vnguento Auic. errorem, quod æstate in parando hoc vnguento duas olei libras, hyeme tres imponat. sic enim iisdem viribus aut æqualibus, vtroque modo paratum non experiemur: imbecille enim semper erit illud in quo olei maior ponetur quantitas, aut ceræ; quæ admiscetur solum ad constituendum corpus vnguenti. si vera sunt, quæ à Galeno tradita sunt. 3. de comp. med. sec. gen. c. 6. in compositione medicamenti ex Euphorbio & lib. 5. eiusdem cap. 1. in fine. Quem etiam optimè corrigit eodem modo tam hyeme, quam æstate, respectu olei & ceræ illud parans, duas semper olei libras addendas censens.

230. Errasse etiam constat in ceræ quantitate, quatuordecim tantummodo drachmas illius addens, quæ tantilla quantitas quomodo cum alijs ingredientibus possit in vnguenti formam alligare duas aut tres olei libras, vix peritus artis potest intelligere; si Galeni sequamur doctrinam. 3. de comp. med. sec. gen. 6. qua statuitur pro qualibet libra olei addendas esse tres vncias ceræ. cui errori, sic occurramus, cum libræ duæ olei & drachmæ quatuordecim ceræ constituant vncias viginti quinque drachmas sex: cum oleum, & ceram minimum quid medicamenti cum Gal. 3. de comp. med.

5. gen.

3. gen. cap. 3. & lib. 6. cap. 7. sed materiam ac consistentiam parare dixerit; nihil referre videtur, si in eadem simul mensura consistentes, quadruplum olei ad vnam ceræ proportionem seruantes, vncias viginti & mediam, & paulo plus vncijs ceræ admiscientes vnguentum parauerimus. Quæ regula in alijs quoque vnguentis, vbi virgeat necessitas, seruari tutò semper poterit.

231. Iure merito dialtheæ à Nicolao descriptæ componendi modus à plerisque reprehenditur, quamuis vnguentum tale tanquam præstantissimum commendetur. Neque enim ex libris quatuor cum semisse rerum viscidarum in aquæ libris septem, commodè mucilago exprimi potest; potissimum cum res illas in aqua calida non infundat. docet enim experientia libram vnamquamque viscidarum rerum pro mucagine extrahenda libras quatuor aquæ exposcere. quod si pro singula libra duæ solum aquæ sumantur, vix exprimi mucaginem ob visciditatem posse, experiemur.

232. Neque probatur, quod, vt huic fortasse incommo-
 commodò occurrat, facit, addere post factam mucilaginem post tres dies infusionis duas libras aquæ calidæ, vt mucago liquecat. Cur enim potius ab initio debitam non posuit aquæ quantitatem: septem præterea parare mucaginis, vt duabus solum utamur, res videtur superflua. Semina terere amethodum est; percolationem enim mucaginis impediunt; & propterea omnes in mucagineis eliciendis integra ponunt. ob difficultates has tot sunt huius vnguenti varij modi componendi, quot sunt pharmacopolarum tabernæ. cui incommo-
 dum vt occurramus, hoc modo parari poterit tota Nicolai quantitate ad quartam deducta. Recipe radicum altheæ mundatarum, lotarum, & rufarum v.c. iij.

Dialtheæ
 compositio
 Nicolai
 defectuo-
 sa in pro-
 portione a-
 quæ ad ex-
 trahendas
 mucagi-
 nes.

Nicolai al-
 ter error in
 Dialthea.

Dialtheæ
 vera de-
 scriptio.

sem. lini & fenugræci an. unc. iij. scillæ albæ recentis, mundatæ, & cultro ligneo vel osseo incisæ unc. vnam & med. infundantur in libris tribus cum dimidia aquæ calidæ, semel aut iterum singulis tribus diebus macerationis agitando, quarto die igni apponantur, donec ferbuerint, & tunc per cannabinam telam raram ita calentia percolentur; seuuato liquore, mox adhuc calentia exprimantur torculari, aut etiam post manibus ubi refrigerint exprimantur, vt totam reddant mucaginem, adhibita etiam in subsidium portione liquoris, qui prius defluxit, donec tota mucago extracta sit. tandem olei libra vna addatur, & tandiu simul excoquantur, quandiu liquorem aqueum exhalasse viderimus, mox addentur ad proportionem semper quartæ partis resina pinea, & cera flaua, & ab his liquaris terebinthina; deinde admiscebitur galbanum vino cretico flauo liquatum, mox Colophonia puluerizata, & gummi hederæ, & per setaceum traducta, vnguento frigido addantur, & spatula agitentur, ad vnguenti consistentiam.

Vnguenti
ex plumbo
veta pa-
rati ratio.

232. In vnguento de plumbo, neque hic quomodo comburatur plumbum, neque quomodo lauetur tam non combustum quam combustum, neque quomodo in vsum duci possit sine combustione, neq; similia de Antimonio scribere est necesse; quod & à Diosc. & à recentiorib. diligenter sint tradita; solum perpendemus qua mensura apponendum sit oleum rosatum, cum solum apponatur quantum ex arte satis est. sunt qui in vnguentis ex metallis paratis & oleo pro singula illorum vncia selibram ponunt, sicque cum mineralium sex vnciæ hic imponantur tres olei essent indendæ. sed quia hoc modo paratum minimæ est efficaciz, crediderim duplo olei rosati ad metalla addito, validius, & magis ex Me-
fuci

fuei decreto parari, calenti oleo metallis admixtus, & ferrea rudicula permixtis.

233. In parando eo sine cera, vt plerique faciunt luplici via proceditur. metallis enim, & oleis, simul in mortario positis sæpius simul agitatis diutius denique ad formam vnguenti reducitur; aut si in vase isdem igni appositis, diutiusque rudicula commixtis, tandem vnguenti consistentiam acquirunt. Sed primus modus illud habet incommodi, quod repositum in vase, breui metallica subsidere videmus & oleum supranatare: secundus modus illud habet incommodi, quod dum super linteum extenditur, oleum vndeunque dispergitur, ac vlceri impositum oleo ex se segregato relictis in vlcere pulueribus exsiccatur. Præstat igitur ceræ aliqua portione addita, & tantundem olei sublata quantitate, nempe nouem vincijs ceræ additis, & duabus solum olei rosati libris cum tribus vincijs impositis vnguentum formare.

234. In vnguento de tuthia siue de cadmia, illud solum addendum animaduertis ab alijs, non succum granorum rubeorum solatri imponendum esse, vt Guidoni placuit, sed fol. herbæ morel-
lae.

235. Vnguentum rosatum Mesuę maximè vñtatum est, sed sæpe obseruauim negligenter esse paratum, non adhibita diligentia in axungia electione, in eiusdem lotionibus non repetitis, in quantitate olei amygdalarum. sed si quis diligentiam Gal. lib. 1. comp. med. sec. gen. 6. in electione axungia, fibrarum ablatione, & lotionem obseruauerit, & modum componendi Mesuę, non aberrabit. quod magis difficultatem facit est quantitas olei amygdalarum dulcium. cum enim in aliquibus traditionibus legatur olei amygdalarum dulcium partes sex, & in alijs pars sexta. maximam inducit varietatem, nam si per partes libras su-

Vnguentum de plumbo siue ceraquæ recte paratur.

In vnguento de tuthia solatri succus vnde extrahendus.

In Vnguento rosato quotâ tas olei amygdalarum dulcium iudenda.

mamus, & axungia rosarum, si partes in libras sex mutemus, & succi rosatum in tres; si partes sex olei amygdalarum legamus, libras triginta sex indendas censeremus, si vera est doctrina Gal. lib. 3. de comp. med. sec. gen. cap. 5. sed si sextam partem legamus, libra vna indenda solum esset, quod ut illud absolum rationi, ita hoc maxime est canonibus Mesuei correspondens. quoniam si etiam sextam partem illius imponamus, liquidius redditur, & facile rancescit. multi oleum illud omitunt. sed si non discedere à Mesuei præscripto voluerimus, minuemus solum illius quantitatem, idque ex arte, cum pro ratione conditionis substantia axungia augenda, aut minuenda sit.

In Agrippæ

unguento

persu-

cid. cucu-

mis agre-

stis intelli-

gitur.

Triuli ma-

riui non fo-

lia, sed ra-

dices inden-

dæ in vn-

guento. A-

pl. 3. cap. 140.

grippæ.

In Popu-

leo vngue-

to quid e-

culi popu-

lei.

236. In vnguento Agrippæ non est, quod dubitemus per rad. succid. intelligere radicem cucumeris asinini, de qua re valde dubius erat Desse-
nius, cum in vnguento Aragon, quod hic abbreviauit, ibi extendit, succidis, quod euenneris asinini significare, antea docuerat Ruellius lib. 3. de nat.

237. Tribuli marini non folia, sed radices asinini debent, & in eius defectu terrestres radices asinini poterunt, quod eiusdem vtrunque constituunt
virtutis Diosc. lib. 4. cap. 13. & Gal. lib. sim-
pl. 3. cap. 140.

238. Populeum vnguentum, ut commune est omnibus Pharmacopolijs, ita non vno consensu præparatur; aliquibus per oculos populi intelligentibus
leues illos lanugine plenos fructus arboris ipsius, racemi ad modum coherentes; qui quamvis ob similitudinem quandam cum oculis excusari aliquo modo possint, in errore tamen versantur, cum per oculos populi Nicolaus intelligat globulos illos in prima germinatione frondium apparentes, quæ ini-

tiō augmenti concanitate quadam oculi formam representant, vt optimē contra Ruellium ostendit. Matthæolus lib. 1. in Dioscor. cap. 93. in quem etiam errorem inciderat Hermolaus Barbarus in Corollarrio cap. 117.

239. Quoniam autem modus componendi huius *Populei vnguenti* à Nicolao traditus impossibilis est, cum *vnguenti parandi modus.* tercio die post pistatos oculos populi, collectis omnibus herbis & pistatis, misturæque oculorum cum

porcina axungia remixtis, per nouem dies omnia ex libra vna vini odoreferi excoquenda docet; cum tempore eruptionis oculorum populi, quod est circa principium Aprilis, aliæ herbe pleraque nondum eruperint, potissimum selatrum, quod est herba morella dicta, quæ in suo vigore esse non solet nisi ad principium Augusti. propterea ita in componendo erit procedendum. Oculi populi suo tempore collecti pistentur, & axungia porcinæ à membranis expurgatæ & lotæ permisceantur, & vase figulino vitreato excepti operculato, reponantur eo vsque, dum cæteræ stirpes expetite possint haberi satis adultæ & vegetæ: quæ vbi collectæ fuerint, & à sordibus purgatæ in pila teruntur, & mixturæ priori asservatæ & fermentatæ concorporantur, atque rursus in loco tepidiori per integram saltem hebdomadam fermentantur. postea in cacabo ponuntur cum libra vna vini, & bulliant ad consumpticum vsque vini cum spatula semper agitando, postea per sacculum bene omnia colentur, abiectionisque herbis, nocte integra dimittatur liquor, nocte quicquid coagulatum supernatauerit, vase vnguentario reconditur.

240. Comitissæ vnguentum à Varignano inuentum, vt efficacissimum, & propterea maximè vscutatum, ita in eo componendo multas continet dis-
Comitissæ vnguenti componendi ratio.

scultates, primum enim cum medicamentorum pri-

mam

nam decoctionem ingredientium, licet aequalem esse debere mensuram per dictionem (ana.) demonstrari; certam tamen mensuram eorum non præfixit, ut nec aquæ: quamuis quantitate medicamentorum cognita, aquæ quantitas per canones decoctionum cognosci possit; quod tamen non leue subit discrimen, si magna sit medicamentorum & aquæ quantitas, aut parua, quia in magna cum longior fiat ebullitio, efficacior redditur decoctio. Secundò, in formando vnguento, ceræ, & olei, quantitatem non apposuit, quod animos pharmacopolarum ambiguos reddit. tertio, quæ quantitas medicamentorum illorum, quæ puluerizata & ceræ & oleo admixta constituere vnguenti formam debent, non est perscripta. In lotionne præterea aliqua etiam annotanda sunt, & aliqua in medicamentis ingredientibus. Ut igitur ijs satisfacere possumus, primo tertiæ difficultati satisfaciendum erit, ex cuius explicatione alijs facilius satisfiet. Cum per partes, non per determinatam mensuram ingrediuntur medicamenta simplicia compositum aliquod, docuit Gal. 3. de comp. med. sec. gen. c. 5. posse nos sumere, quam velimus quantitatem, modo seruemus in reliquis proportionem: si igitur in dicto vnguento propuluerum primorum parte vna, vncias duas sumamus, & secundarum parte media vnciam vnâ, ex quibus resultant vnciæ undecim; si ex ijs pulueribus partes faciamus ijsq; partem vnâ pendentibus ut alterutram earum partium addamus pulueris trochiscorum de charabe, quæ erit vnciarum quinque cum semisse, sic constituentur omnium simul vnciæ sexdecim cum semisse. Ex quo etiam quæ ceræ & olei quantitas indi debeat non ita difficili negotio decerni poterit, cum sua puluerum cum oleo & cera sit ex arte proportio. quam primo docuit Gal. 3. & 6. cap. lib. de comp. med. sec. gen. & Paulus lib. 7. cap. 17. postea vero

vero Neoterici etiam explicarunt, ut ad libram olei quarta pars ceræ nempe uncia tres, & puluerum quartæ partis media pars, quod est uncia vna cum semisse; quibus huic vnguento applicatis, cum pulueres constituerimus uncias sexdecim cum semisse, olei libras vndecim imponemus, & ceræ libras vndecim & uncias nouem. Cum autem Varignana non præfixerit certam quantitatem puluerum, sed per partes medicamentum constituerit, & descripserit, certam neq; medicamentorum simplicium in decoctione ingredientium, neq; aquæ quantitatem præfigere poterat, quia hæc discernenda erat ex quantitate vnguenti parandi. Cum igitur per partes uncias sumperimus duas, singulorum uncias quatuor, vnde omnium simul resultabunt libræ tres & uncia octo, ad quam quantitatem elixandam requirentur lib. quindecim aquæ, & illius tribus libris per elixationem absumptis; sicque duodecim libræ supererunt, quæ in nouem partes diuidendæ erunt, ad nouies lauandam ceram & oleum myrthinum. In corticibus eligendis castanearum, mediam eligemus inter spinosam, & internam vestientem fructum. in glandibus illam eligemus non externam duriusculam, sed internam subtilem glandem vestientem; ex ligno etiam pelliculam sumemus sub cortice crustaceo lignum vestientem. sorbos & mespilos immaturos etiam sumemus, qui acerbi collecti statim exsiccati debent sole, vel furno, ne maturescant.

241. Vnguentum de Arthanita maius Mesuæ dignissimum est, quod paratum in officinis conseruetur, sed in eo multa sunt animaduersione digna. primum, ut Cyclaminis eam speciem sumamus, quæ maior dicitur; & ex cyclamine radicem eligemus ex Auic. lib. 2. c. 6 2. vnde virtutes cyclaminis recensens Diosc. lib. 2. cap. 156. radicem illius solum virtutes recenset.

Arthanæ
vnguentum
Cyclaminis
maioris
radicis
recipiat.

242. Oujæ-

Succ. cru-
di Cycla-
mini su-
mēdi in Ar-
thanita.

242. Ouidius optimè animaduertit, quod quam-
uis Mesueus capite de cucumere asinino doceat ex
eo elicere succum, & exsiccare in modum scam-
monij, & Diosc. libro 2. cap. 156. succum ex
radice cyclaminis doceat per elixationem deduce-
re ad mellis consistentiam, in hoc tamen vnguen-
to succos viriusque ex radicibus expressos & per-
colatos indendos esse: si enim pulueres succis ijs
sunt immergendi per dies octo, & post leui ebul-
litione elixandi; neque concreti, neque ad mellis
consistentiam deducendi erunt: & si addito sagape-
no & myrrha excoquendi sunt ad succorum fere
consumptionem, crudi & liquidi erunt imponendi.

Scammo-
nium in ex-
ternis sem-
per bene
trituran-
dum.

243. Quamuis etiam scammonium docuerit Me-
sue vario modo esse tritrandum cap. de tritratio-
ne: raram enim & leuè parum conterendum;
multum autem, crassum & durius. id tamen solum
intelligitur in medicamentis per os assumendis; non
tamen in externis, in quibus, vt vis purgatrix ad
interna permeare possit, subtilissimè semper erit
puluerizandum.

Lithargirii
vnguen-
tum cru-
dum, &
coctum.

244. In vnguento de lithargyro, quod & tria-
pharmacum dicunt, & vnguentum nutritum, si
sine coctura fiat, quod & frigidius remanet per diu-
turnam in mortario ductionem consistentiam ac-
quirat; exsiccantem magis facultatem acquirit, si
coquatur; vt docet Gal. 6. med. local. cap. 1.
animaduertendum tamen ne longa coctione vitamur,
ne caliditatem acquirat, vt docet idem 1. med.
sec. gen. cap. 5.

In Vngue-
to de cal-
ce Gal. &
Auc. diuci-
fitas.

245. In vnguento de calce Auc. li. 4. Fen. 4.
Tract. 2. ca. 14. excepto à Gal. 6. Meth. med.
cap. 2. annotandum, non esse formandum vnguen-
tum, nisi tempore vsus; alioqui nimis durefcit. La-
uatur autem calx, vt calidam & acrem amittat
qua-

Also vn-

guento o-
leum rosa-
tum impo-
nendum .

Ceratum
refrigelas
Gal. sem-
per de no-
uo paran-
dum.

Oefiypi
Philagrii
parandi 15.

habe-

habere cernimus in apothecis, sed vnguenti; id evenire observatum est, aut ratione celsi mollioris, aut gummarum nimis emollitarum, aut nimiae quantitatis olei nardini. primo occuremus, si coctione ad ceræ consistentiam deducatur: secundo, si post gummas emollitas elixatione crassifaciamus: tertio, si olei illius semunciam solam indamus.

In Diachylone glutinem Alzanach quid.

249. In Diachylone maiori Mefuæ nihil est; in quo magis hæcant pharmacopœ, quam in glutine alzanach, alijs gummi hederæ, alijs piscium collam, alijs viscum intelligentibus; ego cum Melichio visciditatem cochlearum intelligo, cuius extrahendi modum habemus apud Seruitorem in fine sui libri: neque enim video, quomodo ex gummi hederæ gluten elici possit.

Diacalcitis non excipiat calcithim adustam.

250. Diacalcitis siue diapalma nobile est emplastrum, siue ceratum à Gal. traditum lib. 1. de med. comp. sec. gen. c. 6. ac nostris maxime usitatum. In eo leuigati calcitidis uncias quatuor ponit. An verò adustum indi debeat, in dubium aliquibus vertitur; asserentibus id ob Gal. auctoritatem 9. simp. c. 26. de calcithi agens meliorem omnino dicit crematam calcithim, quam non adustam. Quod, ut in plerisque verum esse concedendum est, ita in hoc emplastro non est concedendum; manifestè hoc eodem Gal. asserente 2. de comp. med. sec. gen. ca. 1. calcithim diligenter laevigatam, & per multos dies in acerrimo aceto ardentissimo soli expositam easdem vires acquirere, ac adustam; sed præterea hoc in se melioris conditionis habere,

Calcithis in vnguento an coquenda.

quod non conceperit empyreuma illud & acrimoniam, quæ in adusta postea lotionem tolli debet. quod confirmavit eodem libro cap. 9. & lib. 3. cap. 3. & alibi sæpius.

251. Si calcithim ab initio cum Gal. posuerimus,

mus nigerrimum habebimus medicamentum; quod si minus nigrum habere voluerimus, cum Paulo Lib. 7. cap. 17. in medio coctionis addemus: quod si post cocturam indatur, albidius emplastrum remanet. Ex coctura enim magis attenuatur, & miscetur calcitris, magisque nigro colore inficit. si enim in Theriaca Andromachi drachmæ quatuor in coctura admixtæ, compositum illud adeo in nigrum tingunt, quid in hoc vnguento facient quatuor vnciæ?

252. Cum Gal: dum coquuntur simul res istæ, remiscendas censeat bacillo palmeo; cum apud nos palmeus ramus viridis, qualis esse deberet, haberi non possit, quid illius loco supponere debemus? aliqui radice canne vuntur, qua Mesue in secundo palmeo emplastro vitur. Sed cum nulla adstrictione prædita sit, ob quam palmeo ramo vitur Gal. ut colligitur ex Gal. lib. 1. med. comp. sec. gen. cap. 6. ea non erit substituenda, sed ex arbore mespili, sorbi, corni, vel similibus ramum eligemus.

253. In emplastro de meliloto licet sciam passim totam herbam sumi, lignosis reiectis partibus, præstare tamen censeo, vaginas imponere semine gravidas. Serapione id persuadente lib. simpl. cap. 18. viriditas autem intensa emplastri, herbarum impositarum signum erit.

254. Caricæ per se diligenter tritæ in mortario sunt terendæ, & per setaceum sunt traducendæ, & ad faciliorem traductionem, si viscidiores fuerint, si opus erit, levis aliqua portio decocti meliloti, & aliorum erit addenda; ut etiam erit observandum in radice altheæ; detracto ligno. pistanda enim est eodemque modo per setaceum traducenda.

255. Qui non radices altheæ, aut semina sænu-græci in eodem censent esse imponenda, sed mucilagine inde extractas, præterquam quod id præter auctoris sententiam faciunt, breui etiam experientur, dx.

In Dia-
palma
quid pro
palma

Meliloti
emplastrum
vagas ob
tineat se-
mine gra-
uidas.

Caricæ in
emplastro
meliloti,
quomodo
traducendæ.
In Empla-
stro meli-
lotti non al-
theæ mu-
cilago, sed
radix, inde

quam facie emplastrum suum contrahat eo modo paratum.

Empla-
strum de
baccis lau-
ri quomo-
do paran-
dum.

256. In emplastro de baccis lauri duo annotanda sunt. primum in baccis siue granis semper esse exuendos extremo cortice; secundo mel, quo excipiendos, pulueres subtilissimos paulatim in mortario dicit, non mel requiri colatum; sic enim attenuatum, & visciditate priuatum acciperemus, quod emplastri huius naturæ repugnat; sed mel calidum, & in varia quidem quantitate, & pro varia mellis consistentia, ac pro varietate temporum anni.

Empla-
stri de pel-
le arietina
parandi
modus o-
ptimus.

257. Emplastrum de pelle arietina siue ceratum dicamus Villanouani, quia præstare quod pollicetur non videmus, quod sicciorum acquirat substantiam, ita vt in puluerem duci possit, & ideo non adhæret, multi vt huic occurrant incommodo varia quæsiuerunt remedia. quidam enim aut augendam quantitatem ceræ & terebinthinæ, aut saltem olei alicuius adstringentis libram indendam censent; aut certè vncias nouem vnguenti Comitissæ. sed oleum aut vnguentum adhæsiōni non inservient, neque visciditatem addent: cera autem ne effluat ceratum efficit, sed minimam addit visciditatem. Calestani modus, quo putat his se posse difficultatibus contraire, suas quoque habet oppositiones. Obseruatum enim est gluten, gummata, viscum, & viscida huiusmodi igni apposita ad cocturam magis magisque durescere, minusque apta reddi adhæsiōni. Quod si tam multa sicca adeo paucis humidis misceamus atque viscidis, ignique apponamus, quid aliud expectandum erit, quam ab igne vbi detracta fuerint, lapidescere. Alij lapidosum hoc ceratum, vbi in vsum ducendum est, in puluerem ducunt, & leui aquæ vel aceti portione addita igni appo-

nant, sicque mollius reddunt. At non animaduertunt, mollius quidem reddi, sed non tenacius, viscidiusque. Placet magis diligentissimi Ouedi sententia quod, cum Gal. sit sententia, ubi validissimum volumus habere ceratum, cere quantitatē duplicandam esse ad pulveres Lib. 3. med. sec. gen. c. 57. ceræ & resinæ ad pulveres duplicemus quantitatem; sic enim & adhærebit, nec effluet. cum igitur pulveris vnciæ triginta duæ concurrent ceræ, & colophoniz sexaginta quatuor vncias imponemus: à quibus si detrahamus vncias decem picis navalis, picis Græcæ, terebenthina, ceræ, & resinæ vnciæ quinquaginta quatuor ferè remanebunt indendæ. gummi enim, viscus, & pellis arietina cocta quasi additamenta & extrauagantia concurrent, adhesionem tamen inferuentia.

259. Sanguis humanus, qui exposcitur, sani sit hominis, ut ob plenitudinem aliquibus extrahitur, non tamen liquidus; nam sic neq; viri res, sicce cum ceræ & resina possent, neque imputres, & sine situ conservari emplastrum posset. In Guidonis Cauliacensis compositione, qui vnicam sanguinis copiam apposuit, liquidum indere, non esset præter rationem: at in Arnaldino, in quo libra inditur, illa inferet incommoda. Præstabit igitur siccum imponere, sed qua quantitate? Calestanus pro quilibet vncia drachmam imponit. Securius tamen erit libra vna sanguinis librata, & mox exsiccata, sic imponere, quod idem de lumbricis erit intelligendum.

260. Triapharmacum à Mesueo traditum ex vncia vna lithagyriz, altera acetis, & duabus olei, quamuis laudari possit, præstaret tamen Galenicum componere traditum cap. 9. primi med. sec. gen. quibus ex tribus ibidem traditis triapharmacis ex iisdem

Sanguis humanus in cerato de pelle arietina quomodo imponendus.

Tetrapharmacum Gal. præligendum quod quomodo formeretur.

com.

compositis, sed eorum quantitate & proportionem distinctis, postremum magis eligendum censemus; ex vna parte lithargyrij, & tribus aceti, & tribus olei cuius summas laudes & facultates ibidem recenset: cum autem aceti & olei, respectu habito ad lithargyrium, maiorem contineat quantitatem, quam illud quod à Mesueo traditur, & propterea ad consistentiam cerati acquirendam longiori indigeat coctione, nigrius euadit; sed etiam validius redditur.

Multa alia in hac materia adeo ab ingenio meo aliena addere possem; sed hæc ad adimplendum multorum desiderium, qui & in parte Chirurgica Medicinæ, & in ea, quæ ad componenda medicamenta pertinet, à me etiam Cautiones, Animaduersiones, & Additamenta libro huic meo adeo medicis omnibus recepto, ut spatio tredecim annorum quinquies sit impressum, quod fortasse nulli alii libro post Calcographiam repertam accidit, sæpè adeo postularunt, satis esse possunt. Quæ etiam iure maiori erant à me perscribenda, quo per munus mihi à Potentissimo Rege & Domino meo Protomedici impositum, corrigendi mihi erant multi Practicantium Chirurgorum errores; & in Dominio hoc Mediolanensi ut Pharmacopolæ, postquam nullum adhuc certum Antidotarium habeant, quod sequi necessario debeant, viam saltem aliquam ineant, per quam incedentes, minus in componendis medicamentis à recto tramite aberrare possint; donec aut nouum Mediolanense instituat, aut certè ex editis aliquod eligatur, quod seruatis ijs Animaduersionibus omnino seruetur.

I N D E X.

A

A Brasio ossis caluarie cur fiat. L.	8. 117
Abradendum rarius.	8. 118
Abrasio caluarie raro sit profunda.	8. 119
Abrasio quomodo administranda.	8. 121
Abradendum donec rima euanescat.	8. 124
Abfinthij syr. quando cum Romano, quando cum Pontico parandus, & quando cum melle, & quando cum faccharo.	9. 183
Abfinthium siccum in syrupo ponendum.	9. 184
Abfinthij, & liquorum quantitate seruata in infusione, & decoctione, quomodo syrupus parari possit.	9. 189
Aqua calens noxia in dolore ex punctura neruorum.	8. 87
Abrasio Caluarie cur fiat.	8. 117
Acetosa fugienda in vulneribus thoracis.	8. 179
Adnata tunica vulnerata quomodo tractanda.	8. 166
Animaduersionum harum scribendarum causæ.	9. in proem.
Aquæ quantitatis pro decoctis varietatis causæ.	9. 22
Aloes lauandi varij modi, & fines.	9. 33
Aloes dum verè abluitur aqua proijcienda.	9. 34
Aloes lauandi noua ratio Quercetani.	9. 35
Astatio superfluum solum absorbit humiditatem.	9. 37
Astâ elixis quomodo humidiora.	9. 37
Alchermes præparandi ratio, & difficultates.	9. 42
Aromaticum rosatum non admittit species nimis subtiles.	9. 57
Amygdalæ in Diaphœnico sint dulces.	9. 80
Armeni lapidis loco substituendus lazuli.	9. 108
Alesfanginarum pilularum decoctio non graduanda.	9. 112
Alesfanginarum decoctio quam aquæ quantitatem requirat.	9. 113
Aromata in alesfanginis quamdiu excoquenda.	9. 114
Aloe socotrina in pil. alesfanginis cur laetetur; cum Diosc. negat lauari.	

I N D E X

dam,	9. 115
Alefanginæ corio peruncto conuoluendæ,	9. 116
Aggregatiuas pilulas, species exposcere minutissimè trituratas contra	
Oniedum,	9. 118
Agarici electio,	9. 121
Per Aquam porrorum, non stillatitiam, sed succum intelligen-	
dum,	9. 132
Alcebra in pil. faridis quid,	9. 133
Aloe odorata in pil. sine quibus quid sit,	9. 138
Aureæ pil. quam rosaceæ quantitatem requirant,	9. 140
Apollinis errores duo maximi in pil. de cynoglossa,	9. 143
Ambra non oleo, sed aqua, dissoluenda,	9. 145
Ambra cam quid,	9. 146
Alefanginæ Gallix infusio sit in rosacea,	9. 148
Alefanginæ quam aquæ rosaceæ ad cortices citri proportionem	
habere debeant,	9. 143
Alefanginarum quæ proportio emblicorum ad aquam,	9. 150
Alchechengi granorum nomine quod intelligendum,	9. 162
Absinthij syr. quando cum Absinthio pontico, & quando	
cum Romano, parandus,	9. 183
Absinthium siccum in tyruo ponendum,	9. 184
Absinthij, & liquorum seruata quantitate in decoctione, quo-	
modo syr. parari possit,	9. 185
Aceti quantitas in syr. de duobus radicibus,	9. 205
Aromatizatio syruporum quando fiat,	9. 210
Aromatum globuli in vase non seruandi,	9. 212
Aromata pro Aromatizatione non multum trituranda,	9. 213
Amygdalini olei extrahendi varij modi, & qui recipiendus.	9. 219
Apostolorum vnguento, pro flore aris, argo indenda.	9. 226
Auicennæ error in compositione vnguenti Apostolorum.	9. 229
Auicennæ error in quantitate ceræ in vnguento Apostolorum.	9. 230
Agrippæ in vnguento quid per succid.	9. 236
Arthanitæ vnguentum radicem Cyclaminis maioris recipiat.	9. 241
Albo vnguento oleum rosatum imponendum.	9. 246
Altheæ radices, non muccago, in emplastro de meliloto indede.	9. 255
Arie-	

I N D E X

Arietinae pellis cerati parandi ratio,	9.257
Ærugo aceto semper prius maceranda,	9.227
Ærugo in vnguento Apostolorum post alia indenda,	9.228
Aqua calens in dolore ex nervi punctura noxia,	8. 87

B

Benedictæ laxatiuæ species bene terendæ,	9.106
Berberorum Trochisci liquiritiæ succum siccum requirunt,	9.157
Batece semina quid sint,	9.163
Belus quid,	9.164
Bedeguar quid, & substitutum,	9.188
Bisantino in syr. quid intellig. Mesue ebullitione vna,	9.207
Baccharum lauri emplastrum quomodo parandum,	9.256

C

Chirurgicæ partis præstantia. 8. proëm. Chirurgica pars	
cur ab aliquibus negligatur,	8. proëm.
Chirurgicæ animaduersiones cur his libris additæ,	8. proëm.
Cæsaris Magati laudes,	8. proëm.
Celsi sententia non admittenda de futura non vniante,	8. 14
Contusis suppurantia addenda,	8. 49
Cicatrix vt inducatur, quibus vtendum,	8. 52
Curandum quomodo vulnus, antiquo more curatum,	8. 53
Contusio in capite quomodo curanda,	8. 107
Cranij superficies cur aliquando emoriatur,	8. 120
Cranij superficies emortua quomodo curanda,	8. 120
Caluariæ introcessio cum exitu quid requirat,	8. 131
Caluariæ cæca introcessio quid requirat,	8. 132
Caluariæ parte abscessa quid agendum,	8. 134
Caluaria incisa, & subcollecta materia, quid agendum,	8. 135
Caluaria in ictu integra, & sanguine suffusa quid agendum,	8. 136
Caluariæ forus ex aqua ardente, aut balsami in sanguine suffuso	
reijciendus,	8. 137
Cephalici pulueres sunt inutiles,	8. 162
Caluariæ nigredo quomodo curanda,	8. 163
Curatio per iniectiones thoraci non probandæ,	175
Chalybis colligandi mirus modus,	9. 38

I N D E X

Chermes quantitas pro singulis libris serici.	9.	44
Chermes vt coquatur, quæ aquæ quantitas requiritur.	9.	45
Chermes sit coccus Baphicus, non cociniglia.	9.	47
A cepis quomodo succus extrahendus.	9.	68
Cheiron non significare immaturum.	9.	74
Costei de mellis ad species proportionem sententia reprobata.	9.	83
In confectione Hamech à dactylis ossa eximenda.	9.	84
Colocynthis, & agaricus in Confect. Hamech quomodo infundendi, & decoquendi.	9.	86
Cassia succus purus sit in Confect. Hamech.	9.	89
Cassia succus elixatus, quomodo conseruetur.	9.	90
In catholico per sennam folia sumenda, non folliculi.	9.	91
Cassia in catholico mundata indenda.	9.	92
Cochias picram Rasis recipere debere.	9.	120
Calestani, & Patrum error.	9.	146
Cortesi error in infus. emblicorum in gallia alefangina.	9.	151
Capparorum Trochisci quomodo cum adeo pauca ammoniaci formari possint.	9.	158
Crocus in syr. de pomis quomodo ponendus.	9.	74
Calestani in menthæ quantitate metienda in syr. de mentha resutata sententia.	9.	178
Coctio ad tertiam, & tertiasquid, & quomodo distinguantur.	9.	191
Coctio cum facilitate quid significet.	9.	208
Crocus quomodo coquendus.	9.	214
Comitisse vnguentum quomodo paretur.	9.	240
Cyclaminis succi crudi in vnguento de Arthanita sumendi.	9.	242
Ex Calce vng. diuersum esse Galenicum ab Auicenniano.	9.	245
Calcithis in vng. an coquenda.	9.	251
Caricæ in emplastro quomodo traducendæ.	9.	254

D

D eligationum varietas, & vsus.	8.	17
Deligatio quomodo facienda.	8.	24
Deligatio, vtraque ora vulneris comprehendere debet.	8.	25
Deligatio neque arcta, neque laxa.	8.	26
Deligatio quando debet esse inæqualis.	8.	27

Defen-

I N D E X

Defensuum commune non probandum, & cur.	8.	38
Detergere vulnus sepè quando debemus.	8.	56
Diaphragmatis vulnerati curandi ratio.	8.	182
Decocta paranda secundum canones Mésue.	9.	20
Decocta cum infusionibus non exposcunt graduationem.	9.	21
Decoctio in duplici vase minorem duplo requirit aquæ quantitatē.	9.	23
In Decoctis pro componendis medicamentis non est mutanda aquæ quantitas, etiamsi maior, vel minor videatur, & cur.	9.	24
Decoctio vase ocluso, & igne sicco minorem aquæ, & ignis, quantitatem requirit.	9.	25
Decocta sicco igne facta longè sunt valentiora, quàm quæ in duplici vase.	9.	26
Decoctio rerum substantia diuersarum quam proportionem exposcant temporis, ignis, & aquæ.	9.	28
Decoctione in duplici vase vtendum, vbi apud scriptores pauca aqua indita videtur.	9.	30
Diamosci consideratio.	9.	51
Diamosci in morsulis animaduersio.	9.	53
Diambra consideratio.	9.	52
Doronicum in diambra recipiendum.	9.	54
Doronicum non esse venenum.	9.	55
Diarrhodoni, semina frigida quomodo, & qua mensura indēda.	9.	58
In Diacymino semina prius metienda, quàm infundenda.	9.	61
Diatrágacanti componēdi varietas, & cur adeò variè cōponatur.	9.	62
Diamargariti frigidi variè descriptiones, & quæ eligenda.	9.	63
Diarr. simplex in morsulis quomodo parandus.	9.	64
Dialacæ examinatio.	9.	65
Diasatyrión quas cæpas exposcat.	9.	68
Diaphœnici examen.	9.	74
Dactyli cheiron quid.	9.	74
In Diaphœnico quæ aceti mensura pro infus. dactylorum.	9.	75
Dies infusionum est horarum viginti quatuor.	9.	76
Dactyli in Diaphœnico ponderandi antequam infundantur.	9.	73
Despumatio mellis quomodo faciēda.	9.	82

I N D E X

Dactyli emolliti, & penidia in Diaphenico mellis vices suppleant,	9. 83
Diaphenicon quam mellis quantitatem requirat,	9. 83
Decoctio non est graduanda, cum sit precedēte infusione, & cur,	9. 85
In diasena sericum quomodo cremandum,	9. 107
Decoctio graduanda, cum non præcedit infusio,	9. 193
Dialthææ compositio Nicolai falsa in quantitate aquæ ad extra-	
hendas mucagines,	9. 231
Dialthææ verus componendi modus,	9. 232
In Diachylone quid gluten Alzanach,	9. 249
Diaecalcithis non sit cum adiuncto calciti,	9. 250
Diapalma quid pro palma,	9. 252
E Vphorij quantitas in puncturis neruorū quando varianda,	8. 83
Effluxus quomodo parandus,	8. 152
Eluxationū termini variantur pro varietate rerū excoquendarum,	9. 27
Electuarij de gemmis nobilitas, & difficultas,	9. 39
Electuarij Rosati Mesuæ examen,	9. 88
Electuarium de succo Rosarum non sit nimis liquidum,	9. 102
Elect. de succo rosarum non scammonium, sed diacridium,	
indendum,	9. 103
Elect. Indi minoris examen,	9. 103
Esulæ preparandæ ratio,	9. 134
Eusistidos nomine quid intelligendum,	9. 160
Eupatorii syr. parandus est, cum succo agerati,	9. 188
Eupatorii syr. quam succorum requirat quantitatem,	9. 189
In Eupatorii syr. succi prius excoquendi,	9. 100
Epithymi syr. decoctio quantam aquam requirat,	9. 194
Epithymi syr. quæ sacchari quantitas indenda,	9. 195
Ærugo aceto semper prius maceranda,	9. 227
Ærugo in vnguento Apostolorum post alia indenda,	9. 228
F	
Fasciarum quanta vtilitas, & varietas,	8. 17
Fasciarum latitudo, varietas, & qualitas,	8. 18
Fasciarum longitudo quæ	8. 19
Fasciarum qualitas quæ	8. 20
Fasciarum substantia quæ,	8. 21
Fa.	

I N D E X

Fasciarum qui color esse debeat ,	8. 22
Fascia sit munda, & tenuis,	8. 23
Fibularum pro vnione præstantia	8. 35
Fibularum subitus vsus quomodo esse possit,	8. 35
Fluxio quomodo inhibenda ,	8. 37
Fungo in membrana nato quid agendum ,	8. 160
Flores quando colligendi, & quomodo seruandi ,	9. 3
Francisci Velezii in proportionibus decoctionum sententia ,	9. 28
Fuchsi in triasantalo error,	9. 60
Fumariæ pil. non aqua fumariæ, sed succo excipiendæ,	9. 126
Fumariæ succi quantitas quæ in pillulis fumariæ ,	9. 127
Fumariæ succi imbibitio in sole in pil. de fumaria repetenda,	9. 130
Fœtidæ pil. succum porrorum capitatorum exposcere,	9. 131
Fœtidæ quomodo componendæ,	9. 136
Fœtidæ pil. quomodo formandæ,	9. 137
Fumariæ syr. maior per cassiam fistulam, medullam requirit,	9. 192

G

G Vmmi, & lacrymæ quō parandæ, vt in vsum veniant,	9. 14
Ga llia simpliciter prolata, non alefanginam, sed mosca-	
tam significat,	9. 147
Gallia in syr. de mentha quæ indenda, & qua mensura,	9. 179
Gallia moscata in elect. Ros. Mei. indenda,	9. 101
Gallia moscata tragacantæ quam minimum recipiat,	9. 140

H

H Istoriæ medicæ notatu dignæ,	8. 163
H Herbarum viscidarum extrahendi succi modi,	9. 172
Hyllōpi syrupo quæ aquæ quantitas indenda,	9. 182
Hyacinthinæ confectionis descriptionum varietas, ambigui-	
tas, & confusio,	9. 4
Hyusquiami semina quō triturlanda,	9. 72
Hiera Gal. uera quæ,	9. 109
Hiera Gal. ex quot drachmis aloes confet,	9. 10
Hiera in pil. de agarico picra Gal. intelligenda,	9. 121
Hamel non cicutam significat, sed rutam syluest. m.	9. 135

I N D E X

I

Iniectionibus quando vtendum,	8. 177
Iuiubarum syr. parandi varij modi variata quantitate iuiubarum, & aqua,	9. 180
Introcessio Caluariæ cum fractura quid requirat,	8. 133

L

Labia vulnerum quomodo adducenda,	8. 19
Labijs iunctis quid præstandum,	8. 36
Liquiritiæ syrupi decoctio non graduanda,	9. 197
Liquiritiæ syr. stillatitiæ rosaceam aquam requirere,	9. 198
Liquiritiæ syr. parandi ratio,	9. 199
Lotionum varij modi, & vsus,	9. 32
Lotio vera semper à re lota aliquid detrahit,	9. 36
Lætificans Rasis, & eius præparandi difficultates,	9. 41
Lazuli lapidis electio, & lotio,	9. 49
Lazuli lapidis in Alchermes quantitate,	9. 50
Lacca quæ dialaccæ imponenda,	9. 65
Laccæ abluendæ ratio,	9. 65
Lithargyrij vnguentum ex crudo, & cocto,	9. 244

M

Magati gluten mirabile præsentaneum,	8. 35
Membrana sana, neque aqua ardente, neque melle rosato, neque oxymellite vtendum,	8. 50
Membrana denigrata quomodo tractanda,	8. 158
Membrana ex frigore denigrata quomodo tractanda,	8. 159
Medicamentorum miscendorum causæ,	9. proam.
Mucilaginis extrahendæ modi, & qui melior,	9. 13
Metallorum, & Metallicorum varij lauandi modi,	9. 15
Metallicorum acrium perfectus lauandi modus,	9. 16
Metallica quomodo, & cur varij liquoribus abluenda,	9. 17
Metallica adusta aqua abluenda,	9. 18
Metallica adusta, vt mitiora fiant elixanda.	9. 19
Myrrhæ trochiscorum examen,	9. 65
Myrrha simplex ex melle, & saccharo paranda,	9. 167
Myrrha quam requirat sacchari quantitatem,	9. 168

Men-

INDEX

Menthe syrupum compositum, siccam mentham exposcere,	9.	176
Mentha vere sicca in syr. de mentha ponenda,	9.	177
Mentha decoquenda in suo syrup. vera ratio.	9.	178
Matthæolus rejicitur in doronico,	9.	54
Mellis quantitas quæ, cum dicitur quantum sufficit,	9.	83
Mellis ad species communis proportio quæ,	9.	83
Mellis, & sacchari in compositis admittendi causæ,	9.	83
Mellis quantitas quando minuenda,	9.	83
Mellis in compositis vices quæ suppleant,	9.	83
Manna in electuario rosato Mesuæ an elixanda,	9.	98
Miua citoniorum simplex quam requirat sacchari quantitatem,	9.	209
Miua aromatica quomodo aromatizanda,	9.	211
Meliloti emplastrum non folia, sed vaginas excipiat,	9.	253

N

N erui puncturis valida siccantia adhibenda.	8.	78
Nerui cæsi punctura quid requirat,	8.	79
Nerui puncturæ dū curamus, quātitatis materiæ habēda est rō,	8.	80
Nerui puncturæ dū curamus, habēda ratio varietatis corporū,	8.	84
Nerui punctura maximè siccantia respuit.	8.	81
Neruo denudato quid agendum,	8.	90
Neruis per longum scissura magis periculosa,	8.	93
Nerui contusorum curandi ratio,	8.	94
Nerui semisecti incidendi, ne conuellantur,	8.	95
Nerui nunquam vrendi,	9.	99
Nerui nunquam oleo calido adurendi,	8.	97
Nerui vulnerati ne oleo quidem tepente attingendi,	8.	98
Neruos dum curamus, frigidum actu fugiendum,	8.	100
Nerui curatio tepentia respicit,	8.	101
Nerui vulnera rarius detegenda, etiam urgente dolore,	8.	101
Nasi vulneribus quomodo medendum,	8.	167
Nasi vulneribus cum sternutamentis quomodo succurrendum.	8.	168
Nicolai alter error in dialthæa,	9.	232

O

O lea tenuissima crassioribus liganda,	8.	48
Olea tenuia crassis liganda,	8.	91
Olea		

I N D E X

Olea stillaticia calida in neruorum vulneribus cur vtilia:	8. 99
Ossis caluariæ excisio quomodo facienda	8. 142
Osse exciso non sunt indenda linimenta	8. 151
Osse exciso quid præstandum,	8. 151
Oculorum vulnera quomodo tractanda,	8. 165
Oniedi refutatio opinionis Veleij,	9. 28
Oleum oliuarum nouum quomodo ad veteris propemodum naturam reducatur,	9. 215
Omphacinum oleum tempore maturefcit,	9. 216
Omphacinum oleum quomodo cum folijs oleæ adulteretur, & quomodo adulteratum cognoscatur,	9. 217
Omphacini olei falsificandi modi; & illorum cognitio,	9. 218
Olei rosati paradi modus, & rosarum ad oleum quæ proportio,	9. 220
Olei rosati parandi Galenica ratio imperfecta,	9. 221
Oleum rosatum simpliciter ex maturo oleo,	9. 222
Olei rosati Galenici verus præparandi modus,	9. 223
Oesypi Philargij parandi ratio,	9. 248
In ossis collifione quomodo abrasione vtendum,	8. 130
P	
Penicillorum, & turundarum damna;	8. 10
Penicillorum vsus Hippocrati reprobatus,	8. 10
Peregrina corpora auferenda ante vulneris curationem,	8. 16
Puluilli triangulares unioni inferuunt,	8. 18
In Punctura nerui quō validis siccantibus aliquando vtendum,	8. 32
Puncturæ neruorum remedia noua potiora quàm Galenica,	8. 85
Puncto neruo, dolore vrgente, quid agendum,	8. 86
Punctura nerui dolore sedato quomodo tractanda,	8. 88
Puncto neruo, Phlegmone imminente, quid præstandum,	8. 89
Pericranij sectio raro facienda,	8. 111
Perforatio primis diebus facta cur magis periculosa,	8. 146
Purgationes in curatione vulnerum vtilis,	8. 164
Pulmonibus vulneratis nihil instillandum,	8. 180
Pulegium ceruinum quid,	9. 265
Pomorum succus ad syr. quomodo parandus,	9. 173
Papaueris syr. qualia exposcat capita papaueris,	9. 200
Phi-	

I N D E X

91	Philonij Romani examen,	9. 69
140	Philoniū Persicū requirit loco piperis albi, sem. papaueris albi,	9. 64
151	Philonium Persicum nō ante mensem sextū in vsum ducendū,	9. 73
151	Per Partes in compositione medicamentorū quid intelligendū,	9. 77
165	Polypodij decoctum, quam requirat aquæ quantitatem,	9. 97
28	Pilulæ stomachicæ paræ formandæ, & cur,	9. 117
215	Pilularum de Agarico examen,	9. 123
216	Pil. de rhabar. examen,	9. 121
217	Pilularum ex fumaria parandi ratio,	9. 119
217	In Pilulis sine quibus scammonium quomodo miscendum,	9. 139
218	Pil. Aureæ quomodo formandæ	9. 141
218	Pil. de cynoglossa Mesue eligendæ,	9. 142
220	Pil. de cynoglossa siccas radices requirunt,	9. 142
221	Papaueris syr. parandi ratio,	9. 200
222	Papaueris syr. quam aquæ proportionē ad capita habere debeat,	9. 201
223	Papaueris syr. ex siccis capitibus quomodo parari possit,	9. 202
248	Plumbi vnguenti vera parandi ratio,	9. 233
130	Populeo in vnguento quid per oculos populi intelligendum,	9. 238
10	Populei vnguenti parandi modus,	9. 239
10	R esinæ lauandæ in curatione neruorum,	8. 92
10	Rima longa non tota abradenda,	8. 125
16	Rima non semper abrasionem requirit,	8. 126
18	Recentiorum errores in formulis compositorum mutandis, & illoiurum censura, 9. proem.	
85	Radices quando colligendæ, vt conferuentur,	9. 2
86	Rhabarbarum in Hamech cum reliquis decoquendum, & cur,	9. 85
88	Rhabarbari trituratio quomodo varianda,	9. 93
89	Rhabarbari electio,	9. 123
111	Rhabarbarum quomodo graue cum raritate,	9. 124
146	Rhabarbari antiquati & optimi signa,	9. 125
164	Rhabarbari pil. succo fœniculi formandæ, non syrupo,	9. 126
180	Radices in decoctis à ligneis partibus internis expurgatæ,	9. 203
265	Radices calidæ siccæ; frigidæ humidæ, in decoctis sumendæ,	9. 204
173	Radicum duarum syr. quomodo parandus,	9. 204
200	Rosato in vnguento Mesuæ quæ quantitas olei amygd.	9. 235
11	Re-	

I N D E X

Refrigerans vnguentum Gal. semper de nouo parandum, 9. 247
 Rob ablofurè quid significet. 9. 122

S

S Pleniorum vsus damnandus, & cur, 8. 4
 Spleniorum vsus, in quibus casibus admittendus, 8. 5
 Splenia non necessaria ad puris ex purgationem, 8. 6
 Splenia non necessaria ad carnis impediendam generationem, 8. 7
 Splenia non necessaria ad carnem fungosam tollendam, 8. 8
 Splenia non necessaria ad medicamenta ad partes profundas deducenda, 8. 9
 Sanguine fluente ex vulnere non est vulnus suendum. 8. 15
 In Sutura quæ spectanda, 8. 30
 Sutura non adhibenda in multum hianti vulnere, 8. 30
 Sutura non viuens, non recipienda, 8. 31
 Sutura quando non vtendum, 8. 32
 sutura quomodo facienda in musculo lato tendine operto, 8. 33
 sutura cruentis etiam quando adhibenda, 8. 34
 sarcoticis astringentia per se non miscenda, 8. 42
 sarcotica varianda pro varietate naturarum, 8. 43
 stuppatæ ad sistendum sanguinem raro in vsum ducendæ, 8. 44
 sanguinis sistendi rationes, 8. 45
 sarcoticis addenda medicamenta à tota substantia, 8. 47
 suppurando, caloris naturalis est habenda ratio, 8. 50
 stuppatis in vsum ductis quid præstandum, 8. 54
 siccantia valida in punctura neruorum quæ, 8. 78
 sectio in formam crucis adeo frequens detestanda, 8. 109. & 112
 sectio cutis capitis quando facienda, 8. 111
 sectio in musculo temporali raro facienda, & cur, 8. 113
 sectio in fronte per rectum facienda, & cur, 8. 115
 sectio super suturas raro facienda, & cur, 8. 114
 sectio in occipitio quomodo facienda, 8. 116
 scalpro quomodo vtendum, 8. 122
 scalpro suturæ non attingendæ, 8. 123
 In sede quousque abradendum, 8. 127

In

I N D E X

In sede sub Rima quid præstandum,	8. 128
In sede cum ictu punctiuo quomodo curandum,	8. 129
sanguine concreto sub caluaria quid agendum,	8. 157
simplicium med. qualis delectus,	9. 1
semina quando colligenda, & seruanda,	9. 4
succi ex herbis quando extrahendi.	9. 5
succi non exprimendi ex floribus, & herbis collectis ante solis exortum, ob roris mixtionem,	9. 6
succi vt conseruentur prius sunt elixandi, & expurgandi,	9. 7
succi vt conseruentur quousque elixandi, & expurgandi,	9. 7
succi vt conseruentur, quousque elixandi, & quo reponendi,	9. 8
succi aliqui, vt conseruentur, exsiccandi,	9. 9
succi soli expositi cooperiendi,	9. 10
succi igne incrassandi igne moderato,	9. 11
succi igne incrassandi aëneo vase non excipiendi,	9. 12
succus herbarum in Trochiscis de eupatorio quid sit,	9. 155
sedemagi quid, & quid eius loco,	9. 161
syr. de cicorio cū Rhab. Nic. qua aquæ quantitate parandus,	9. 169
syr. de cicor. cum Rhab. Gulielmi, Rhab. vnciarum duarum indendæ non drachmæ,	9. 170
syr. de Polypodio ante vsum spatula commiscendus,	9. 171
sabor regis syrapi examen,	9. 172
syr. de pomis compositus quam aquæ quantitatem requirat,	9. 175
syr. de Absinthio non requirit graduatam decoctionem,	9. 186
syr. de Absinthio non requirit bipartitam decoctionem,	9. 186
siccata quid, & substitutum,	9. 188
stoechadis syr. quæ aquæ quantitas indenda,	9. 196
sericum in Alchermes quale,	9. 43
serici tingendi ratio,	9. 46
succus pomorum non sit igne defecatus,	9. 48
sericum in Diamosco crudum. in non elixatum, sed crematum,	9. 51
serici cremandi ratio,	9. 52
santalo citrino deficiente album substituendum,	9. 56
schoenu Dialacæ bis imponendum, nempe flos, & palca,	9. 67
scedenegi in Philonio persico est lapis hamatites,	9. 71
scam-	

INDEX.

Scammonij quantitas in Diaphœnico sit Drachmarum viginti duarum .	9. 79
Seri quantitas quę in confectione Hamech,	9. 87
Seri incorrupti per quinque dies conservandi ratio,	9. 88
Semina frigida simpliciter prolata maiora intelligenda,	9. 94
Semina frigida, quomodo trituranda,	9. 95
Seminum frigidorum in catholico quantitas,	9. 96
Scamonium an elixandum,	9. 99
Spodium in electuarijs quod indendum,	9. 104
Sericum non crematum quomodo poluerizetur,	9. 107
Species in Hiera quomodo trituranda,	9. 111
Succi Absintij, & Eupatorij in aggregatijs condensati im- ponendi,	9. 110
Soritionis forma in pil. de fumaria quę,	9. 128
Syr. de duabus radicibus simpliciter intelligendus cum aceto,	9. 206
Scamonium in externis semper subtilissime tritandum,	9. 243
sanguis humanus in cerato de pelle arietina quomodo indendus,	9. 259

T

T Vtrudarum vsus non recipiendus, cur,	8. 4
Temporalis musculo contuso quomodo procedendum,	8. 108
Terebratio rarius administranda.	8. 138
Terebratio aliquando facienda, & quando,	8. 138
Terebrationis pericula,	8. 138
Terebrationis exercendę signa demonstratiua,	8. 139
Terebratio non semper necessaria osse fracto,	8. 140
Terebrationis exercendę temporis signa,	8. 141
Terebratio ad futuram quomodo exercenda,	8. 143
Terebratio non exercenda sub musculo temporali,	8. 144
Terebrationis tempus,	8. 145
In Terebratione quando subsistendum,	8. 146
In Terebratione quando mutanda terebra,	8. 146
Terebrandum statim, si collecta sit materia,	8. 147
Terebratio sit recta, & æqualis,	8. 148
Terebrato & exciso osse, quid agendum,	8. 149
A Terebratione detegendum aliquando vulnus,	8. 153

Tere-

I N D E X

Terebrato osse vulnus quomodo tractandum,	8.154
A Terebratione si sanguis subit, quid agendum,	8.155
Tussi malè materia ex vulnere in thoracem effusa euacuatur,	8.171
Tubulo vtendum pro eductione materiæ in thoracis vulnere,	8.170
Tubuli longitudo in vulnere thoracis,	8.172
Tubulus qualis,	8.173
Tubulo quid superponendum,	8.174
Tussis non promouenda in vulneribus thoracis,	8.178
Triturationis præcepta ex Can. Mesuæ, & Gal.2. de Antid.	
desumenda,	9. 31
Trochiscos de rhab. requirere succum agrimonij condensat.	9.153
In Trochiscis de Eupatorio in manna, & succo, error Brasauoli,	9.154
Trochisci de berberis,	9.156
Terenebiabin quid, & eius loco substituendum,	9.156
Trochiscorum de terra sigillata examen,	9.159
Terra sigillata nostra recipienda,	9.159
Trochiscorum de Alchechengi examen,	9.152
Tragaganta, & semina maluæ quomodo excoquenda,	9.181
Torrefactionis varij modi,	9. 37
Triafantalorum examinatio,	9. 59
Trituratio bona intelligitur mediocris,	9. 81
Trochisci de spodio sine sem. acetosæ in Rosato Mæ sue	
indendi,	9.100
Tuthiæ in vnguento succus solatri vnde extrahendus,	9.234
Tribuli marini non fol. sed radices in vnguento Agrippe,	9.237
Tetrapharmacum Gal. eligendum, & quomodo parandum,	9.260

V

V ulnerum curandorum nouus modus multo præstantior, 8 pro-	
am.	
Vulnerum curandorum duplex modus, antiquus, & nouus,	8. 1
Vulnerum curandi noua ratio cur præstantior,	8. 1
Vulnera rarò detecta citius, facilius, & tutius curantur, & cur,	8. 2
Vulnerum rarò detectorum feliciter curatorum exempla,	8. 2
Vulnerum rarò detegendorum ratio defensa aduersus communem	
vsum,	8. 3
	Vul-

I N D E X.

Vulnerum curandorum noua hac ratione indicationes,	8.	11
Vulnera omnia sunt caua,	8.	12
Vulnerum simplicium in carne curatio,	8.	13
In Vulneribus sanguis non statim sistendus,	8.	14
Vulnera simplicia in sanis non semper requirunt euacuationes.	8.	39
Vulnerum cauorum duplex curandi ratio antiquo more.	8.	40
Vulnerum cauorum curandorum indicationes, nouo curandi modo.	8.	41
Vulneris caui noua curandi ratio.	8.	43
Vulneri cauo quæ, & qualia medicamenta imponenda.	8.	46
Vulnera quoties detegenda.	8.	51
Vulnere antiquo more curato quid præstandum.	8.	55
Vulnere angusto & sine effluxu quid præstandum.	8.	56
Vulnera quando sæpius detegenda.	8.	57
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.		
Vulnera per se raro soluenda.	8.	74
Vulnera detegenda tempore cicatricis.	8.	75
Vulnere coniecto, quomodo cognoscatur esse soluendum.	8.	76
Vulnera nervorum putredinosa citius soluenda.	8.	103
Vulnerato capite non simplicibus agglutinantibus agendum.	8.	104
Vulnera capitis simplicia in bene sanis agglutinatibus aliquando curantur.	8.	105
Vulnera in musculo temporali, vt nervosa curanda,	8.	106
Vulnere cerebrum attingente quid præstandum.	8.	161
Vulnera oculorum quomodo tractanda,	8.	165
Vulnerato Thorace cum penetratione quid agendum.	8.	169
Vulnerariorum potionum vsus.	8.	181
Vasa ænea in multis parandis decoctis fugienda.	8.	29
Veletij error in mensura emblicorum in alefangina.	9.	152
Visione qualibet absumitur humiditas.	9.	38
Visionum varij morbi pro rerum varietate.	9.	38
Violaceum oleum sit cum oleo omphacino.	9.	224
Vnguenta Mauritanis quæ dicantur, & ex quibus.	9.	221

F I N I S.

1
1
1
1
3
4
4
4
4
46
51
55
56
57
72
74
75
76
103
104
105
108
161
165
169
181
28
152
38
38
224
221





